



المنتجات البيطرية




"BioTestLab" هي شركة أوكرانية رائدة في مجال صحة الحيوان، مُتخصصة في تطوير وإنتاج وتوزيع المستحضرات البيولوجية والأدوية البيطرية لأكثر من 35 عامًا، معتمدةً على نهج فردي في التعامل مع كل عميل. وبفضل مجموعتها الواسعة من اللقاحات البيطرية، تُصنّف الشركة ضمن أفضل 20 شركة رائدة على مستوى العالم.

يكمّن مفتاح نجاح "BioTestLab" في تكاتف فريق عملها في مركز الأبحاث وأقسام الإنتاج والإدارة.

تُصنّع "BioTestLab" منتجاتها في منشآتها الخاصة بأوكرانيا، والمجهزة بأحدث المعدات. الشركة حاصلة على شهادة اعتماد من وكالة الاعتماد الألمانية DQS لمطابقتها للمعيار الدولي ISO 9001:2015، كما تُجرى عمليات الإنتاج لديها وفقًا لمعايير ممارسات التصنيع الجيد (Good Manufacturing Practice). وتضمّ سلاسل التوريد الخاصة بالشركة نخبة من كبرى الشركات المُصنّعة للمكونات الفعالة والأجنة الخالية من مسببات الأمراض النوعية (SPF). وقد أتاحت جودة منتجاتنا للشركة أن تتبوأ مكانتها في السوق الأوكرانية بحصة سوقية تصل إلى 40% في العديد من قطاعات المنتجات، وأن تبدأ في تصدير منتجاتها إلى الأسواق البيطرية في بلدان أخرى.


جغرافية المبيعات والتسجيل



المحطات الرئيسية

إطلاق مجمّع أبحاث وإنتاج الأدوية الحيوية الجديد لشركة BIOTESTLAB	2024
إطلاق لقاح POLIMUN ND EDS IB MAX (بوليمون ND EDS IB ماكس)، وهو لقاح معطل مركب ضد ثلاث سلالات من VBI	2023
إنتاج أول لقاح للأبقار – BOVIMUN 4 (بوفيمون 4)	2018
إطلاق RELAX (ريلاكس)، محلول غرواني من البروبوفول للتخدير البطني للحيوانات الأليفة	2017
الحصول على شهادة GMP وبدء إنتاج اللقاحات المُخصصة (الذاتية المنشأ)	2015
إجراء دراسات متقدمة حول الحساسية البكتيرية: المضاد الحيوي الفموي TRICOLIN (تريكولين) — براءة اختراع BIOTESTLAB	2011
إطلاق المطهر الفريد VIROSAN (فيروسان)	2010
تطوير البرنامج الوطني للقضاء على مرض أويزيسكي (Aujeszky's Disease)	2009
إنتاج أول لقاح للأرانب	2006
تأسيس مركز التشخيص	2001
تطوير لقاح داء نيوكاسل باستخدام تقنية SPF	2000

المنتجات



ص				المنتجات
اللقاحات للدواجن				
10			•	قواعد وطرق تحصين الدواجن
اللقاحات الحية				
15			•	POLIMUN AE (بوليمون AE)، التهاب الدماغ والنخاع الشوكي
16			•	POLIMUN POX (بوليمون POX)، الجدري
17			•	POLIMUN AE+POX (بوليمون AE+POX)، التهاب الدماغ والنخاع الشوكي، الجدري
18			•	POLIMUN IBD Light (بوليمون IBD لايت)، التهاب جراب فابريشيا - داء الغومورو، النسبة المستهدفة للأجسام المضادة: 500
19			•	POLIMUN IBD (بوليمون IBD)، التهاب جراب فابريشيا - داء الغومورو، النسبة المستهدفة للأجسام المضادة: 800
20			•	POLIMUN IBD+ (بوليمون IBD+)، التهاب جراب فابريشيا - داء الغومورو، النسبة المستهدفة للأجسام المضادة: 1000
21			•	POLIMUN IB H120 (بوليمون IB H120)، التهاب الشعب الهوائية المعدي
22			•	POLIMUN IB MULTI (بوليمون IB مولتي)، التهاب الشعب الهوائية المعدي
23			•	POLIMUN IB VAR2 (بوليمون IB VAR2)، التهاب الشعب الهوائية المعدي
24			•	POLIMUN LA-SOTA (بوليمون LA-SOTA)، داء نيوكاسل
25			•	POLIMUN LA-SOTA+H120 (بوليمون LA-SOTA+H120)، داء نيوكاسل، التهاب الشعب الهوائية المعدي
26			•	POLIMUN ND CLON 124 (بوليمون ND CLON 124)، داء نيوكاسل
27			•	POLIMUN ND CLON 124 + IB H120 (بوليمون ND CLON 124 + IB H120)، داء نيوكاسل، التهاب الشعب الهوائية المعدي
28			•	POLIMUN ND HITCHNER B1 (بوليمون ND HITCHNER B1)، داء نيوكاسل
29			•	POLIMUN ND HITCHNER B1 + IB H120 (بوليمون ND HITCHNER B1 + IB H120)، داء نيوكاسل، التهاب الشعب الهوائية المعدي
30			•	POLIMUN REO 1133 (بوليمون REO 1133)، التهاب الأوتار والمفاصل الفيروسي
اللقاحات المعطلة				
31				POLIMUN LA-SOTA inac (بوليمون LA-SOTA معطل)، داء نيوكاسل الجديد
32			•	POLIMUN ND IB EDS (بوليمون ND IB EDS)، داء نيوكاسل، التهاب الشعب الهوائية المعدي، ومتلازمة نقص إنتاج البيض
33			•	POLIMUN ND EDS IB MAX (بوليمون ND EDS IB ماكس)، لقاح داء نيوكاسل، ومتلازمة نقص إنتاج البيض، التهاب الشعب الهوائية المعدي
34			•	POLIMUN ND inac (بوليمون ND معطل)، داء نيوكاسل
35			•	POLIMUN ND + IB inac (بوليمون ND + IB معطل)، داء نيوكاسل، التهاب الشعب الهوائية المعدي
36			•	POLIMUN REO 1133 (بوليمون REO 1133)، التهاب الأوتار والمفاصل الفيروسي
37			•	POLIMUN SALMO (بوليمون سالمو)، مرض السالمونيلا
مُؤشّر التلقيح الفموي				
38			•	INDIGO MAX (إنديجو ماكس)، منتج لتحضير المياه والتحكم في عملية التطعيم

ص				المنتجات
				اللقاحات للماشية
				اللقاحات الحية
39		•		BOVIMUN LSD (بوفيمون LSD)، مرض الجلد العقدي في الماشية
				اللقاحات المعطلة والمركبة
40		•		BOVIMUN 4 (بوفيمون 4)، التهاب الأنف والرغامى المعدي، الإسهال الفيروسي، نظيرة الإنفلونزا، الفيروس التنفسي المخلوي
41		•		BOVIMUN MAST (بوفيمون MAST)، التهاب الضرع لدى الأبقار
42		•		BOVIMUN NEO (بوفيمون نيو)، التهاب الأمعاء بالفيروس العجلي، وفيروس كورونا، والعدوى الإشريكية القولونية، وعدوى المظنية العسيرة لدى الأبقار
				اللقاحات للأرانب
				اللقاحات الحية
43	•			LAPIMUN MIX (لاييمون MIX) الورم المخاطي لدى الأرانب
				اللقاحات المعطلة والمركبة
48	•			LAPIMUN GEM (لاييمون GEM)، مرض نزف الأرانب الفيروسي
45	•			LAPIMUN GEM-2 (لاييمون 2-GEM)، مرض نزف الأرانب الفيروسي
46	•			LAPIMUN GEMIX (لاييمون GEMIX)، لقاح مرض نزف الأرانب الفيروسي والورم المخاطي
47	•			LAPIMUN GEMIX-3 (لاييمون 3-GEMIX)، لقاح مرض نزف الأرانب الفيروسي
				المحلول المذيب لللقاحات الحية
48				المحلول المذيب لللقاحات الحية
				أطقم التشخيص
49				RABITEST Kit (طقم رابيتست)، طقم من الغلوبولينات المناعية المضادة لداء الكلب، الفلورية
				لقاحات متعددة الأنواع
51				DEFENDER (ديفيندير)، لقاح داء الكلب، اللقاح المعطل الجديد

ص					المنتجات
المضادات الحيوية					
المحاليل الفموية					
52			•	•	ENROCOLIN (إنروكولين)، محلول إيتروفلوكساسين وكوليستين سulfates
53			•	•	ENROXAN-100 (إنروكسان-100)، محلول إيتروفلوكساسين
54				•	FLOCINE-100 (فلوسين-100)، محلول فلورفينيكول
55			•	•	TILMICON-250 (تيلميكون-250)، محلول تيلميكوسين
56			•	•	TRICOLIN (تريكولين)، محلول إيتروفلوكساسين وتريميثوبريم وكوليستين سulfates
للحقن					
57	•	•	•		AMOXAN PREMIUM (أموكسان بريميوم)، أموكسيسيلين تريهيدرات، مستحضر معلق، طويل المفعول، بحجم الميكرون
58			•		CLAMOXAN (كلاموكسان)، أموكسيسيلين وحمض كلافولانيك، مستحضر معلق
59	•	•	•		CEFTIFUR-50 (سيفتيفور-50)، سيفتيفور، مستحضر معلق
60			•		DANOXAN-25 (دانوكسان-25)، محلول دانوفلوكساسين
61	•	•	•		ENROXAN-50 (إنروكسان-50)، محلول إيتروفلوكساسين
62	•	•	•		ENROXAN-100 (إنروكسان-100)، محلول إيتروفلوكساسين
63			•		ENROXAN MAX (إنروكسان ماكس)، إيتروفلوكساسين، مستحضر معلق، طويل المفعول
64	•	•	•		FLOCINE-100 (فلوسين-100)، محلول فلورفينيكول
65	•	•	•		OTC-200 L.A. (أو تي سي-200 طويل المفعول)، محلول أوكسي تتراسيكلين، طويل المفعول
66	•	•	•		PHARMAXIN-200 (فارماكسين-200)، محلول تايلوزين تارتترات
67			•		SPECTRAN (سبيكتران)، أموكسيسيلين وبيتامتازون، مستحضر معلق
68		•	•		TILMICON-300 (تيلميكون-300)، محلول تيلميكوسين
69		•	•		TULAXAN (تولاكسان)، محلول تولاثروميسين، الجديد
المساحيق					
70				•	AMOXAN-500 (أموكسان-500)، مسحوق أموكسيسيلين تريهيدرات
71				•	CIPROCOLIN (سيبروكولين)، مسحوق سيروفلوكساسين وكوليستين سulfates
72			•	•	COLIDOXYN (كوليدوكسين)، مسحوق دوكسيسايكلين هيكلات وكوليستين سulfates
73			•		COLITYL-P (كوليتيل-P)، مسحوق تايلوزين تارتترات وكوليستين سulfates

ص					المنتجات
74			•	•	COLISTO 6M (كوليستو 6M)، مسحوق كوليسيتين سولفات
75			•	•	DOXAN-50 (دوكسان-50)، مسحوق دوكسيسايكلين هيكلات
76	•		•	•	PHARMADOX P (فارمادوكس P)، مسحوق دوكسيسايكلين هيكلات وتابلوزين تارترات
77				•	TIAM 45 (تيام 45)، مسحوق تيامولين هيدروجين فومارات
للاستخدام الخارجي					
79	•	•	•		FLOXY-SPRAY (فلوذا فلوكسي)، محلول فلورفينيكول والبنفسجي البلوري
منتجات مجمعة					
90			•		KETAFUR (كيتافور)، سيفتوفور هيدروكلوريد وكتوبروفين، مستحضر معلق
مضادات الالتهاب الستيرويدية					
81			•		KETOPRO-100 (كتوبرو-100)، محلول كيتوبروفين
82			•	•	TERMONORM (ترمونورم)، مسحوق حمض الأسيتيل ساليسيليك
كوكسيدايوستاتيك (مضادات الكوكسيديا)					
83	•	•	•	•	TOLTRASAN-50 (تولتراسان-50)، م محلول تولترازوريل القموي
مضادات الطفيليات					
84	•	•	•		CLOSIVERON (كلوزيفرون)، محلول كلوزانتيل وإيفيرمكتين للحقن
85		•	•		DORAN (دوران)، محلول دورامكتين الجديد
87	•	•	•		IVERON-10 (إيفيرون-10)، محلول إيفيرمكتين
المطهرات والمنظفات					
88	•	•	•		KETOSEPT CHLORINE (كيتوسبت كلورين)، عامل للمعالجة الصحية للضرع بعد الحلب
89	•	•	•		KETOSEPT IODINE (كيتوسبت أيودين)، عامل لعلاج الضرع بعد الحلب
90	•	•	•	•	FROST (فروست)، مانع تجمد للمطهرات
91	•	•	•		PEDISAN (بيديسان)، المحلول المطهر للحوافر
92	•	•	•	•	VIROCLEAN-800 (فيروكلين-800)، المنظف التقني
93	•	•	•	•	VIROCLEAN-KPM (فيروكلين-KPM)، المنظف التقني
94	•	•	•	•	VIROSAN (فيروسان)، محلول كلوريد البنزالكونيوم وغلوتارلديهايد
96	•	•	•	•	VIROSAN MAX (فيروسان ماكس)، محلول كلوريد البنزالكونيوم وغلوتارلديهايد
98	•	•	•	•	VIROSAN F (فيروسان F)، محلول كلوريد البنزالكونيوم وغلوتارلديهايد وفورمالديهايد
99	•	•	•	•	VIROSAN F2 (فيروسان F2)، محلول كلوريد البنزالكونيوم وغلوتارلديهايد وفورمالديهايد

ص					المنتجات
مجمعات الفيتامينات والمعادن					
100	•	•	•	•	AMINOVITOL (أمينوفيتول)، المحلول الفموي، مجمع الفيتامينات والمعادن
101	•	•	•	•	HEPACARNITOL (هيباكارنيتول)، المحلول الفموي
102	•	•	•		FERRUM+ (فيروم+)، ديكستران الحديد (III)، سيانوكوبالامين، حمض الفوليك، محلول الحقن ضد فقر الدم
103	•	•	•	•	L-CYN، فيتامين B12، فيتامين B3، إل-كارنتين وبوتافوسفان، محلول الحقن
منبهات المناعة					
105	•	•	•		STIMULUS (ستيمولوس)، مجمع المواد النشطة بيولوجيًا، منبه المناعة

الأدوية للحيوانات الأليفة

ص				المنتجات
المضادات الحيوية				
للحقن				
107		•	•	AMOXAN PREMIUM (أموكسان بريميوم)، أموكسيسيلين تريهيدرات، مستحضر معلق
108		•	•	CEFTIFUR-50 (سيفتيفور-50)، سيفتيفور، مستحضر معلق
109	•	•	•	ENROXAN-50 (إنروكسان-50)، محلول إيزوفلوكساسين
110		•	•	SPECTRAN (سبيكتران)، أموكسيسيلين وبيتاميثازون، مستحضر معلق
المساحيق				
111		•	•	CIPROCOLIN (سيبروكولين)، مسحوق سيبروفلوكساسين وكوليستين سulfates
للاستخدام الخارجي				
112		•	•	FLOXY-SPRAY MAX (رذاذ فلوكسي ماكس)، محلول فلورفينيكول والبنفسجي البلوري
المنتجات للنظافة				
113		•	•	OTO LOTION (غسل OTO)، محلول كلوريد البنزالكونيوم، ألتونين، أعشاب طبية
مجمعات الفيتامينات والمعادن				
114		•	•	AMINOVITOL (أمينوفيتول)، المحلول الفموي، مجمع الفيتامينات والمعادن
115		•		FERRUM+ (فيروم+)، ديكستران الحديد (III)، سيانوكوبالامين، حمض الفوليك، محلول الحقن ضد فقر الدم
116	•	•	•	L-CYN، فيتامين B12، فيتامين B3، إل-كارنتين وبوتافوسفان، محلول الحقن

ص				المنتجات
منبهات المناعة				
117		•	•	STIMULUS (ستيمولوس)، مجمع المواد النشطة بيولوجيًا، منه المناعة
القطرات للاستخدام الخارجي				
119		•	•	CIPRONORM (سيبرونورم)، قطرات العين والأذن، مستحضر معلق
120		•	•	CIPROX (سيبروكس)، قطرات، قطرات العين والأذن، محلول هيدروكلوريد سيبروفلوكساسين الجديد
121		•	•	OTOFLOX (أوتوفلوكس)، قطرات الأذن، محلول إيفرمكتين، كلوترمازول، فلورفينيكول وبيتاميتازون
122				TOBRANORM (توبرانورم)، محلول توبراميسين، الجديد
أدوية التخدير المسكنات				
123		•	•	RELAX (ريلاكس)، محلول الحقن، بروپوفول
125		•	•	ANTISTRESS (أنتي ستريس)، محلول فموي، فينيبوت
أدوية الجهاز البولي				
126		•	•	PHYTOCAT (فيتوكات)، المحلول الفموي، مستخلص مائي من مواد نباتية طبية
أدوية الجهاز التناسلي				
127		•	•	ANTILACT (أنتيلاك)، المحلول الفموي، مُستخلص مائي من مواد نباتية طبية
أدوية حماية الكبد				
128		•	•	HEPACARNITOL (هيباكارنيتول)، المحلول الفموي، دواء حماية الكبد
129		•	•	GEPAX (جيباكس)، مجفف بالتجميد للحقن، أداميتيون 4،-بوتان ثنائي السلفونات
مضادات للقيء				
130		•	•	MAROX (ماروكس)، (محلول للحقن) ماروبيتان، ال جديد



يعتمد النظام الصحيح لتحصين الدواجن على الجوانب التالية: اختبار سلالة اللقاح (بناءً على تحليل الوضع الوبائي في المزرعة)، توقيت وتكرار التطعيم (على أساس الحالة المناعية للقطيع، ومرّة أخرى، بناءً على الوضع الوبائي الراهن للمزرعة)، طريقة إعطاء الدواء (في المقام الأول، بناءً على إمكانيات المزرعة).

الجدول رقم 1. طرق إعطاء اللقاح

اسم المرض	طرق الإعطاء بترتيب الفعالية
استخدام اللقاحات الحية	
التهاب جراب فابريشيا (داء الغومبورو)	عن طريق مياه الشرب
داء نيوكاسل	- الرش بقطرات كبيرة (للجرعة الأولى)؛ - الرش بقطرات صغيرة (للجرعة)؛ - التقطير في العين أو الأنف؛ - عن طريق مياه الشرب.
التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج	- الرش بقطرات كبيرة (للجرعة الأولى) - الرش بقطرات صغيرة (للجرعة) - التقطير في العين أو الأنف - عن طريق مياه الشرب
جدري الطيور	الوخز في الجناح
التهاب الدماغ والنخاع الشوكي المعدي	- الوخز في الجناح - عن طريق مياه الشرب
التهاب المفاصل المعدي (الفيروسات التنفسية المعوية اليتيمة)	الحقن تحت الجلد، في الثلث الأسفل من الرقبة
استخدام اللقاحات المعطلة	
داء نيوكاسل	- عن طريق الحقن: - تحت جلد الرقبة - في عضلات الفخذ أو الصدر
التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج	- عن طريق الحقن: - تحت جلد الرقبة - في عضلات الفخذ أو الصدر
متلازمة نقص إنتاج البيض (EDS)	- عن طريق الحقن: - تحت جلد الرقبة - في عضلات الفخذ أو الصدر
مرض السالمونيلا	- عن طريق الحقن: - تحت جلد الرقبة، بين الجناحين - في منطقة عضلات الصدر
التهاب المفاصل المعدي (الفيروسات التنفسية المعوية اليتيمة)	- عن طريق الحقن: - تحت جلد الرقبة - في منطقة عضلات الصدر



التحصين عن طريق مياه الشرب

قبل بدء عملية التطعيم، يجب على الطبيب البيطري الإجابة على عدة أسئلة حول تقنية التطعيم بنفسه:

1. الوقت الذي تبدأ فيه الطيور في الشعور بالعطش قبل التطعيم.
2. الوقت المتوقع للأمل لتطعيم الطيور
3. الكمية المثل من محلول التركيز المستهدف لتطعيم الطيور.
4. تصريف نظام إمدادات المياه في الحظيرة قبل تطعيم الطائر.



5. تثبيت محلول التركيز المستهدف للقاح.

6. التحكم في تقنية تطعيم الطيور.

متطلبات المياه المستخدمة في عملية التطعيم

- يجب أن تكون المياه نظيفة وصالحة للشرب، وإذا أمكن ذلك عذبة، وخالية من أي مواد عضوية (رمل، طعام، إلخ).
- 7.2-pH 7.5 (درجة حموضة)
- يجب أن تكون المياه خالية من الكلور وأملاح المعادن الثقيلة وأي مطهرات أو منظفات.
- من أجل تحييد الكلور المتبقي وحماية الفيروس في اللقاح المخفف، يمكن استخدام مسحوق الحليب منزوع الدسم (2 جرام لكل لتر من الماء) أو لترين اثنين من الحليب منزوع الدسم لكل 100 لتر من الماء، أو ثيوكبريتات الصوديوم (16 ملغ لكل لتر من الماء). تُضاف هذه المنتجات قبل 10-15 دقيقة من تخفيف اللقاح.
- يسهل استخدام منتج "إنديجو ماكس" (وهو مثبت سائل وصيغة مياه) هذه العملية. يُستخدم بتركيز 100 مل لكل 1000 لتر من الماء.
- تتراوح درجة حرارة محلول التركيز المستهدف بين 12 و18 درجة مئوية.

قواعد التحصين عن طريق مياه الشرب


1. قبل التحصين، يجب حرمان الطيور من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين، من أجل تنشيط استهلاك الماء بعد توزيع اللقاح، مع الحفاظ على وصول الطيور إلى العلف.
2. وقت التحصين، تُعتبر ساعات الصباح وقت ذروة نشاط الطيور. يستمر ثبات الفيروس في البيئة المائية لفترة قصيرة ويبدأ بالانخفاض بعد ساعتين من تحضير المحلول.
3. وبناءً على ذلك، يجب أن تستغرق عملية التحصين بأكملها من ساعة ونصف إلى ساعتين.
3. تحضير المحلول الأم / محلول التركيز المستهدف لتطعيم الدواجن.
- لتخفيف اللقاح، تُستخدم المواد البلاستيكية فقط (مثل الدلاء والجراكن وغيرها) المخصصة للتحصين، والتي لم يتم تعقيمها، بل تم غسلها جيدًا.
- وهناك عدة طرق لحساب كمية الماء اللازمة لتحصين الدواجن.
1. كمية الماء التي يشربها الطائر خلال ساعتين من التطعيم تعادل عمر الطائر في يوم التطعيم.
- مثلاً، يشرب ككتوك عمره 17 يومًا 17 مل من الماء خلال ساعتين من التطعيم، ويشرب ككتوك عمره 25 يومًا 25 مل من الماء خلال ساعتين من التطعيم.
- هذه الطريقة ليست مثالية لقطعان دجاج التسمين.
2. يعتمد الحساب على عمر الطائر والمعامل التالي:
- V (حجم الماء، لتر) = عمر الطائر (أيام) * عدد الطيور (رؤوس) * المعامل،
- حيث يكون معامل التحويل:
- 1,7 - 1,5 (في الشتاء)؛ 2,0 - 1,7 (في الصيف)
- يجب شرب المحلول الأم في موعد لا يتجاوز 75-90 دقيقة، ولا يقل عن 45-60 دقيقة بعد خفض خطوط الشرب.
4. يُعتبر تصريف نظام الشرب (إزالة الماء) قبل التطعيم أحد الشروط الأساسية لتقنية التطعيم عن طريق مياه الشرب. ويتم ذلك بطريقة من الطريقتين: إما تفرغ الطيور خطوط من مياه الشرب تمامًا، أو يتم شطف خطوط إمداد المياه بشكل فعال تحت الضغط.
5. يتم تقييم جودة التطعيم عن طريق إضافة المثبت والصيغة "إنديجو ماكس" إلى محلول اللقاح. يتم بواسطته تقييم تدفق وتوزيع محلول اللقاح بصرًا، والتحكم في جودة عملية التطعيم من خلال درجة تلألؤ الأغشية المخاطية للحم والحواصل لدى الطيور الأزرق. يمكن تقييم جودة تطعيم الطيور بعد أول 50-60 دقيقة من بدء التطعيم، وذلك بالتحقق من وجود علامات زرقاء على لسان الطائر ومنقاره وحوصلته.
- يُعتبر التطعيم ناجحًا إذا كانت آثار الصبغة موجودة لدى 95% من الطيور.



التحصين عن طريق الرش

قواعد إجراء التطعيم عن طريق الرش

1. للتطعيم بالرش، يُستخدم جهاز الرش الآلي أو اليدوي (البخاخ) المزود بفوهات المعايرة ومنظم الضغط. يتم اختيار نوع الفوهة ومستوى الضغط بناءً على اللقاح المستخدم وعمر الطائر.
2. كمية الماء المستخدمة للتطعيم:



- ككتايت بعمر يوم واحد في صناديق - 200-300 مل / 1000 رأس
- طيور مربي على الأرض - 400-500 مل / 1000 رأس
- طيور مُربي في الأقفاص - 500-1000 مل / 1000 رأس
- 3. قبل التطعيم، يجب تجميع الطيور معًا على الأرض أو جمعها في صناديق (للككتايت بعمر يوم واحد).
- 4. يجب إطفاء جميع أنظمة التهوية والتدفئة، وإغلاق فتحات التهوية.
- 5. يجب خفض شدة الإضاءة، ولكن دون إطفائها.
- 6. قبل التطعيم، من اللازم التأكد من اتساق حجم القطرات وتجانس المحلول عن طريق رشه على أي سطح ذي لون متباين.
- 7. يجب رش محلول اللقاح على مسافة 30-40 سم تقريبًا فوق رؤوس الطيور، مع لفت انتباهها في الوقت نفسه. يجب أن يُرش محلول اللقاح على رؤوس الطيور أولاً (وعيونها ومنقيرها).
- 8. يُنصح بمعالجة القطيع مرتين.
- 9. للتحكم في جودة التطعيم، يُضاف إلى محلول اللقاح مثبت الصبغة "إنديجو ماكس". يتم تقييم جودة التطعيم من خلال التحقق من وجود صبغة زرقاء على ريش الطيور. وللتأكد من تبليل الطيور بالماء تمامًا، يجب تمرير اليد عليها.
- التطعيم بطريقة القطرات الكبيرة:
- يتم تلقيح الككتايت من عمر يوم واحد.
- يجب أخذ 200-400 مل من الماء لكل 1000 جرعة.
- حجم القطرة: 150-250 ميكرومتر.
- بعد الرش، تُحفظ الككتايت لمدة 15-20 دقيقة في غرفة مغلقة جيدة التدفئة بعيدًا عن تيارات الهواء حتى تجف تمامًا.
- التطعيم بطريقة القطرات الصغيرة:
- يتم تلقيح الككتايت من عمر 12 يومًا.
- يجب أخذ 400-500 مل من الماء لكل 1000 جرعة.
- حجم القطرة: 100-150 ميكرومتر.
- بعد الرش، تُحفظ الككتايت لمدة 15-20 دقيقة في غرفة مغلقة جيدة التدفئة بعيدًا عن تيارات الهواء حتى تجف تمامًا.

التطعيم عن طريق التقطير في العين

يتم استخدامه للطيور من عمر يوم واحد.

يمكن استخدام المحلول الملحي أو الماء النقي المقطر/ المغلي كمحلول مذيّب.

يتم تخفيف اللقاح بمعدل 1000 جرعة لكل 30-50 مل من الماء (تعتمد الكمية الدقيقة للمحلول المذيّب على نوع القطارة).

لتحديد الكمية الدقيقة للمحلول المذيّب، يجب اختبار القطارة. يمكن اختبارها باستخدام الماء دون إضافة اللقاح

عن طريق حساب عدد القطرات المماثلة لـ 5 أو 10 مل من الماء. بعد ذلك، يتم حساب حجم التخفيف المطلوب لـ 1000 جرعة.

قواعد إجراء التحصين عن طريق التقطير في العين

1. يجب خفض الإضاءة أثناء العمل.
2. يجب تشغيل التهوية والتدفئة.
3. يقوم المشغلون بإمسك الطيور وتسليمها إلى القائمين بالتطعيم.
4. يجب حمل الطائر بحيث يكون رأسه في وضع جانبي وسطح العين بوضوح أفقي.
5. يجب على القائمين بالتطعيم أن يمسك الزجاجة عموديًا ويعطي قطرة واحدة لكل طائر دون لمس سطح العين.
6. من اللازم الانتظار بضع ثوانٍ حتى ينتشر اللقاح.

التطعيم عن طريق التقطير في الأنف

يتم استخدامه للطيور من عمر يوم واحد.

يمكن استخدام المحلول الملحي أو الماء النقي المقطر/ المغلي كمحلول مذيّب.

يتم إذابة اللقاح بمعدل 1000 جرعة لكل 100 مل من المحلول المذيّب، و2500 جرعة لكل 250 مل، و5000 جرعة لكل 500 مل.

لتحديد الكمية الدقيقة للمحلول المذيّب، يجب اختبار القطارة. يمكن اختبارها باستخدام الماء دون إضافة اللقاح

عن طريق حساب عدد القطرات المماثلة لـ 5 أو 10 مل من الماء. بعد ذلك، يتم حساب حجم التخفيف المطلوب لـ 1000 جرعة.





قواعد إجراء التحصين عن طريق التقطير في الأنف

1. يجب خفض الإضاءة أثناء العمل.
2. يجب تشغيل التهوية والتدفئة.
3. يقوم المشغلون بإمساك الطيور وتسليمها إلى القائمين بالتطعيم.
4. يجب حمل الطائر بحيث يكون رأسه في وضع جانبي ووسط العين بوضع أفقي.
5. يجب على القائم بالتطعيم أن يمسك الزجاجة عمودياً ويعطي قطرة واحدة في كل فتحة أنف للطير من جميع الأعمار، مع إغلاق فتحة الأنف الأخرى بإصبعه.
6. من اللازم الانتظار بضعة ثوانٍ حتى ينتشر اللقاح.



التحصين عن طريق الوخز في الجناح

يتم الوخز في جلد الجناح عند اتصاله بالجسم بالإبرة المزدوجة الخاصة يتم تحميلها بمحلول اللقاح مسبقاً. أما المحلول المذيب، فيُستخدم محلول مذيبي خاص من الشركة المنتجة للقاح. يتم إذابة 1000 جرعة من اللقاح في القارورة في 10 مل من المحلول المذيب، و500 جرعة من اللقاح في 5 مل من المحلول المذيب.

قواعد إجراء التحصين عن طريق الوخز في الجناح

1. يجب خفض الإضاءة أثناء العمل.
2. يجب تشغيل التهوية والتدفئة.
3. يقوم المشغلون بإمساك الطيور وتسليمها إلى القائمين بالتطعيم.
4. يجب حمل الطائر بحيث يمكن سحب أحد جناحيه إلى الجانب.
5. يقوم القائم بالتطعيم بتحميل الإبر بمحلول اللقاح، ثم يخز الغشاء الجلدي من داخل الجناح، مع الحرص على عدم لمس ريش الطائر بالأداة.
6. من الضروري تجنب وخز الأوردة والعضلات والعظام والمفاصل.
7. يتم تقييم جودة التطعيم من خلال التحقق من وجود لون أزرق للجلد في مكان الوخز بالقاح.



قد يحدث رد الفعل الناتج عن إدخال فيروس الجدري بعد 5-7 أيام من التطعيم، ويتسم بتكوين تورم تحت الجلد والطفح الجلدي على السطحين الخارجي والداخلي لجناح الطائر في مكان الوخز، والتي تختفي في غضون أسبوعين، وتشير إلى نجاح التطعيم.

اللقاحات. عند إعطاء اللقاحات المعطلة، يُنصح بترك زجاجات اللقاح في درجة حرارة الغرفة (25-20 درجة مئوية) لمدة 12 ساعة على الأقل لتحسين سيولة اللقاح.

الحقنة الأوتوماتيكية. يجب فحص الحقنة الأوتوماتيكية قبل التطعيم وأثناءه. قبل التطعيم، يتم التحقق من دقة جرعة الحقنة باستخدام الماء. يتم الضغط على الحقنة 10 مرات (جرعات حقن)، ثم يوجه الماء إلى أنبوب حقنة أخرى. يجب أن يتوافق الحجم الإجمالي مع حجم 10 جرعات. إذا لم يكن الحجم المقاس دقيقًا، فيجب تعديل الحقنة للحصول على حجم الجرعة المطلوبة. فمثلاً، 10 حقن بـ0,5 مل تعادل حجم 5 مل.

الإبر. يتم اختيار مقاس الإبرة بناءً على نوع اللقاح المستخدم وعمر الطائر. على سبيل المثال، للقاحات المعطلة المضاف إليها مادة مساعدة زيتية، تُستخدم الإبر بمقاسات: 1,0*10,0 مم (8/19G*3) أو 1,0*13,0 مم (2/19G*1). يجب تغيير الإبر كل 800-1000 حقنة.

الحقن.

يتم إعطاء الحقن العضلي في الفخذ أو العضلات المحيطة بعظم القص. تُدخل الإبر بشكل عمودي على الجلد في الجزء الأكثر لحمًا بعيدًا عن العظام. ثم يجب الضغط على المكبس لحقن جرعة اللقاح.



تُعطى الحقن تحت الجلد عند قاعدة الرقبة، مع تجنب البنى الرئيسة (مثل الفقرات والعمود الفقري)، أو بين الجناحين. بعد شد رقبة الطائر، يسحب العامل الجلد عن طريق سحبه برفق على الريش، ثم يحقنه عند النقطة المشدودة. يُحقن الدواء موازيًا لطية الجلد. يجب الحرص على عدم ثقب الجلد مرتين، وإلا سيُحقن اللقاح خارج جسم الطائر.





في قوارير زجاجية أو بلاستيكية سعة 500 و1000 جرعة من اللقاح.
المحلول المذيب في قوارير
5 و10 مل لكل 500 و1000 جرعة من اللقاح، على التوالي

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس التهاب الدماغ والنخاع الشوكي عند الدواجن، سلالة Calnek 1143 على الأقل $10^{3,0}$ TCID₅₀ محلول مذب.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد ومحلول مذب.

الخصائص المناعية

تتشكل الأجسام المضادة الواقية بعد 2-3 أسابيع من التطعيم، وتحمي الطائر من العدوى خلال فترة وضع البيض، وكذلك صغار الطيور الملقحة في الأسابيع الأولى من حياتها.

أنواع الطيور

الدجاج، ابتداءً من 8 أسابيع من العمر.

مؤشرات الاستخدام

الوقاية من التهاب الدماغ والنخاع عند الدواجن.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يُستخدم في 28 يومًا قبل وضع البيض وأثناءه.

طرق الاستخدام

جرعة واحدة لكل رأس عن طريق مياه الشرب أو الحقن في جلد الجناح.



Birds age

starting from 8 weeks of age

ابتداءً من عمر 8 أسابيع



إعطاء اللقاح: عن طريق مياه الشرب أو الحقن في جلد الجناح.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

اللقاح والمحلول المذيب صالحان للاستخدام لمدة 18 شهرًا. اللقاح بعد الإذابة صالح للاستخدام لمدة 6 ساعات.

شروط التخزين والنقل

يُحفظ اللقاح في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو -20 درجة مئوية.

يُحفظ المحلول المذيب في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية.



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية سعة 500 و1000 جرعة من اللقاح.
المحلول المذيب في قوارير
5 و10 مل لكل 500 و1000 جرعة من اللقاح، على التوالي

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس جدرى الطيور، سلالة Cutter على الأقل $10^{2.8}$ TCID₅₀.
المحلول المذيب.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد ومحلول مذيب.

الخصائص المناعية


تشكل الأجسام المضادة الواقية بعد 2-3 أسابيع من التطعيم، وتحمي الطائر من العدوى خلال فترة وضع البيض، وكذلك صغار الطيور الملقحة في الأسابيع الأولى من حياتها. قد يحدث رد الفعل الناتج عن إدخال فيروس الجدرى بعد 5-7 أيام من التطعيم، ويتم بتكوين تورم تحت الجلد والطفح الجلدي على السطحين الخارجي والداخلي لجناح الطائر في مكان الوخز، والتي تختفي في غضون أسبوعين، وتشير إلى نجاح التطعيم.

مؤشرات الاستخدام

الوقاية من جدرى الطيور.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يُستخدم في 28 يوماً قبل وضع البيض وأثناءه.
طريقة الإعطاء والجرعة
جرعة واحدة لكل طائر



إعطاء اللقاح: عن طريق الحقن في جلد الجناح.

فترة الانسحاب

14 يوماً.

مدة الصلاحية

اللقاح والمحلول المذيب صالحان للاستخدام لمدة 18 شهراً. اللقاح بعد الإذابة صالح للاستخدام لمدة 6 ساعات.

شروط التخزين

يُحفظ اللقاح في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من 2+ إلى 8+ درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.
يُحفظ المحلول المذيب في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من 2+ إلى 8+ درجات مئوية.



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية سعة 500 و 1000 جرعة من اللقاح.
المحلول المذيب في قوارير
5 و 10 مل لكل 500 و 1000 جرعة من اللقاح، على التوالي

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على الفيروسات التالية:
فيروس التهاب الدماغ والنخاع الشوكي عند الدواجن سلالة Calnek 1143 على الأقل $10^{2,5}$ EID₅₀;
فيروس جذري الطيور سلالة Cutter على الأقل $10^{2,8}$ EID₅₀;
المحلول المذيب.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد ومحلول مذيب.

الخصائص المناعية

تتشكل الأجسام المضادة الوقائية بعد 2-3 أسابيع من التطعيم، وتحمي الطائر من العدوى خلال فترة وضع البيض. قد يحدث رد الفعل الناتج عن إدخال فيروس
الجذري بعد 5-7 أيام من التطعيم، ويتسم بتكوين تورم تحت الجلد والطفح الجلدي على السطحين الخارجي والداخلي لجناح الطائر في مكان الوخز، والتي
تختفي في غضون أسبوعين، وتشير إلى نجاح التطعيم.

نوع الطيور


الدجاج، الديك الرومي.

مؤشرات الاستخدام

الوقاية من التهاب الدماغ والنخاع الشوكي وجذري الطيور.
تعليمات خاصة لفترة وضع البيض
لا يُستخدم في 28 يومًا قبل وضع البيض وأثناءه.

طريقة الإعطاء والجرعة

جرعة واحدة لكل طائر



إعطاء اللقاح: عن طريق الحقن في جلد الجناح.

مدة الصلاحية

اللقاح والمحلول المذيب صالحان للاستخدام لمدة 18 شهرًا. اللقاح بعد الإذابة صالح للاستخدام لمدة 6 ساعات.

شروط التخزين

يُحفظ اللقاح في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية. يُحفظ المحلول المذيب في مكان
مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية.

POLIMUN IBD LIGHT (بوليمون IBD لايت)



لقاح التهاب جراب فابريشيا - داء الغومبورو عند الدواجن،
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000، 2000 أو 5000 جرعة من اللقاح

المكونات

فيروس التهاب جراب فابريشيا - داء الغومبورو المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج، سلالة MB/20 على الأقل
EID₅₀ 10^{4.2} في كل جرعة. الشكل الصيدلاني لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يعمل فيروس اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة في الطيور التي تم تطعيمها ضد التهاب جراب فابريشيا - داء الغومبورو خلال أسبوع إلى أسبوعين.
نوع الطيور
الدجاج.


مؤشرات الاستخدام

الوقاية من التهاب جراب فابريشيا - داء الغومبورو.

طريقة الإعطاء والجرعة

جرعة واحدة لكل طائر.

يتم تحديد مواعيد التطعيم المثالية بناءً على نسبة الأجسام المضادة للأم، والتي يجب أن تكون 500 في ELISA وIDEXX. وعند الضرورة (بسبب تباين عالٍ في
الأجسام المضادة للأم)، يتم تطعيم الدجاج مرتين. إذا لم يكن من الممكن تحديد تاريخ التطعيم بالوسائل المخبرية، فيجب استخدام التواريخ التالية:



إعطاء اللقاح: عن طريق مياه الشرب.

ملاحظة: يحتوي اللقاح على أنسجة، ولذلك عند إذابته في القارورة، قد يتم ملاحظة بقايا أنسجة صغيرة من الأنسجة الجنينية المتجانسة.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

يُحفظ اللقاح في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من 2+ إلى 8+ درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.

التهاب جراب فابريشيا - داء الغومبورو عند الدواجن،
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000، 2000 أو 5000 جرعة من اللقاح

المكونات

المكونات الفعالة في كل جرعة:
يحتوي اللقاح على فيروس التهاب جراب فابريشيا - داء الغومبورو المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج، سلالة MB/5 على الأقل $10^{8.2}$ EID₅₀.
المكونات المساعدة:
بيبتون أو L-HB بـ120 ملغ في كل قارورة.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يحمي اللقاح الطيور التي تم تطعيمها من التهاب جراب فابريشيا - داء الغومبورو. ليس له خصائص علاجية.

نوع الطيور

الدجاج.

مؤشرات الاستخدام

الوقاية من التهاب جراب فابريشيا - داء الغومبورو.

طريقة الإعطاء والجرعة

جرعة واحدة لكل طائر.

يتم تحديد مواعيد التطعيم المثالية بناءً على نسبة الأجسام المضادة للأم، والتي يجب أن تكون 800 في ELISA وIDEXX. وعند الضرورة (بسبب تباين عالٍ في الأجسام المضادة للأم)، يتم تطعيم الدجاج مرتين. إذا لم يكن من الممكن تحديد تاريخ التطعيم بالوسائل المختبرية، فيجب استخدام التواريخ التالية:



إعطاء اللقاح: عن طريق مياه الشرب.

ملاحظة: يحتوي اللقاح على أنسجة، ولذلك عند إذابته في القارورة، قد يتم ملاحظة بقايا أنسجة صغيرة من الأنسجة الجنينية المتجانسة.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. يجب استخدام اللقاح خلال ساعتين من إذابته.

شروط التخزين

يُحفظ اللقاح في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.

لقاح التهاب جراب فابريشيا - داء الغومورو عند الدواجن،
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000، 2000 أو 5000 جرعة من اللقاح

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس التهاب جراب فابريشيا - داء الغومورو المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج، سلالة MB/3 على الأقل 10^{4.2} EID₅₀

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يعمل فيروس اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة في الطيور التي تم تطعيمها ضد التهاب جراب فابريشيا - داء الغومورو خلال أسبوع إلى أسبوعين.

نوع الطيور

الدجاج.


مؤشرات الاستخدام

الوقاية من التهاب جراب فابريشيا - داء الغومورو عند الدواجن.

طريقة الإعطاء والجرعة

جرعة واحدة لكل طائر.

يتم تحديد مواعيد التطعيم المثالية بناءً على نسبة الأجسام المضادة للآم، والتي يجب أن تكون 1000 في ELISA و ID₅₀. إذا لم يكن من الممكن تحديد تاريخ التطعيم بالوسائل المختبرية، فيجب استخدام التواريخ التالية:



إعطاء اللقاح: عن طريق مياه الشرب.

ملاحظة: يحتوي اللقاح على أنسجة، ولذلك عند إذابته في القارورة، قد يتم ملاحظة بقايا أنسجة صغيرة من الأنسجة الجنينية المتجانسة.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

يُحفظ اللقاح في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من 2+ إلى 8+ درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.



لقاح التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج،
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 و 2000 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج، سلالة H120 على الأقل $10^{3.5}$ EID₅₀.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يعمل فيروس اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة عند الطيور التي تم تطعيمها في 7-10 أيام، ويحمي الكناكيت التي تم تطعيمها من المرض خلال 6-7 أسبوع.

نوع الطيور

الدجاج.

مؤشرات الاستخدام

الوقاية من التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج.

تعليمات خاصة (لفترة وضع البيض)

لا يؤثر استخدام اللقاح في إنتاج البيض أو الإخصاب أو حضن البيض.

طريقة الإعطاء والجرعة

جرعة واحدة لكل طائر.



chickens from day-old

Birds age

الطيور من عمر يوم واحد



إعطاء اللقاح: عن طريق الرش أو مياه الشرب.

فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من 2+ إلى 8+ درجات مئوية.



التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج
سلالة H120 و B/793.
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000، 2000 أو 5000 جرعة من اللقاح

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على الفيروسين المستخرجين من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج:
سلالة H120 على الأقل 3,5 lg EID₅₀; (سلالة ماساتشوستس Mass) فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي سلالة B/793 على الأقل 3,5 lg EID₅₀;

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يعمل فيروس اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة عند الطيور التي تم تطعيمها في 7-10 أيام، ويحمي الكتاكيت التي تم تطعيمها من المرض خلال 6-7 أسابيع.

نوع الطيور

الدجاج.

مؤشرات الاستخدام


الوقاية من التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج.

تعليمات خاصة (لفترة وضع البيض)

لا يؤثر استخدام اللقاح في إنتاج البيض أو الإخصاب أو حضن البيض.

طريقة الإعطاء والجرعة

جرعة واحدة لكل طائر.



إعطاء اللقاح: عن طريق الرش بقطرات كبيرة، أو التقطير في العين أو الأنف، أو عن طريق مياه الشرب.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهرًا، ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.



لقاح التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج
سلالة VAR2/V2.
اللقاح الحي

في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000، 2000 أو 5000 جرعة من اللقاح

المكونات

المكونات الفعالة في كل جرعة:
فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج سلالة VAR2/V2 على الأقل 3.5 lg EID₅₀

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة في 21 يوماً من إعادة التطعيم، ويحمي الكتاكيت التي تم تطعيمها من المرض خلال 6-7 أسابيع.

أنواع الحيوانات

الدجاج.

مؤشرات


الوقاية من التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج.

تعليمات خاصة (خلال فترة وضع البيض)

لا يُستخدم اللقاح في الدواجن في 4 أسابيع قبل وضع البيض وأثناءه. لا يؤدي التطعيم الطارئ خلال فترة وضع البيض إلى انخفاض الإنتاجية.

طرق الاستخدام

جرعة واحدة لكل طائر.



إعطاء اللقاح: عن طريق الرش بقطرات كبيرة، أو التقطير في العين أو الأنف، أو عن طريق مياه الشرب.
تحذير: يُعتبر إعطاء اللقاح عن طريق مياه الشرب هو الأقل فعالية مقارنة بالطرق الأخرى المقترحة.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهراً. ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من 2+ إلى 8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.

لقاح داء نيوكاسل،
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 و 2000 و 2500 و 5000 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس داء نيوكاسل، المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج، سلالة LA-SOTA على الأقل $10^{6.0}$ EID₅₀

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يحمي اللقاح الطيور التي تم تطعيمها من داء نيوكاسل.

أنواع الطيور


الدجاج.

مؤشرات الاستخدام

التحصين الوقائي للدجاج ضد داء نيوكاسل.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا توجد موانع.



طريقة الإعطاء والجرعة

جرعة واحدة لكل طائر.

إعطاء اللقاح: عن طريق الرش بقطرات كبيرة، أو التقطير في العين أو الأنف، أو عن طريق مياه الشرب.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. يجب استخدام اللقاح في غضون ساعتين بعد إعادة التكوين.

شروط التخزين والنقل

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.

لقاح داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج.
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 و 2000 و 2500 و 5000 جرعة

المكونات

يحتوي اللقاح على الفيروسين المستخرجين من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج:
فيروس داء نيوكاسل سلالة LA-SOTA على الأقل $10^{6.0}$ EID₅₀
فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج سلالة H120

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يعمل فيروس اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة في الطيور خلال 10-14 يومًا من عملية التطعيم

أنواع الطيور

الدجاج.

مؤشرات الاستخدام


الوقاية من داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يؤثر استخدام اللقاح في إنتاج البيض أو الإخصاب أو حضن البيض سلبًا.

طرق الاستخدام

جرعة واحدة لكل طائر.



إعطاء اللقاح: عن طريق الرش بقطرات كبيرة، أو التقطير في العين أو الأنف، أو عن طريق مياه الشرب.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. 10 ساعات من أول استخدام للقاح.

شروط التخزين والنقل

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.



لقاح داء نيوكاسل،
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 و 2000 و 2500 و 5000 جرعة

المكونات

المكونات الفعالة:

فيروس داء نيوكاسل المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج، سلالة LA-SOTA CLONE 124 على الأقل $10^{6.0}$ EID₅₀ في كل جرعة.
المكونات المساعدة: مسحوق الحليب منزوع الدسم أو بيببتون (أقل من أو يساوي 70%).

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية


يحمي اللقاح الطيور التي تم تطعيمها من داء نيوكاسل.

نوع الطيور

الدواجن.

مؤشرات الاستخدام

الوقاية من داء نيوكاسل.



الاستخدام في فترة وضع البيض

لا يؤثر استخدام اللقاح في إنتاج البيض أو الإخصاب أو حضن البيض سلبياً.
إعطاء اللقاح: عن طريق الرش بقطرات كبيرة، أو التقطير في العين أو الأنف، أو عن طريق مياه الشرب.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهراً، ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.



لقاح داء نيوكاسل
والتهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج.
اللقاح الحي

في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 و 2000 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على الفيروسين المستخرجين من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج:
استنساخ فيروس داء نيوكاسل سلالة CLON 124 على الأقل $EID_{50} 10^{6,0}$;
فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج سلالة H120 على الأقل $EID_{50} 10^{3,5}$.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة في الطيور خلال 10-14 يومًا من عملية التطعيم، ويحمي الطيور من داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي.

نوع الطيور


الدجاج.

مؤشرات استخدام

الوقاية من داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي.

الاستخدام في فترة وضع البيض

لا يؤثر استخدام اللقاح في إنتاج البيض أو الإخصاب أو حضن البيض سلبًا.



طريقة الإعطاء والجرعة

إعطاء اللقاح: عن طريق الرش بقطرات كبيرة، أو التقطير في العين أو الأنف، أو عن طريق مياه الشرب.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.

لقاح داء نيوكاسل،
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 و 2000 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس داء نيوكاسل المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج، سلالة HITCHNER B1 على الأقل $10^{6,0}$ EID₅₀.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تكوين المناعة ضد داء نيوكاسل عند الطيور التي تم تطعيمها في 7-10 أيام من عملية التطعيم.

نوع الطيور


الدواجن.

مؤشرات الاستخدام

الوقاية من داء نيوكاسل.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يؤثر استخدام اللقاح في إنتاج البيض أو الإخصاب أو حضن البيض.



إعطاء اللقاح: عن طريق الرش بقطرات كبيرة، أو التقطير في العين أو الأنف، أو عن طريق مياه الشرب.

فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهرًا، ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.



لقاح داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج.
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 و 2000 و 5000 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على الفيروسين المستخرجين من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج: فيروس داء نيوكاسل سلالة HITCHNER B1 على الأقل $10^{6,0}$ EID₅₀.

فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج سلالة H120 على الأقل $10^{3,5}$ EID₅₀.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة في الطيور خلال 10-14 يومًا من عملية التطعيم، ويحمي الطيور من داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي.

نوع الطيور


الدجاج.

مؤشرات استخدام

الوقاية من داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدجاج.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يؤثر استخدام اللقاح في إنتاج البيض أو الإخصاب أو حضن البيض.



طريقة الإعطاء والجرعة

إعطاء اللقاح: عن طريق الرش بقطرات كبيرة، أو التقطير في العين أو الأنف، أو عن طريق مياه الشرب.

فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

يُحفظ في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية أو إلى -20 درجة مئوية.

لقاح التهاب الأوتار والمفاصل الفيروسي عند الدواجن،
اللقاح الحي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 500 و 1000 و 2000 جرعة من اللقاح؛
المحلول المذيب في قوارير سعة 100 و 200 و 400 مل على التوالي

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس الريو المستخرج من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج سلالة S-1133 على الأقل $10^{3,5}$ TCID₅₀؛
المحلول المذيب.

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد ومحلول مذب.

الخصائص المناعية

يعمل فيروس اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة لدى الدواجن في 7-10 أيام، مما يحمي الطيور الصغيرة التي تم تطعيمها من التهاب الأوتار والمفاصل الفيروسي لمدة تصل إلى 3 أشهر.

نوع الطيور

دواجن.

مؤشرات الاستخدام

للقاية من التهاب الأوتار والمفاصل الفيروسي.


تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يتم تطعيم الطيور قبل أسبوعين من بدء فترة وضع البيض.

طرق الاستخدام

جرعة واحدة - 0,2 مل لكل طائر.

إعادة التطعيم خلال 42-49 يومًا



إعطاء اللقاح: بالحقن تحت الجلد في أسفل الرقبة.

فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم.

مدة الصلاحية

اللقاح والمحلول المذيب - 18 شهرًا، ساعتان بعد إذابة اللقاح.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية.

POLIMUN LA-SOTA INAC (بوليمون LA-SOTA، اللقاح المعطل)



لقاح داء نيوكاسل،
اللقاح المعطل.



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 و2000 و2500 و5000 جرعة

المكونات

يحتوي 0,1 مل من اللقاح على:
المكونات الفعالة:

المستضد المعطل لفروس داء نيوكاسل سلالة La-Sota الذي يحفز تكوين أجسام مضادة محددة في عبارات: على الأقل $HI \ 4,5 \log_2$ *
* HI - عيار الأجسام المضادة تم تحديده بمقايضة التراص الدموي.

المكونات المساعدة:

المادة المعطلة - فورمالديهايد أقل من أو يساوي 50 ميكروغرام (mcg) أو أزيدين (ليس مكوثًا للمنتج النهائي).

المادة المساعدة: البارافين السائل الخفيف.

المادة الحافظة: ثيوميرسال أقل من أو يساوي 10 ميكروغرام (mcg).

الشكل الصيدلاني

مستحلب

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة في الطيور ضد داء نيوكاسل، ابتداءً من اليوم الـ14 بعد إعطائه. ليس له أي خصائص علاجية.

النوع من الحيوانات

الدواجن (الدجاج والحمام).

مؤشرات الاستخدام

للتحصين الوقائي للدواجن ضد داء نيوكاسل.

طريقة الإعطاء والجرعة

يتم إعطاء اللقاح للدواجن من عمر يوم واحد عن طريق الحقن العضلي في الفخذ أو الصدر أو تحت الجلد في منطقة الرقبة.

حجم الجرعة الموصى به للدجاج من مختلف الأعمار:


70-1 يومًا من العمر - 0,1-0,2 مل؛

ما فوق 70 يومًا من العمر - 0,2-0,3 مل.

حجم جرعة اللقاح الموصى به للحمام 0,2 مل، ابتداءً من عمر 28 يومًا.

الآثار الجانبية

لا يسبب اللقاح أي استجابة سريرية ملحوظة عند إعطائه.



طرق الاستخدام

الجرعة الزائدة

إن إعطاء جرعتين من اللقاح لا يؤثر سلبيًا على الطائر.

فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. يجب استخدام اللقاح خلال أول 10 ساعات بعد فتح القارورة وأول استخدام له. التعليمات الخاصة بشأن التخزين

شروط التخزين والتقليل

يُحفظ في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية. لا تجميد!



لقاح داء نيوكاسل، والتهاب الشعب الهوائية المعدي، ومتلازمة نقص إنتاج البيض، اللقاح المعطل، مستحلب

في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 جرعة



المكونات

تحتوي كل جرعة قبل التعطيل على الأقل على:
فيروس داء نيوكاسل سلالة LA-SOTA - على الأقل $4.0 \log_{10}$ HI*;
فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي سلالة ماساتشوستس (Mass) - على الأقل $4.0 \log_{10}$ HI;
HI* - عيار الأجسام المضادة تم تحديده بمقايضة التراص الدموي.

الشكل الصيدلاني

مستحلب.

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة ضد داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي ومتلازمة نقص إنتاج البيض لدى الدواجن في 21-28 يومًا، وتستمر تلك المناعة لمدة 60 أسبوعًا على الأقل بعد التطعيم.

نوع الطيور


الدجاج.

مؤشرات الاستخدام

للقاية من داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي ومتلازمة نقص إنتاج البيض لدى الدجاج.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يتم تطعيم الدواجن في فترة وضع البيض.
طريقة الإعطاء والجرعة



إعطاء اللقاح: بالحقن العضلي (في عضلات الفخذ أو الصدر) أو تحت الجلد (في أسفل الرقبة) للدجاج في موعد أقصاه 30 يومًا قبل بدء فترة وضع البيض.
فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم. يمكن استخدام منتجات الدواجن بغض النظر عن فترة التطعيم، مع إزالة بقايا اللقاح.

مدة الصلاحية

24 شهرًا، بعد فتح القارورة وأول استخدام اللقاح: 10 ساعات.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية. لا تجميد.

POLIMUN ND EDS IB MAX (بوليمون ND EDS IB ماكس)



لقاح داء نيوكاسل،

ومتلازمة نقص إنتاج البيض، والتهاب الشعب الهوائية المعدي،

اللقاح المعطل،

مستحلب

في قوارير زجاجية أو بلاستيكية سعة 1000 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح (0,5 مل) على مستضدات معطلة تحفّز تكوين أجسام مضادة محددة بعيارات:

فيروس داء نيوكاسل سلالة LA-SOTA - على الأقل $4,5 \log_{10}$ HI*؛

فيروس متلازمة نقص إنتاج البيض سلالة EDS-76 - على الأقل $7,0 \log_{10}$ HI. فيروسات التهاب الشعب الهوائية المعدي:

سلالة ماساتشوستس (M-41) - على الأقل $5,0 \log_{10}$ HI؛ سلالة B/793 - على الأقل $4,0 \log_{10}$ HI؛

سلالة VAR2/V2 (مجموعة VAR2) - على الأقل $4,0 \log_{10}$ HI.

* HI - عيار الأجسام المضادة تم تحديده بمقايضة التراص الدموي.

الشكل الصيدلاني

مستحلب.

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة ضد داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي ومتلازمة نقص إنتاج البيض لدى الدواجن في 21-28 يومًا، وتستمر تلك المناعة مدى الحياة.

نوع الطيور

الدجاج.

مؤشرات الاستخدام

للقائية من داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي ومتلازمة نقص إنتاج البيض لدى الدجاج.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يتم تطعيم الدواجن في فترة وضع البيض.

إعطاء اللقاح: بالحقن العضلي (في عضلات الفخذ أو الصدر) أو تحت الجلد (في أسفل الرقبة) للدجاج في موعد أقصاه 30 يومًا قبل بدء فترة وضع البيض.

فترة الانسحاب (الانتظار)


صفر يوم. يمكن استخدام منتجات الدواجن بغض النظر عن فترة التطعيم، مع إزالة بقايا اللقاح.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. بعد فتح القارورة وأول استخدام اللقاح: 10 ساعات.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية. لا تجميد.





في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000، 2000 أو 5000 جرعة من اللقاح

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس داء نيوكاسل سلالة LA-SOTA CLONE 124 على الأقل $10^{4.9}$ EID₅₀ المواد المساعدة الزيتية والسواغات.

الشكل الصيدلاني

مستحلب.

الخصائص المناعية


يحمي اللقاح الطيور التي تم تطعيمها من مرض نيوكاسل ابتداءً من اليوم الـ 14 من تاريخ التطعيم.

أنواع الحيوانات

الدواجن (الديوك الرومية والدجاج والحمائم).

مؤشرات الاستخدام

للوفاة من داء نيوكاسل لدى الدواجن.



تعليمات خاصة لفترة وضع البيض
لا تنطبق.

طرق الاستخدام

جرعة واحدة - 0,1 مل لكل طائر.

إعطاء اللقاح: بالحقن تحت الجلد (في الثلث الأعلى من الرقبة) أو بالحقن العضلي (في عضلات الفخذ أو الصدر).

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. بعد فتح القارورة وأول استخدام اللقاح: 3 ساعات.

شروط التخزين والنقل

يُحفظ اللقاح عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية، في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تجميد!



لقاح داء نيوكاسل
والتهاب الشعب الهوائية المعدي،
اللقاح المعطل

في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 1000 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح (0,5 مل) على مستضدات معطلة تحفّز تكوين أجسام مضادة محددة بعبارة:
فيروس داء نيوكاسل سلالة LA-SOTA على الأقل $4,5 \log_2$ HI*؛
فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي سلالة ماساتشوستس (Mass) على الأقل $5,0 \log_2$ HI*
HI* - عيار الأجسام المضادة تم تحديده بمقايضة التراص الدموي.

الشكل الصيدلاني

مستحلب.

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة ضد داء نيوكاسل عند الدواجن (ابتداءً من اليوم الـ 21) والتهاب الشعب الهوائية المعدي الناجم عن السلالة الكلاسيكية لمجموعة ماساتشوستس (ابتداءً من اليوم الـ 28).

أنواع الحيوانات


الدجاج.

مؤشرات الاستخدام

للووقاية من داء نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي عند الدواجن.

طرق الاستخدام

جرعة واحدة - 0,5 مل لكل طائر.



إعطاء اللقاح بجرعة 0,5 مل بالحقن العضلي (في عضلات الفخذ أو الصدر) أو تحت الجلد (في الجزء السفلي من الرقبة) للكتاكيت من عمر 14 يومًا.

فترة الانسحاب

صفر يوم. في حالة الذبح القسري، يجب إزالة موضع حقن المادة المساعدة الزيتية.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. بعد فتح القارورة وأول استخدام اللقاح: 10 ساعات.

شروط التخزين والنقل

يُحفظ اللقاح عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية، في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تجميد! عند نقل اللقاح، يُسمح بتقلبات درجة الحرارة في نطاق من 0 إلى +20 درجة مئوية لمدة 5 أيام، مما لا يؤثر سلبيًا على جودة اللقاح.

(بوليمون REO 1133 معطل) POLIMUN REO 1133 INAC



لقاح التهاب الأوتار والمفاصل الفيروسي
عند الدواجن،
اللقاح المعطل



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 250 مل (500 جرعة) و 500 مل (1000 جرعة)

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على سلالة فيروس الريو S-1133 المستخرج من مزرعة الخلايا المولدة لبقية من الغشاء المشيمي لأجنة الدجاج قبل التعطيل على الأقل $10^{3,5}$ TCID₅₀;

الشكل الصيدلاني

مستحلب.

الخصائص المناعية

يعمل اللقاح على تحفيز تكوين مناعة محددة في الدواجن ضد التهاب الأوتار والمفاصل الفيروسي في 14-21 يومًا.

أنواع الحيوانات

الدجاج.

مؤشرات الاستخدام


للقاية من التهاب الأوتار والمفاصل الفيروسي.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يؤثر استخدام اللقاح سلبيًا على إنتاج البيض.

طرق الإعطاء

جرعة واحدة - 0,5 مل لكل طائر.



قبل الاستخدام، يجب رج القوارير جيدًا، وتسخين اللقاح إلى درجة حرارة الغرفة (25+20 درجة مئوية). يتم حقن الدجاج باللقاح بجرعة 0,5 مل تحت الجلد في الثلث السفلي من الرقبة أو عضليًا في عضلة الصدر: - لدجاج التسمين تحت عمر أسبوعين؛ - القطيع الأم والدواجن المنتجة للبيض في أي عمر، على ألا يتجاوز ذلك 4 أسابيع قبل بدء وضع البيض.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا، بعد فتح القارورة وأول استخدام اللقاح: 10 ساعات.

شروط التخزين والنقل

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية. لا تجميد! عند نقل اللقاح، يُسمح بتقلبات درجة الحرارة في نطاق من 0 إلى +20 درجة مئوية لمدة 5 أيام، مما لا يؤثر سلبيًا على جودة اللقاح.

لقاح مرض السالمونيلا عند الدواجن،
لقاح متعدد التكافؤ، معطل



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 500 و 1000 جرعة

المكونات

في جرعة واحدة قبل التعطيل (0,5 مل):
Salmonella enteritidis سلالة SE-15 على الأقل 10^8 CFU
و Salmonella typhimurium سلالة ST-15 على الأقل 10^8 CFU
و Salmonella gallinarum سلالة SG-15 على الأقل 10^8 CFU

الشكل الصيدلاني

مستحلب.

الخصائص المناعية

يحفز اللقاح تكوين المناعة الفعالة ضد Salmonella enteritidis، Salmonella typhimurium، و Salmonella gallinarum.
تشكل المناعة المستقرة بعد 4 أسابيع من إعادة التطعيم وتستمر لمدة 57-60 أسبوعًا من الحياة.

أنواع الحيوانات

الدجاج.

مؤشرات الاستخدام


للتطعيم الوقائي لمربي اللحم ومربي الدجاج البيض والدجاج البياض ضد داء السلمونيلات الناجم عن السالمونيلا المعوية والسالمونيلا التيفيموريوم والسالمونيلا غاليناروم.

تعليمات خاصة لفترة وضع البيض

لا يؤثر اللقاح في إنتاج البيض أو الإخصاب أو حضن البيض.

طرق الإعطاء

جرعة واحدة - 0,5 مل لكل طائر.



إعطاء اللقاح: تحت الجلد (في الجزء السفلي من الرقبة أو بين الجناحين) أو عضليًا (في عضلات الصدر).

فترة الانسحاب

21 يومًا.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. بعد فتح القارورة وأول استخدام اللقاح: 10 ساعات.

شروط التخزين والنقل

يُحفظ اللقاح في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية. لا تجميد.

INDIGO MAX (إنديجو ماكس)

منتج لتحضير مياه الشرب
والتحكم في عملية التطعيم

في قوارير سعة 500 مل



الوصف

سائل أزرق داكن.

المكونات

يحتوي 1 مل من المنتج على المكونات الفعالة التالية: ملون غذائي أزرق، ثيوكيريتات الصوديوم، المكونات المساعدة: بولي إيثيلين جليكول، كحول بنزيلي، بروبيول بارابين، ميثيل بارابين، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

يقوم INDIGO MAX بتحييد الكلور في مياه الشرب قبل إذابة اللقاح أو دواء العلاج الكيميائي ويوفر اللون الأزرق للمياه، مما يسمح بالتحكم في توزيع الماء مع الدواء من خلال نظام إمدادات المياه. إن منتج INDIGO MAX، حسب التركيز، يلون الماء باللون الأزرق أو يلون الماء ويلطخ لسان وحوصلة الطائر بعد الشرب، أو يلون ريش الطائر بعد التطعيم عن طريق الرش. إن هذا المنتج غير سام في الجرعات التي تزيد عن الموصى بها بـ 10 مرات، وليس له تأثير مهبج محليًا أو مسبب للحساسية.

النوع من الحيوانات

الدواجن.

طرق الإعطاء والجرعات

تحضير مياه الشرب لتحييد الكلور وإضفاء اللون الأزرق لتوضيح توزيع محلول اللقاح أو دواء العلاج الكيميائي. متوافق مع اللقاحات وأدوية العلاج الكيميائي. لم يتم تسجيل أي تفاعلات سلبية.

يجب حساب الكمية المطلوبة من الماء للشرب، وثم إضافة منتج إنديجو ماكس بالجرعة التالية:

- لتلوين مياه الشرب - 100 مل من المنتج لكل 1000 لتر من الماء؛
 - لتلوين لسان وحوصلة وريش الدواجن - 100 مل لكل 100 لتر من الماء.
- بعد 10 دقائق (الوقت اللازم لتحييد الكلور)، تُذاب الكمية المحسوبة من اللقاح أو دواء العلاج الكيميائي في المحلول المائي الناتج مع التحريك المستمر.

ماء الشرب، لتر		إنديجو ماكس، مل
تلوين لسان وحوصلة وريش الدواجن	تلوين مياه الشرب	
001	0001	001
002	0002	002
003	0003	003
004	0004	004
005	0005	005

موانع الاستخدام

فرط الحساسية الفردية لمكونات العلاج. غير مخصص للاستخدام في الحيوانات غير المستهدفة.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا بعد التخفيف في الماء، استخدم في غضون 24 ساعة.

شروط التخزين والنقل

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان. بعد فتح القارورة وأول استخدام للمنتج: 28 يومًا، بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



قوارير سعة 5، 10، 25، 50، 100 جرعة
زجاجات سعة 5، 10، 25، 50، 100 مل

المكونات

جرعة واحدة (1 مل) تحتوي على:

فيروس مرض الجلد المتكتل، سلالة «نيثيلينغ» $50 \times 10^3 \text{ TCID}_{50}$
مذيب.

الشكل الصيدلاني

مجفف بالتجميد ومحلول مذيب

الخصائص المناعية

يحفز اللقاح تكوين المناعة بعد 10 أيام من التطعيم الواحد، وتشكل المناعة النشطة ضد مرض الجلد المتكتل في الماشية بعد 21 يومًا من التحصين.

النوع من الحيوانات

الماشية والأبقار.

مؤشرات الاستخدام

التحصين الوقائي للماشية ضد مرض الجلد المتكتل. لا يحتوي اللقاح على خصائص علاجية.

موانع الاستخدام

لا تستخدمه للحيوانات الضعيفة والمريضة.

التعليقات

لا تستخدم اللقاح من قوارير بها شقوق أو بدون ملصقات أو بها مخالفة للختم أو منتهية الصلاحية.

التفاعل مع الأدوية الأخرى

لم تتم دراسته، لذلك لا ينصح باستخدامه بالتزامن مع أدوية أخرى.


تعليمات خاصة أثناء الحمل والرضاعة

لا توجد حدود.

طرق الاستخدام والجرعات

قبل الاستخدام، قم بسحب 5 مل من المادة المخففة من القارورة باستخدام المادة المخففة باستخدام حقنة معقمة ونقلها إلى القارورة باستخدام المكون المجفف بالتجميد. قلب جيدًا حتى يذوب الليوفيليسات تمامًا، ثم باستخدام حقنة، انقل المادة المذبذبة إلى القارورة باستخدام المذيب. كرر الإجراء لإكمال نقل اللقاح المجفف بالتجميد إلى قارورة المذيب.

يتم تطعيم الحيوانات تحت الجلد بجرعة 1,0 مل وبغض النظر عن العمر.



تتم إعادة التطعيم مرة واحدة كل عام.

فترة الانسحاب

7 أيام. يحظر أكل لحوم الحيوانات المملقة لمدة 7 أيام. يتم استخدام حليب الأبقار المملقة دون قيود.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. يجب استخدام اللقاح مباشرة بعد إعادة التكوين.

شروط التخزين والنقل

يُحفظ في الأماكن المظلمة، بعيدًا عن متناول الأطفال في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية. على المدى القصير، حتى 48 ساعة، يُسمح بنقل الليوفيليسات في درجات حرارة تصل إلى 14 درجة مئوية. يُسمح بتخزين الليوفيليسات في حالة التجميد عند درجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. لا تجمد المذيب!

4 BOVIMUN (بوفيمون 4)



لقاح التهاب الأنف والربامى المعدى، والإسهال الفيروسي،
ونظيرة الإنفلونزا، والفيروس التنفسي المخلوي



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 10 أو 30 جرعة

المكونات

يتكون اللقاح من مكونين (مستحضر معلق كمحلول مذب للقاح المجفف بالتجميد) بنفس عدد الجرعات. تحتوي الجرعة الواحدة (3 مل) من اللقاح على:

سلالات اللقاح على شكل مستحضر معلق (قبل التعطيل):

فيروس التهاب الأنف والربامى المعدى عند الأبقار سلالة BM على الأقل $10^{7,0}$ TCID₅₀؛

فيروس نظيرة الإنفلونزا 3 سلالة BR-11 على الأقل HAU 480؛

فيروس الإسهال الفيروسي عند الأبقار، سلالة D-13 على الأقل $10^{6,0}$ TCID₅₀

50

سلالة اللقاح في المكون المجفف بالتجميد:

الفيروس التنفسي المخلوي الحي، سلالة PC-09 على الأقل $10^{4,0}$ TCID₅₀.

الشكل الصيدلاني:

مستحضر معلق ومجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يحفز اللقاح تكوين المناعة الفعالة ضد أمراض الجهاز التنفسي والتناسلي في الأبقار (التهاب الأنف والربامى المعدى، والإسهال الفيروسي، ونظيرة الإنفلونزا 3، والفيروس التنفسي المخلوي)، وذلك خلال أسبوعين من التطعيم. تستمر المناعة لدى الأبقار حتى 12 (اثني عشر) شهرًا. لا يمتلك اللقاح خصائص علاجية.

النوع من الحيوانات

الأبقار.

مؤشرات الاستخدام

للوقاية من التهاب الأنف والربامى المعدى، والإسهال الفيروسي، ونظيرة الإنفلونزا 3، والفيروس التنفسي المخلوي لدى الأبقار.

موانع الاستخدام

لا يُسمح بتطعيم الحيوانات المريضة أو المتهكة.

التفاعل مع الأدوية الأخرى


لم تتم دراسته، لذا لا يُنصح باستخدامه بالتزامن مع لقاحات وأدوية علاجية أخرى. لا تخطئ مكونات اللقاح من سلاسل مختلفة.

تعليمات خاصة أثناء الحمل والرضاعة

لا يُسبب استخدامه في أي مرحلة من مراحل الحمل والرضاعة أي رد فعل سلبي.

طريقة الإعطاء والجرعة

يجب نقل 5 مل من المستحضر المعلق للقاح باستخدام محقنة إلى قارورة تحتوي على المكون المجفف بالتجميد، ثم رجها برفق حتى يذوب المكون المجفف بالتجميد بالكامل. ثم أخذ المادة المذابة باستخدام المحقنة ونقلها إلى قارورة المستحضر المعلق. يجب تكرير هذه العملية لنقل المكون المجفف بالتجميد المذاب بالكامل إلى قارورة المستحضر المعلق. يتم إعطاء اللقاح عن طريق الحقن العضلي في عضلات الرقبة. الجرعة: يجب إعطاء 3 مل من اللقاح للحيوانات ابتداءً من عمر 4 أسابيع، بغض النظر عن وزنها وعمرها وجنسها.



يُجرى تطعيم إضافي مرة واحدة سنويًا
فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم.

شروط التخزين

يُحفظ اللقاح عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية، في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تجميد.

مدة الصلاحية

24 شهرًا من تاريخ التصنيع. يجب استخدام اللقاح خلال 3 ساعات من إذابته.



لقاح التهاب الضرع لدى الأبقار،

اللقاح المتعدد التكافؤ

اللقاح المعطل

في قوارير سعة 10 و50 و100 مل
يعتمد عدد الجرعات في القارورة على حجم الجرعة لكل مزرعة على حدة.

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح (5,0 مل) على: المكونات الفعالة (قبل التعطيل):
Streptococcus agalactiae, سلالة St.ag-19 على الأقل 8,0 CFU;
Streptococcus uberis, سلالة St.ub-19 على الأقل 8,0 CFU;
Staphylococcus aureus, سلالة Stap.au-19 على الأقل 8,0 CFU;
Escherichia coli, سلالة UA J5 على الأقل 9,0 CFU

الشكل الصيدلاني

مستحضر معلق.

الخصائص المناعية

المزدوج، وتستمر تلك الاستجابة المناعية لمدة 6 أشهر.
تقلل الأبقار التي تم تطعيمها الغلوبيولينات المناعية عبر اللبأ، مما يحمي العجول حديثة الولادة من مسببات المرض المعدي المذكورة أعلاه.

الأنواع من الحيوانات

الأبقار.

مؤشرات للاستخدام

الوقاية من التهاب الضرع ذي الأعراض الواضحة والتهاب الضرع تحت الإكلينيكي في الأبقار.

موانع الاستخدام

لا توجد موانع.

التفاعل مع الأدوية الأخرى

لم تتم دراسته. لا يُسمح بخلطه مع الأدوية العلاجية والوقائية، بما في ذلك مكونات اللقاحات الأخرى من سلسلة BOVIMUN MAST (بوفيمون MAST).

تعليمات خاصة أثناء الحمل والرضاعة

يجب تطعيم الحيوانات الحوامل وفقاً للمواعيد الموصى بها. يتم تطعيم الأبقار المرضعة دون قيود.

طرق الإعطاء والجرعة

يتم التطعيم عن طريق الحقن العضلي بجرعة 5,0 مل في منطقة الردف بإحدى الطرق التالية:



يجب إعادة التطعيم عند كل حمل.

الاحتياطات الخاصة للاستخدام

قبل الاستخدام، يجب تسخين اللقاح إلى درجة الحرارة من 20+ إلى 25+ درجة مئوية، ورجها جيداً. لا يُسمح بتطعيم الحيوانات المريضة مع الأعراض الواضحة أو الحيوانات المنهكة.

فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم. تُباع المنتجات الناتجة عن الذبح واللحوم والحليب من الحيوانات التي تم تطعيمها دون قيود، بغض النظر عن موعد التطعيم.

أشكال عدم التوافق الرئيسية

لا يُستخدم مع منتجات طبية أو بيولوجية مناعية أخرى.

شروط التخزين

يتم تخزين ونقل اللقاح في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من 2+ إلى 8+ درجات مئوية. قد تتكون رواسب طفيفة عند التخزين طويل الأمد، وإنها تختفت بسهولة عند رج القارورة حتى تكوين مستحضر معلق متجانس.

لا تجميد.

مدة الصلاحية

18 شهراً. بعد فتح القارورة وأول استخدام اللقاح: خلال 3 ساعات.

لقاح التهاب الأمعاء بالفيروس العجلي، وفيروس كورونا،
والعدوى الإشريكية القولونية، وعدوى المطثية العسيرة لدى الأبقار،
اللقاح المعطل



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 5 و 25 و 50 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح (2,0 مل) على:
المكونات الفعالة (قبل التعطيل):

التهاب الأمعاء بالفيروس العجلي لدى الأبقار، سلالة RP-182 على الأقل $10^{7,0}$ TCID₅₀؛ فيروس كورونا لدى الأبقار، سلالة CV-315 على الأقل HAU 256؛
Escherichia coli، سلالة EC18 على الأقل $10^{9,0}$ CFU؛
Clostridium perfringens من نوع C، سلالة CLp-19، سم مضعف: على الأقل 20,0 IU؛

الشكل الصيدلاني

مستحضر معطل.
الخصائص المناعية

يعمل هذا الدواء على تكوين مناعة محددة ضد مسببات التهاب الأمعاء بالفيروس العجلي، وفيروس كورونا، والعدوى الإشريكية القولونية، وعدوى المطثية العسيرة لدى الأبقار (والإبقار التي لم تلد بعد) وذلك بعد تطعيمها مرتين. تنتقل الأجسام المضادة المكونة عبر اللبأ، وتوفر حماية سلبية للعجول حديثة الولادة ضد التهاب الأمعاء بالفيروس العجلي، وفيروس كورونا، و العدوى الإشريكية القولونية وعدوى المطثية العسيرة حتى عمر 45 يومًا. ليس للقاح أي خصائص علاجية.

الأنواع من الحيوانات

الأبقار.

مؤشرات الاستخدام

الوقاية من الإنهال لدى العجول حديثة الولادة الناتج عن التهاب الأمعاء بالفيروس العجلي، وفيروس كورونا، والعدوى الإشريكية القولونية ذات عامل الالتصاق K99، والمطثية الحاطمة من نوع C.

التفاعل مع الأدوية الأخرى وأشكال التفاعل الأخرى

لا توجد معلومات حول سلامة وفعالية استخدام الدواء مع أدوية أخرى، لذا لا يُنصح باستخدام المتزامن للقاح BOVIMUN NEO (بوفيمون نيو) مع أدوية علاجية و / أو وقائية أخرى.

تعليمات خاصة أثناء الحمل والرضاعة

يُستخدم اللقاح في الأبقار الحوامل أو الأبقار التي لم تلد بعد بالجرعات الموصى بها.

طريقة الإعطاء والجرعة

قبل التطعيم، يجب تسخين قارورة اللقاح إلى درجة الحرارة من +20 إلى +25 درجة مئوية ورعها جيدًا. يُعطى اللقاح عضليًا مرتين في منطقة الردف، بجرعة 2 مل في كل مرة، مع مراعاة قواعد التعقيم.
يعتمد مستوى حماية العجول على وقت الشرب، وجودة وكمية اللبأ، لذا يجب إيلاء اهتمام خاص لتزويد العجول بكمية كافية من اللبأ من الأبقار التي تم تطعيمها. تُعطى الأجزاء الأولى من اللبأ بعد الولادة للعجول حديثة الولادة في موعد لا يتجاوز 6 ساعات بعد الولادة. كما يُنصح بجمع اللبأ من الأبقار التي تم تطعيمها، والذي تم الحصول عليه في أول 6-8 دورات حلب بعد الولادة، وتخزينه في مكان مبرد (بدرجة الحرارة +2-+8 درجات مئوية) أو مجمدًا. يتم تسخين وتدوير اللبأ عند درجة حرارة لا تتجاوز 42 درجة مئوية. يُنصح بإعطاء اللبأ المجمّع من الأبقار التي تم تطعيمها (في أول 6-8 دورات الحلب) لكل عجل بمعدل 2,5-3,5 لتر / يوم خلال الأسبوعين الأولين من العمر. ليس علاجًا!

إعادة التطعيم



الاحتياطات الخاصة للاستخدام

لا تستخدم لقاحًا ثالثًا أو منتهي الصلاحية أو مجمدًا.

فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم.

أشكال عدم التوافق الرئيسية

لا يُستخدم مع منتجات طبية أو بيولوجية مناعية أخرى.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية. لا تجميد.

مدة الصلاحية

18 شهرًا. يجب استخدام محتويات القارورة خلال 3 ساعات من فتحها لأول مرة.

LAPIMUN MIX (لاييمون MIX)



لقاح الورم المخاطي لدى الأرانب،
المحلول المذيب



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية سعة 10 جرعة
المحلول المذيب في قوارير سعة 10 مل

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس الورم المخاطي لدى الأرانب، سلالة 20/MAV/RK-13 على الأقل $10^{4.0}$ TCID₅₀

الشكل الصيدلاني

لقاح حي مجفف بالتجميد أو لقاح حي مجفف بالتجميد ومحلول مذيب.

الخصائص المناعية

تظهر الحماية بعد التطعيم لدى الأرانب السليمة في اليوم 4 إلى 9 من التطعيم، وتستمر من 8 إلى 10 أشهر.

أنواع الحيوانات

الأرانب.

مؤشرات الاستخدام

يُستخدم للتطعيم الوقائي للأرانب ضد الورم المخاطي.

التفاعل مع الأدوية الأخرى


يمكن استخدام اللقاح بالتزامن مع لقاح "LAPIMUN GEM" (لاييمون GEM) - لقاح مرض نزف الأرانب الفيروسي الذي يتم إعطاؤه في الجانب الآخر من الجسم.

التعليمات الخاصة (في فترة الحمل)

لا توجد موانع.

طرق الاستخدام والجرعات

يتم إذابة اللقاح مباشرة قبل الاستخدام بالمحلول المذيب للقاح أو بمحلول ملحي معقم بمعدل 1,0 مل لكل جرعة.
يتم إعطاء اللقاح تحت الجلد خلف لوح الكتف بجرعة: 1,0 مل.



فترة الانسحاب

0 يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. يجب استخدام اللقاح خلال 3 ساعات من إذابته.

شروط التخزين والنقل

يُحفظ اللقاح في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية. لا يؤثر التجميد قصير المدى (حتى 30 يومًا) سلبيًا على جودة اللقاح.

لقاح مرض نزف الأرانب الفيروسي،
اللقاح المعطل



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية سعة 10 جرعة
المحلول المذيب في قوارير سعة 10 مل

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على فيروس معطل لمرض نزف الأرانب الفيروسي، سلالة BG-04 من 640 إلى HAU 1280.

الشكل الصيدلاني

تعليق.

الخصائص المناعية

يحمي الأرانب من الأمراض النزفية لمدة 12 شهرًا، ويحث على تكوين أجسام مضادة واقية بعد 4-14 يومًا من التطعيم.

أنواع الحيوانات

أرانب.

مؤشرات الاستخدام

التحصين الوقائي للأرانب ضد الأمراض النزفية.

التفاعل مع الأدوية الأخرى


لا تداخل مع الأدوية العلاجية والوقائية الأخرى. تتم عملية إزالة الديدان من الأرانب قبل أسبوعين أو بعد أسبوعين من التطعيم. يمكن استخدام اللقاح في وقت واحد مع اللقاح ضد Myxomatosis LAPIMUN MIX الذي يتم حقنه في الموقع المقابل.

التعليمات الخاصة (في فترة الحمل)

لا ينصح بتطعيم الإناث قبل 7 أيام من الولادة، وذلك بسبب الإجهاد «الميكانيكي» الذي يمكن أن يحدث بسبب الإجهاد الحيواني.

طرق الاستخدام والجرعات

يتم إعطاء اللقاح تحت الجلد خلف شفرة الكتف بجرعة 1,0 مل لكل رأس.



تتم إعادة التطعيم كل 12 شهرًا.

فترة الانسحاب

0 يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. يجب استخدام اللقاح في غضون 7 أيام بعد الفتح.

شروط التخزين والنقل

قم بتخزين اللقاح في الأماكن المظلمة، بعيدًا عن متناول الأطفال، عند 2 إلى 8 درجات مئوية. لا تجمد!

LAPIMUN GEM-2 (لاييمون GEM-2)



لقاح مرض نزف الأرانب الفيروسي،
اللقاح المعطل



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 10 و20 و50 و100 جرعة

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على الفورمالديهايد المعطل:

فيروس مرض نزف الأرانب الفيروسي، سلالة BG-04 على الأقل HAU 640:

فيروس مرض نزف الأرانب الفيروسي، سلالة GBK-2 على الأقل HAU 640:

الشكل الصيدلاني

تعليق.

الخصائص المناعية

يحمي اللقاح الأرانب من مرض نزف الأرانب الناجم عن فيروس الكالسيفيروس، لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ويحث على تكوين أجسام مضادة واقية في غضون 4-14 يومًا بعد التطعيم. ليس لها خصائص علاجية.

أنواع الحيوانات

أرانب.

مؤشرات الاستخدام

التحصين الوقائي للأرانب ضد مرض النزف الناجم عن فيروس الكالسيفيروس.

التفاعل مع الأدوية الأخرى


يمكن استخدام اللقاح في وقت واحد مع داء الفطريات في الأرانب LAPIMUN M، والذي يتم إعطاؤه على الجانب الآخر من الجسم، في منطقة شفرات الكتف أو الفخذين.

التعليمات الخاصة (في فترة الحمل)

لا ينصح بتطعيم الإناث قبل 7 أيام من الولادة، وذلك بسبب الإجهاد الذي قد يحدث بسبب الإجهاد الحيواني. يتم تطعيم الإناث المرضعات، بغض النظر عن مدة الولادة.

طرق الاستخدام والجرعات

يتم إعطاء اللقاح للأرانب السليمة تحت الجلد خلف الكتف بجرعة 1,0 مل لكل رأس.



في مزرعة خالية من الأمراض النزفية، يتم تطعيم الأرانب مرة واحدة، بدءًا من عمر 28 يومًا. إذا كان هناك خطر العدوى المبكرة، يتم تطعيم الأرانب مرة واحدة من عمر 4 أسابيع.

يتم تطعيم أرانب القطيع التجارية مرة واحدة في السنة. يتم تطعيم حيوانات القطيع الأم، مع الاستخدام المكثف، مرتين بفواصل 6 أشهر.

فترة الانسحاب

صفر يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. يجب استخدام اللقاح في غضون 7 أيام بعد الافتتاح الأول.

شروط التخزين والنقل

قم بتخزين اللقاح في الأماكن المظلمة، بعيدًا عن متناول الأطفال، عند 2 إلى 8 درجات مئوية. لا تجمد!

لقاح مرض نزف الأرانب الفيروسي والورم المخاطي،
اللقاح المركب

في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 10 و20 و50 و100 جرعة



المكونات

يحتوي اللقاح على مكونين بنفس عدد الجرعات:

- وقف فيروس مرض نزف الأرانب الفيروسي المعطل، BG-04 على الأقل HAU 640 في الجرعة الواحدة؛
- الليفوفيليسات لفيروس لقاح الميكوماتوما، سلالة 13 — MAV/RK ≤ 20 /TCID 50 4,0 10 في جرعة واحدة.

الشكل الصيدلاني

مجفف بالتجميد ومستحضر معلق.

الخصائص المناعية

يحمي اللقاح الأرانب من الأمراض النزفية وداء الفطريات لمدة 8-10 أشهر، ويحث على تكوين أجسام مضادة واقية بعد 7-14 يوماً من التطعيم.

أنواع الحيوانات

أرانب.

مؤشرات الاستخدام

التحصين الوقائي للأرانب ضد الأمراض النزفية وداء الفطريات.

التفاعل مع الأدوية الأخرى

لا تخطط مع الأدوية الأخرى، مع مكونات اللقاحات الأخرى ضد مرض الأرانب ومكونات دفعات أخرى من لقاح LAPIMUN GEMIX. يجب إجراء عملية إزالة الديدان من الأرانب قبل أسبوعين أو بعد أسبوعين من التطعيم.

التعليمات الخاصة (في فترة الحمل)

لا ينصح بتطعيم الإناث قبل 7 أيام من الولادة، وذلك بسبب الإجهاض «الميكانيكي» الذي قد يحدث بسبب الإجهاد الحيواني.

طرق الاستخدام والجرعات

بعد الاهتزاز، يتم نقل مكون اللقاح في شكل معلق بحقنة إلى القارورة باستخدام مكون مجفف بالتجميد. يتم إعطاء اللقاح تحت الجلد خلف شفرة الكتف بجرعة 1,0 مل لكل رأس



تتم إعادة التطعيم كل 8 أشهر.

فترة الانسحاب

0 يوم.

مدة الصلاحية

24 شهراً. يجب استخدام اللقاح في غضون 3 ساعات من إعادة التكوين.

شروط التخزين والنقل

قم بتخزين اللقاح في الأماكن المظلمة، بعيداً عن متناول الأطفال، عند 2 إلى 8 درجات مئوية. لا تجمد!

LAPIMUN GEMIX-3 (لاييمون 3-GEMIX)



لقاح مرض نزف الأرانب الفيروسي والورم المخاطي،
اللقاح المركب



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 10 و20 و50 و100 جرعة

المكونات

- يحتوي اللقاح على مكونين بنفس عدد الجرعات. تحتوي جرعة واحدة من اللقاح على:
- فيروس معطل لمرض نزف الأرانب الفيروسي (مستحضر معلق) سلالة RHDV1 على الأقل HAU: 10⁴ TCID₅₀
- فيروس حيّ للورم المخاطي لدى الأرانب (المجفف بالتجميد) سلالة 20/MAV/RK-13 على الأقل 10⁴ TCID₅₀

الشكل الصيدلاني:

مستحضر معلق ومجفف بالتجميد.

الخصائص المناعية

يحمي إعطاء اللقاح الأرانب من مرض نزف الأرانب الفيروسي والورم المخاطي، وتتشكل الأجسام المضادة الواقية بعد 7-14 يومًا من التطعيم. مدة المناعة ضد مرض نزف الأرانب الفيروسي لا تقل عن 12 شهرًا، ولا تقل عن 9 أشهر ضد الورم المخاطي.

النوع من الحيوانات

الأرانب.

مؤشرات الاستخدام

يُستخدم للتحصين الوقائي للأرانب ضد مرض نزف الأرانب الفيروسي (RHD) والورم المخاطي.

التفاعل مع الأدوية الأخرى


لا يُخلط مع أدوية طبية أو وقائية أخرى، أو مع مكونات اللقاحات الأخرى ضد أمراض الأرانب، أو مع مكونات لقاح LAPIMUN GEMIX (لاييمون 3-GEMIX) من السلسلة الأخرى.

التعليمات الخاصة (عند الحمل)

لتجنب الإجهاد السلبي، لا يُنصح بتطعيم إناث الأرانب قبل سبعة أيام من الولادة.

الجرعات وطريقة الإعطاء للحيوانات من مختلف الأعمار

بعد رخ مكون اللقاح على شكل المستحضر المعلق، يجب نقله إلى القارورة التي تحتوي على المكون المجفّف بالتجميد محقنة. بعد إذابة اللقاح، يتم إعطاؤه للأرانب السليمة تحت الجلد خلف لوح الكتف بجرعة 1,0 مل.



فترة الانسحاب (الانتظار)

0 يوم.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. يجب استخدام اللقاح خلال 3 ساعات من إذابته.

شروط التخزين والنقل

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية.

المحلول المذيب للقاحات الحية



في قوارير زجاجية أو بلاستيكية
سعة 10 و50 و100 و200 مل.

المكونات

كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، فوسفات ثنائي هيدروجين الصوديوم، فوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم، ملون غذائي صناعي "أزرق V E 131 حاصل على براءة الاختراع"، ماء منزوع الأيونات.

الشكل الصيدلاني

محلول.

الخصائص المناعية

لا توجد.

النوع من الحيوانات

الأرانب

مؤشرات الاستخدام

يتم استخدامه لإذابة اللقاحات التالية:

SUIMUN ADIVAC+ (سويمون أديفاك+) - لقاح DIVA حي سلبي الفع جاف مصنع بواسطة مزرعة الخلايا ضد مرض أوجيسكي - داء الكلب الكاذب؛ SUIMUN CSF LK-M (سويمون CSF LK-M) و لقاح SUIMUN CSF LK-M Light (سويمون CSF LK-M لايت)؛ لقاح SUIMUN ERY (سويمون ERY).

التفاعل مع الأدوية الأخرى

لا يُستخدم لإذابة أدوية أخرى، باستثناء تلك المحددة.

التعليمات الخاصة

لا يجوز استخدام المحلول المذيب في قوارير متشققة، أو بدون ملصقات، أو مع أغطية مكسورة، أو المحلول المذيب متغير اللون والاتساق، أو منتهي الصلاحية، أو المجمد. طريقة الإعطاء والجرعة

يتم إعطاء اللقاح المذاب للحيوانات بالجرعات وبالطريقة المحددة في النشرة الداخلية الخاصة بكل لقاح.

فترة الانسحاب (الانتظار)

صفر يوم.

شروط التخزين

يُحفظ في مكان مظلم، عند درجة الحرارة من +2 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. بعد إذابة اللقاح، يجب استخدامه خلال المدة المحددة في النشرة الداخلية الخاصة باللقاح.

RABITEST-FAT (طقم رابيتست (FAT

مجموعة من الغلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب،
الفلورسنت



قوارير سعة 10 مل

المكونات

التركيب النوعي والكمي

عُدّة الغلوبولينات المناعية المتألّفة المضادة لداء الكلب

شكل صيدلاني

مجفف بالتجميد.

التأثير المناعي

تُستخدم عُدّة الاختبار لتشخيص داء الكلب في المختبر (in vitro).

أنواع الحيوانات

الغلوبولينات مخصصة للكشف عن مستضد فيروس داء الكلب في المواد الباثولوجية لجميع الأنواع الحيوانية.

مؤشرات الاستخدام

تُستخدم العُدّة لتشخيص داء الكلب بواسطة اختبار التآلق المناعي (IFA).

إجراء اختبار التآلق المناعي

المواد:

مجهر تآلق، شرائح زجاجية، ماضات قياس بحجم 1، 2، 5، 10 مل، دوارق معملية مدرجة، أطباق بكتريولوجية، ثنائي ميثيل الفثالات، أسيتون نقي كيميائياً أو نقي للتحليل، محلول الملح الفوسفاتي المنظم (PBS) بدرجة حموضة 7.2-7.4، عُدّة "RABITEST-FAT" - غلوبولين مُتآلق مضاد لداء الكلب، ضوابط إيجابية وسلبية.

تحضير محلول الملح الفوسفاتي المنظم بدرجة حموضة 7.2-7.4:

يُحضّر محلول (PBS) وفقاً للوصفة التالية: فوسفات ثنائي الصوديوم (لامائي) - 1.25 جم، فوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة - 0.272 جم، كلوريد الصوديوم - 8.5 جم، ماء مقطر - حتى 1000 سم مكعب.

تحضير عينات المادة قيد الاختبار:

لإجراء الفحص، تُحضّر المسحات أو الطبعات من أجزاء مختلفة من دماغ الحيوان الطازج أو المجمد حديثاً (بعد إذابته مسبقاً) (قرن آمون، المخيخ، النخاع المستطيل، قشرة نصفي المخ الكرويين) باستخدام شرائح زجاجية منزوعة الشحوم مسبقاً. تُحضّر مسحاتان أو طبعتان على الأقل من كل جزء من الدماغ.

لا يمكن استخدام عينات الدماغ من الحيوانات في مرحلة التحلل، أو المحفوظة بالجلسرين، أو الممتصة بالكحول الميثيلي أو الإيثيلي، أو الفورمالين، أو أي مواد أخرى تساهم في حدوث تآلق غير نوعي.

لعمل المسحات: تُطحن قطع من الدماغ وزن 0.5-1.0 جم من الأجزاء المذكورة أعلاه في هاون حتى تتكون كتلة متجانسة، ومن ثم تُحضّر منها مسحات رقيقة على الشرائح الزجاجية.

لعمل الطبعات: باستخدام مقص، تُقطع أجزاء من النسيج بحجم 5 مم² إلى 10 مم² من الأجزاء المحددة من الدماغ، ثم توضع على ورق ترشيح مطوي من 4 إلى 6 طبقات لإزالة الرطوبة الزائدة. يلامس السطح المقطوع الشريحة الزجاجية 3-4 مرات مع ضغط خفيف للحصول على طبعة رقيقة على الشريحة.

لتحضير الضوابط السلبية: تُستخدم مسحات أو طبعات من أدغة فئران سليمة (غير مصابة وغير محصنة ضد داء الكلب). تُحضّر عينات الضوابط الإيجابية من أدغة فئران حُقنت بسلالة فيروس داء الكلب المرجعية CVS، أو من مادة سبق اختبارها وكانت نتيجتها إيجابية. تُؤخذ أدغة الفئران المحفوظة في مرحلة الاحتضار.

بعد التحضير، تُجفف المسحات أو الطبعات في الهواء عند درجة حرارة الغرفة ثم تُثبت بالأسيتون عند درجة حرارة 20- درجة مئوية لمدة 30-60 دقيقة.

إجراء اختبار التآلق المناعي:

يُعاد تكوين الغلوبولين المتآلق المضاد لداء الكلب المجفف بالتجميد "RABITEST-FAT" باستخدام الماء المقطر إلى الحجم الأولي الموضح على الملصق. بعد ذلك، يُحضّر التخفيف العملي للغلوبولين، الموضح على الملصق، بإضافة الحجم المطلوب من محلول PBS بتركيز 0.01 مولار.

لإجراء الاختبار، تُستخدم المسحات أو الطبعات وتُغطى بالتخفيف العملي للغلوبولين "RABITEST-FAT" المتآلق المضاد لداء الكلب. يُوزّع محلول الغلوبولين بالتساوي على كامل سطح العينة المحضرة، باستخدام ماضة بكمية 0.01 ± 0.1 سم مكعب لكل عينة.

توضع العينات المحضرة بعد ذلك في حجرة رطبة وتُحفظ في حاضنة لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة 37 درجة مئوية. في الوقت نفسه، يتم صبغ العينات الضابطة. بعد 30 دقيقة، تُشطف الغلوبولينات المتألّفة بالماء المقطر؛ وتُغسل الشرائح التي تحتوي على المسحات بمحلول PBS (بدرجة حموضة 7.2-7.4) ثلاث

RABITEST-FAT (طقم رابيتست FAT)

مجموعة من الغلوبولين المناعي المضاد لداء الكلب،
الفلورسنت



قوارير سعة 10 مل

مرات لمدة 10 دقائق في كل مرة، مع تغيير محلول PBS.

بعد ذلك، تُشطف العينات المصبوغة بالماء المقطر، وتُجفف في الهواء، وتُفحص تحت مجهر تآلقي (باستخدام عدسة الغمر) في الطيف الأزرق والأخضر. لهذا الغرض، يُستخدم زيت غير متآلق أو جلسرين مخصص للمجهر التآلقي.

يُعتبر تشخيص داء الكلب إيجابيًا إذا تم الكشف عن 10 حبيبات متألقة نموذجية على الأقل في عدة حقول رؤية للمجهر، مع غياب أي ومضان نوعي في الضوابط السلبية، ووجود حبيبات نموذجية في الضوابط الإيجابية.

الاستخدام أثناء الحمل والرضاعة ووضع البيض
لا ينطبق.

الجرعات وطرق الاستخدام

يُستخدم للتشخيص في المختبر (in vitro) وفقًا للنشرة الداخلية.

التعليمات الخاصة

يُسمح فقط للموظفين المحصنين بإجراء تشخيصات داء الكلب.

فترة الانسحاب

غير موجودة.

أشكال عدم التوافق

لم يتم الكشف عنها.

مدة الصلاحية

24 شهرًا، تُحفظ عُدّة الاختبار في مكان مظلم عند درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية.

شروط التخزين

بعد إعادة التكوين، يمكن تخزين الغلوبولين المتآلق عند درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة لا تزيد عن 24 ساعة، أو مجمدًا عند درجة حرارة لا تزيد عن -12 درجة مئوية لمدة تصل إلى 14 يومًا. لا يُعرض للضوء. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.



لقاح داء الكلب المعطل

الجديد

قوارير سعة 1 (1,0 مل): 2 (2,0 مل): 3 (3,0 مل): 5 (5,0 مل): 6 (6,0 مل):
10 (10,0 مل): 25 (25,0 مل): 50 (50,0 مل):
أو 100 (100,0 مل) جرعة من اللقاح.

المكونات

تحتوي جرعة واحدة من اللقاح (1 مل) على:
فيروس معطل لداء الكلب، سلالة Shchelkovo-51، على الأقل 2,0 IU
المكونات المساعدة: المادة المساعدة: هيدروكسيد الألومنيوم، 2,2-8-1 ملغ
المادة الحافظة: ثيوميرسال، أقل من أو يساوي 0,1 ملغ

الشكل الصيدلاني

مستحضر معلق.

الخصائص المناعية

يتم تكوين المستوى الوقائي من الأجسام المضادة في اليوم 14 من التطعيم، كما أن إعطاء اللقاح يحمي الحيوانات من داء الكلب لمدة 12 شهرًا.
أنواع الحيوانات.

الكلاب، القطط، الحيوانات ذات الفراء، الأبقار، الأغنام، الماعز، الخيول.

طريقة الإعطاء والجرعة

أنواع الحيوانات	طريقة الإعطاء	جدول التطعيم الوقائي للحيوانات		جميع التطعيمات اللاحقة
		التطعيم	إعادة التطعيم	
الكلاب والقطط	في العضل أو تحت الجلد	الحيوانات الصغيرة المولودة من الأمهات غير المطعمين	من 3-1 أشهر	بعد 12 شهرًا
		الحيوانات الصغيرة المولودة من الأمهات المطعمين	عمر 3 أشهر	
الحيوانات ذات الفراء	في العضل أو تحت الجلد	الحيوانات المولودة من الأمهات غير المطعمين	من 3-1 أشهر	بعد 12 شهرًا
		الحيوانات المولودة من الأمهات المطعمين	عمر 3 أشهر	
حيوانات المزرعة	في العضل أو تحت الجلد	الحيوانات المولودة من الحيوانات غير المطعمين	من 3-1 أشهر	كل 12 شهرًا
		الحيوانات المولودة من الحيوانات المطعمين	عمر 4 أشهر	
	بالحقن العضلي	الحيوانات التي يبلغ عمرها 9 أشهر وما فوق	من عند	بعد 12 شهرًا
		الحيوانات المولودة من الحيوانات غير المطعمين	عمر 4 أشهر	
الأغنام، الأبقار، الماعز	في العضل أو تحت الجلد	الحيوانات التي يبلغ عمرها 9 أشهر وما فوق	من عند	كل 12 شهرًا
		الحيوانات المولودة من الحيوانات غير المطعمين	عمر 4 أشهر	
الأحصنة والخيول	بالحقن العضلي	الحيوانات التي يبلغ عمرها 6 أشهر وما فوق	من عند	بعد 12 شهرًا
		الحيوانات المولودة من الحيوانات غير المطعمين	عمر 6 أشهر	

يمكن إعادة التطعيم في فترات سابقة، اعتمادًا على الحالة الوبائية للمنطقة أو تشريعات الدولة. يوصى بإجراء اختبار مصل الدم لتحديد عيار الأجسام المضادة لداء الكلب في موعد لا يتجاوز 14 يومًا بعد التطعيم.

مخطط التطعيم القسري للحيوانات

يتم تطعيم الحيوانات الخاضعة للتطعيم القسري على النحو التالي:

1) تتم الإدارة الأولى في موعد لا يتجاوز 36-24 ساعة من الإصابة المشتبه بها؛ 2) الإدارة الثانية بعد 12 ساعة من الأولى؛ 3) يتم إعطاء الإدارة الثالثة بعد 12 ساعة من الثانية؛ 4) يتم إعطاء الإدارة الرابعة بعد 16-14 يومًا من الثالثة.

فترة الانسحاب

صفر أيام.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. يجب استخدام محتويات القارورة في غضون عشرين يومًا من السحب الأول للدواء، بشرط الحفاظ على قواعد التعقيم وظروف التخزين الموصى بها (2-8 درجة مئوية).

شروط التخزين والنقل

يُحفظ في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال عند درجة حرارة 2-8 درجة مئوية. لا تجمد!

ENROCOLIN (إنروكولين)

محلول فموي

في قوارير من مواد بولييمرية سعة 1000 مل



الوصف

سائل شفاف يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والبني الفاتح.

المكونات

تحتوي كل 100 مل من المنتج على المواد الفعالة:

إنروفلوكساسين - 10,0 غرام؛ كوليسيتين سولفات - IU 100 000 000.

المواد المساعدة: كحول بنزلي، حمض اللاكتيك، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف ATC QJ01 - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهاز. QJ01RA95 - بوليميكسينات، مع أدوية أخرى مضادة للميكروبات. إن

إنروكولين هو دواء مركب وتأثيره العلاجي ناتج عن التأثير التآزري لمكونيه الفعالين: إنروفلوكساسين وكوليسيتين سولفات.

ينتمي إنروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكوينولونات. يعمل إنروفلوكساسين كمبيد للجراثيم على بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.

إن كوليسيتين هو مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة بوليميكسينات ويعمل كمبيد للجراثيم ضد بكتيريا سلبية الغرام.

الاستخدام

علاج العجول (تحت عمر 3 أشهر) من أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للإنروفلوكساسين والكوليسيتين.

الدواجن (الكناكيت ودجاج التسمين والديك الرومي) من أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأعضاء تكوين البيض التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للإنروفلوكساسين والكوليسيتين.

الجرعات

عن طريق الفم مع ماء الشرب مرة واحدة يوميًا.

النوع من الحيوانات	مؤشرات الاستخدام	جرعة	مدة العلاج	فترة الانسحاب
العجول تحت 3 أشهر من العمر	دورة عادية من التتابع. وأمراض الجهاز الهضمي	0,3 مل/كجم وزن الجسم	7-5 أيام	للذبح للحوم - 12 يومًا
	شكل حاد من المرض	0,5 مل/كجم وزن الجسم		
دواجن منزلية (دجاج، الديوك الرومية)	الفراريج والكناكيت الأم، الديوك الرومية قبل 3 أشهر؛ ضح الكناكيت قبل عمر 5 أشهر	0,1 مل/كجم وزن الجسم أو 1,0 مل/لتر مياه الشرب		
	الفراريج والكناكيت الأم، الديوك الرومية بعد 3 أشهر؛ ضح الكناكيت بعد عمر 5 أشهر			

في حالة داء السلمونيلات والالتهابات البكتيرية المختلطة والأمراض المزمنة للدواجن: يجب أن يستمر العلاج لمدة 7-5 أيام.

أثناء العلاج، يجب أن تتلقى الطيور الماء الذي يحتوي على دواء فقط. يتم تحضير المحلول الطبي يوميًا بكمية المياه المحسوبة لاستهلاك الدواجن خلال 24 ساعة.

فترة الانسحاب

للحوم: في 12 يومًا (العجول) و 11 (دواجن) بعد آخر علاج.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح الفارورة: 14 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية. بعد التخفيف، يجب استخدام محلول الدواء خلال 24 ساعة.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

ENROXAN-100 (إنروكسان- 100)

محلول فموي

قوارير من مواد بوليميرية سعة 1000 مل



المكونات

1 مل من الدواء يحتوي على مادة فعالة:

إنروفلوكساسين — 100 ملغ;
المواد المساعدة.

الخصائص الدوائية

إنروفلوكساسين هو دواء علاجي كيميائي لمجموعة الفلوروكينولونات (مشتق من حمض الكينولون-الكربوكسيل). يُظهر إنروفلوكساسين نشاطاً مضاداً للميكروبات وهو فعال ضد أنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة سالبة الجرام وإيجابية الجرام، وكذلك ضد الميكوبلازما spp و Chlamydia spp .

الاستخدام

علاج العجول (حتى عمر 3 أشهر) بالميكوبلازما، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمساك البولية والأفات الجلدية التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة المعرضة للإنروفلوكساسين.

علاج الدواجن المنزلية (دجاج التسمين ودجاج التربية والبدائل والديك الرومي) بداء العصيات القولونية والميكوبلاسما والسالمونيلا والبستوريلا والتهابات المكورات العنقودية والعقديات التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة المعرضة للإنروفلوكساسين.

طرق الاستخدام والجرعات

عن طريق الفم مع مياه الشرب بجرعات:

أنواع الحيوانات، بما في ذلك الدواجن	الجرعة حسب العنصر الفعال (ملغم/كغم من وزن الجسم)	جرعة ENROXAN-100 (إنروكسان-100) للاستخدام الفموي
		مل/10 كجم من وزن الجسم
العجول التي يقل عمرها عن 3 أشهر	2,5 - 5,0	0,25 - 0,5
الدواجن المنزلية (الفروج ودجاج التربية والبدائل والديك الرومي)	5,0 - 10	1,0-0,5

مدة العلاج - 3-5 أيام، في حالات داء السلمونيلا والبستوريلا والالتهابات المختلطة - 5-7 أيام. أثناء العلاج، يجب أن تتلقى الحيوانات والطيور الماء الذي يحتوي على دواء فقط. كل يوم من الضروري إعداد محلول جديد للدواء.

فترة الانسحاب

لحم الحيوانات - بعد 12 يوماً من آخر علاج.

مدة الصلاحية

24 شهراً. بعد الفتح الأول - 14 يوماً إذا تم تخزينه في مكان مظلم عند 5 إلى 25 درجة مئوية. بعد الذوبان، استخدم المحلول العلاجي في غضون 24 ساعة.

شروط التخزين

يُحفظ في الأماكن المظلمة، بعيداً عن متناول الأطفال، في درجة حرارة من 5 إلى 25 درجة مئوية.

FLOCINE-100 (فلوسين - 100)

محلول فموي

قوارير من مواد بولييمرية سعة 1000 مل



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة: فلورفينيكول - 100 ملغ.
المواد المساعدة: كحول بنزيلي، بولي إيثيلين جليكول، ميثيل بيروليدون.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف ATC QJ01 - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى. QJ01BA90 - فلورفينيكول.

الاستخدام

الدواجن (دجاج التسمين، ودجاج التربية، وصغار الدجاج المرباة لاستبدال الكبار، والديك الرومي): علاج الدواجن المصابة بداء الإشريكية القولونية، وعدوى المكورات العنقودية، وداء الباستريلا، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للفلورفينيكول.

طريقة الإعطاء والجرعة

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الدواجن	عن طريق الفم مع ماء الشرب: 2,0 مل من الدواء لكل 1 كغم من وزن الجسم أو 1 لتر من الدواء لكل 0001 لتر من ماء الشرب يوميًا؛ للدجاج والديك الرومي فوق عمر 4 أسابيع: لتران من الدواء لكل 1000 لتر من الماء	3-5 أيام	للذبح للحوم - 6 يومًا

عند استخدام دواء فلوسين-100 - من خلال موزع (موزع أوتوماتيكي للأدوية)، يجب استخدام دواء غير مخفف أو تخضير المحلول الأم مع ماء الشرب بنسبة: 1 لتر من الدواء لما لا يقل عن 40 لترًا من ماء الشرب! يتم حساب كمية الدواء وفقًا لتوصيات الجرعة. لا يُنصح بخلط فلوسين-100 في العبوة نفسها مع أدوية أخرى.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة: 14 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية. بعد التخفيف، يجب استخدام محلول الدواء خلال 24 ساعة.

TILMICON-250 (تيلميكون 250)

محلول فموي

قوارير من مواد بوليمرية سعة 1000 مل



الوصف

سائل شفاف يتراوح لونه بين البني الفاتح والبني.

المكونات

100 مل من الدواء على المادة الفعالة تيلميكوسين 25 غرام.

المواد المساعدة: بروبيلين جليكول، كحول بنزيلي، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف vet QJ01 ATC - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى. QJ01FA91 - تيلميكوسين.

إن تيلميكوسين هو مضاد حيوي شبه اصطناعي من مجموعة الماكروليدات، يعمل كمضاد للبكتيريا بتركيزات منخفضة، وكمبيد للجراثيم بتركيزات عالية ضد بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.

الاستخدام

العجول (تحت عمر 3 أشهر): علاج الحيوانات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن *M. dispar*، *Mycoplasma bovis*، *Pasteurella multocida*، و *haemolytica*، وغيرها من الكائنات الدقيقة الحساسة للتيلميكوسين.

الدجاج (الكنايك، ودجاج التسمين، وصغار الدجاج المرية لاستبدال الكبار، وأزواج الدجاج) والديك الرومي: علاج الدواجن المصابة بأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن *Mycoplasma gallisepticum*، *M. meleagridis*، *M. synoviae*، و *Ornithobacterium rhinotracheale*، *Pasteurella multocida*.

وبغیرها من الكائنات الدقيقة الحساسة للتيلميكوسين.

طريقة الإعطاء والجرعة

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول تحت عمر 3 أشهر مع ماء الشرب أو بديل الحليب، 1 مل من الدواء لكل 20 كغم من وزن الجسم مرة واحدة يوميًا	300 مل من الدواء لكل 1000 لتر من ماء الشرب يوميًا.	5-3 أيام	للذبح للحوم - 24 يومًا
الدواجن			للذبح للحوم - 12 يومًا

فترة الانسحاب

يجب تحضير المحلول العلاجي يوميًا بكمية من الماء المطلوب استهلاكها خلال يوم كامل. بالنسبة للحوم - 42 (العجول) و 12 (الدجاج والديك الرومي) بعد العلاج الأخير.

مدة الصلاحية

اثنتان.

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 14 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية بعد التخفيف في ماء الشرب: 24 ساعة. مدة الصلاحية بعد التخفيف في بديل الحليب: 4 ساعات.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

TRICOLIN (تريكولين)

محلول فموي

في قوارير من مواد بوليمرية سعة 10 و 1000 مل



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأصفر الداكن.

المكونات

تحتوي 001 مل من الدواء على المواد الفعالة:

إينزوفلوكساسين - 0,01 غرام؛ تريمتوبريم - 0,3 غرام؛

كوليستين سلفات - UI 00000005. المكونات المساعدة:

كحول بنزيلي، حمض اللاكتيك، إيديتات ثنائي الصوديوم، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف CTQ 101Q - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهاز. 69AR101Q - كينولونات، مع أدوية مضادة للميكروبات أخرى. إن تريكولين هو دواء مركب، وتأثيره العلاجي ناتج عن التأثير التآزري لمكوناته الفعالة: إينزوفلوكساسين، وتريمتوبريم، وكوليستين سلفات. ينتمي إينزوفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكينولونات. تعتمد آلية عمل إينزوفلوكساسين على تثبيط إنزيم الجيريز للحمض النووي للبكتيريا، مما يمنع عملية تضاعف الحمض النووي، بالإضافة إلى تعطيل سلامة غشاء الخلية البكتيرية، مما يؤدي إلى موتها.

الاستخدام

علاج العجول (تحت عمر 3 أشهر) من أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي (كما في ذلك داء الإشريكية القولونية) التي تسببها كائنات دقيقة حساسة للإينزوفلوكساسين، وتريمتوبريم، وكوليستين ومركباتها.

علاج الدواجن (دجاج التسمين، ودواجن التربية، وصغار الدجاج المرباة لاستبدال الكبار، والقطيع الأم ودجاج التسمين، والدجاج الرومي المستأنس) من أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأعضاء تكوين البيض التي تسببها كائنات دقيقة حساسة للإينزوفلوكساسين، تريمتوبريم، وكوليستين.

الجرعات

عن طريق الفم مع ماء الشرب.

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول تحت عمر 3 أشهر	0,5-1,0 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم مرة واحدة يوميًا	3-5 أيام	للذبح للحوم - 41 يومًا
الدواجن	1,0 لتر من الدواء لكل 1000 لتر من مياه الشرب	3-5 أيام في حالة الإصابة بداء السالمونيلا، والالتهابات المختلطة، والأشكال المزمنة من الأمراض، يُمدد مسار العلاج إلى 5-7 أيام	للذبح للحوم - 7 يومًا

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة: 41 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

بعد التخفيف بالماء، يجب استخدام الدواء خلال 42 ساعة.

AMOXAN PREMIUM (أموكسان بريميوم)

مستحضر معلق للحقن

قوارير سعة 10، 100، 250 مل



مستحضر معلق يتراوح لونه بين الأبيض الكريمي والأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

أموكسيسيلين (على شكل أموكسيسيلين تريهيدرات عالي النقاء بحجم الميكرون) - 0.051 ملغ، المواد المساعدة: كحول بنزيلي، بوتيل هيدروكسي تولوين، بوتيل هيدروكسي أنيسول،

بروبيلين جليكول ديكابريلات/ديكابرات.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف CTA 10JQ - tev أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازي. 40AC10JQ - أموكسيسيلين.

الاستخدام

الأبقار والأغنام والماعز: علاج الحيوانات المصابة بأمراض الجهاز الهضمي (التهاب الأمعاء، التهاب المعدة والأمعاء، التهاب القولون)، والجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، التهاب الرئوي القصبي، التهاب الأنف)، والجهاز البولي التناسلي (التهاب الرحم، التهاب بطانة الرحم، التهاب المثانة، التهاب الإحليل، التهاب الحويضة والكلية)، وأمراض المفاصل، والجلد والأنسجة الرخوة (التهابات السرة، ولجروح، الخراجات) التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأموكسيسيلين.

الخنزير: علاج الحيوانات المصابة بأمراض الجهاز الهضمي (التهاب الأمعاء، التهاب المعدة والأمعاء، التهاب القولون)، والجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، التهاب الرئوي القصبي، التهاب الأنف)، والجهاز البولي التناسلي (التهاب الرحم، التهاب بطانة الرحم، التهاب المثانة، التهاب الإحليل، التهاب الحويضة والكلية، التهاب الضرع، فشل الرضاعة)، وأمراض المفاصل، والجلد والأنسجة الرخوة (التهابات السرة، الجروح، الخراجات، التهابات)، وداء البريميات، وداء الشعيات، والحمرة الخنزيرية، ونظيرة الإنفلونزا، ونظيرة التيفية التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للأموكسيسيلين.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	1 مل من الدواء لكل 10 كغم من وزن الجسم (ما يعادل 15 ملغ من أموكسيسيلين لكل 1 كغم من وزن الجسم).	بالحقن العضلي مرة واحدة. عند الضرورة، يتم إعادة الحقن بعد 48 ساعة.	للذبح للحوم - 81 يومًا للحليب - 3 أيام
الخنزير			للذبح للحوم - 20 يومًا

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.



الوصف

مستحضر معلق للحقن لونه من الأبيض إلى الأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المواد الفعالة:

أموكسيسيلين (على شكل أموكسيسيلين تريهيدرات) - 041 ملغ؛ حمض الكلافولانيك (على شكل كلافولانات البوتاسيوم) - 53 ملغ؛
المواد المساعدة: كحول بنزيلي، بوتيل هيدروكسي تولوين، بوتيل هيدروكسي أنيسول، بروبيلين جليكول دديكابريلات / ديكابرات، ثاني أكسيد السيليكون الغرواني.
الخصائص الدوائية

رمز تصنيف CTA tev هو 1010 - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازي. 2OBC100 - أموكسيسيلين ومثبط إنزيم.
يعطل أموكسيسيلين تركيب جدار الخلية البكتيرية عن طريق تثبيط إنزيمي ترانس بيتيداز وكاربوكسي بيتيداز، مما يسبب اختلال التوازن الأسموزي وموت
البكتيريا في مرحلة النمو. يتمتع الأموكسيسيلين بتأثير مضاد للميكروبات واسع الطيف ضد بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.

الاستخدام

علاج الماشية من أمراض الجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، التهاب الرئوي القصبي، التهاب الأنف)، والجهاز البولي التناسلي (التهاب الرحم، التهاب المثانة، التهاب
الإحليل، التهاب الحويضة والكلية)، وأمراض المفاصل، والجلد والأنسجة الرخوة (كما في ذلك الجراحات) التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للأموكسيسيلين وحمض
الكلافولانيك. يجب أن يستند استخدام الدواء إلى دراسة حساسية الكائنات الدقيقة للأموكسيسيلين وحمض الكلافولانيك، مع مراعاة التوصيات المحلية.

الجرعات

بالحقن العضلي مرة واحدة يوميًا

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	1 مل من الدواء لكل 20 كغم من وزن الجسم (ما يعادل 7 ملغ من أموكسيسيلين و1,75 ملغ من حمض الكلافولانيك لكل 1 كغم من وزن الجسم)	5-3 أيام	للذبح للحوم - 24 يومًا للحليب - 06 ساعة

من اللازم استخدام محاقن وإبر جافة فقط لأخذ الدواء، وبقطر لا يقل عن 8,0 مم. قبل الأخذ، امسحوا الغطاء مهندس مبدل مبلل بمحلول مطهر. بعد الحقن، يجب
القيام بتدليك خفيف لمكان الحقن. لا يُسمح بحقن أكثر من 02 مل في مكان الحقن الواحد - للأبقار.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

42 شهرًا.

يجب استخدام الدواء خلال 82 يومًا بعد فتح القارورة وأول استخدام له، بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

CEFTIFUR-50 (سيفتيفور - 50)

مستحضر معلق للحقن

قوارير سعة 10، 100 مل



الوصف

مستحضر معلق للحقن لونه من الأبيض إلى الأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة: سيفتيفور (على شكل هيدروكلوريد) - 05 ملغ.
المواد المساعدة: كحول بنزلي، بوتيل هيدروكسي تولوين، بوتيل هيدروكسي أنيسول، بروبيلين جليكول ديكابريلات / ديكابريرات.
الخصائص الدوائية

رمز تصنيف 10JQ CTA tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهاز. 09DD10JQ - سيفتيفور - مضاد حيوي من فئة السيفالوسبورينات من الجيل الثالث، يتمتع بتأثير واسع الطيف، وهو فعال ضد بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.
الاستخدام

الأبقار: علاج الحيوانات المصابة بالتهاب الرحم الحاد بعد الولادة، والعدوى النخرية (الداحس، تعفن الحافر)، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للسيفتيفور.

الجرعات

النوع من الحيوانات	المرض	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	أمراض الجهاز التنفسي	1 مل لكل 50 كغم من وزن الجسم مرة واحدة يوميًا	بالحقن العضلي 3-5 أيام	للذبح للحوم - 8 أيام للحليب - 0 أيام
	العدوى النخرية الحادة	1 مل لكل 50 كغم من وزن الجسم مرة واحدة يوميًا	بالحقن العضلي لمدة 3 أيام	
	التهاب الرحم الحاد بعد الولادة (بعد 10 أيام من الولادة)	1 مل لكل 50 كغم من وزن الجسم مرة واحدة يوميًا	تحت الجلد لمدة 5 أيام	

الجرعة القصوى الموصى بها للإعطاء للمرة الواحدة للأبقار هي 01 مل من الدواء لكل 50 كغم من وزن الجسم؛

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.
مدة الصلاحية

3 سنوات. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

DANOXAN-25 (دانوكسان - 25)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

سائل أصفر فاتح شفاف بدون جزيئات مرئية.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة: دانوفلوكساسين (على شكل دانوفلوكساسين ميسيلات) - 52 ملغ المواد المساعدة: حمض اللاكتيك، ميتايبسلفيت الصوديوم، كحول بنزيلي، هيدروكسيد الصوديوم، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف 10JQ CTA tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى. 29AM10JQ - دانوفلوكساسين.

إن دانوفلوكساسين هو مضاد حيوي واسع الطيف وينتمي إلى مجموعة الفلوروكوينولونات من الجيل الثالث. تعتمد آلية عمله على تثبيط إنزيم الجيريز للحمض النووي البكتيري، وهو ضروري لنسخ الحمض النووي البكتيري.

يعمل الدواء ضد بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام والميكوبلازما.

الاستخدام

علاج الأبقار من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للدانوفلوكساسين.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	تحت الجلد 0,5 مل من الدواء لكل 10 كغم من وزن الجسم	3 أيام، يمكن تمديد مسار العلاج ليومين آخرين عند الحاجة.	للذبح للحوم - 5 أيام للحليب - 4 أيام

يجب ألا تتجاوز الجرعة المعطاة 02 مل للأبقار.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 41 يومًا بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

ENROXAN-50 (إنروكسان - 50)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

سائل أصفر فاتح شفاف بدون جزئيات مرئية.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

إينروفلوكساسين - 05 ملغ.

المواد المساعدة: هيدروكسيد البوتاسيوم، إيديتات الصوديوم، كحول بنزلي، جلسرين، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

ينتمي إينروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكوينولونات من الجيل الثاني، وهو يثبط تخليق الحمض النووي في نوى الخلايا الميكروبية، وله تأثير مبيد للجراثيم ضد الكائنات الدقيقة الإيجابية الغرام والسلبية الغرام.

الاستخدام

العجول: علاج الحيوانات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي (داء الباستوريلا، وداء الميكوبلازما، وداء الإشريكية القولونية) التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للإينروفلوكساسين (E. iloc. و H. sulihpomea و P. alleruetsa و P. succocolyphat و M. amsalpocy).

الكلاب: علاج الحيوانات المصابة بأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي، بالإضافة إلى أمراض الجلد والتهابات الجروح التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة (E. iloc. و H. allenomla و P. alleruetsa و H. sulihpomea و S. succocolyphat و P. succocolyphat).

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول	تحت الجلد بجرعة 0,5 مل من الدواء لكل 10 كغم من وزن الجسم	مرة واحدة يوميًا لمدة 3-5 أيام، وفي الحالات الشديدة - حتى 10 أيام	للذبح للحوم - 21 يومًا
الكلاب	بالحقن العضلي بجرعة 1 مل من الدواء لكل 10 كغم من وزن الجسم		—

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

ENROXAN-100 (إنروكسان - 100)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأصفر بدون جزيئات مرئية.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة: إنزوفلوكساسين - 001 ملغ. المواد المساعدة: هيدروكسيد البوتاسيوم، كحول بنزيلي، ماء للحقن. الخصائص الدوائية
رمز تصنيف 09AM10JQ - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى. ينتمي إنزوفلوكساسين إلى مجموعة
الفلوروكينولونات. يعمل إنزوفلوكساسين كمبيد للجراثيم على بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام. يتميز إنزوفلوكساسين بتوزيع واسع. وهكذا، عادةً
ما تكون تركيزاته في الأنسجة والأعضاء أعلى بكثير من تركيزه في مصل الدم. الأعضاء التي يلاحظ فيها أعلى تركيز هي الرئتان والكبد والكلى والأمعاء والأنسجة
العضلية.

الاستخدام

علاج الأبقار والأغنام والماعز من أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للإنزوفلوكساسين.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	تحت الجلد بجرعة 0,25 مل من الدواء لكل 10 كغم من وزن الجسم (2,5 ملغ لكل 1 كغم من الوزن)	3 أيام، في حالات داء السالمونيلا - 5 أيام	للذبح للحوم - 12 يومًا للحليب 4 - أيام
الأغنام والماعز			للذبح للحوم - 10 أيام للحليب 5 - أيام

لعلاج التهابات الجهاز التنفسي المتكررة وداء السالمونيلا، تُضاعف الجرعة، أي ما يصل إلى 5,0 مل من الدواء لكل 01 كغم من وزن الجسم مرة واحدة يوميًا.
إذا تجاوز حجم الجرعة 5 مل للأبقار والأغنام والماعز، و5,2 مل للحملان والجديان، فيجب تقسيمها وإعطائها في مناطق مختلفة من الجسم.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

ENROXAN MAX (إنروكسان ماكس)

مستحضر معلق للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

مستحضر معلق يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأصفر.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة: إينروفلوكساسين - 001 ملغ. المواد المساعدة: كحول بنزلي، بوتيل هيدروكسي تولوين، بوتيل هيدروكسي أنيسول، بروبيلين جليكول ديكابريلات / ديكابريرات.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف 10JQ CTA tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى. 09AM10JQ - إينروفلوكساسين. ينتمي إينروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكوينولونات. يثبط تخليق إنزيم الجيريز للحمض النووي للبكتيريا في نوى الكائنات الدقيقة. يعمل إينروفلوكساسين كمبيد للجراثيم على بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام، كما أنه يعمل ضد الميكوبلازما والكلاميديا. الاستخدام الأبقار: علاج الحيوانات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن بكتيريا *acetylomeah aimiehnnaM* و *adicotum alleruetsaP*، و *sluhpomeaH* و *inmos*، و *pps amsalpocyM* الحساسة للإينروفلوكساسين. علاج الأبقار المصابة بالتهاب الضرع شبه الحاد والحاد الناتج عن *iloc.E* والمُسببات الأخرى الحساسة للإينروفلوكساسين.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	7,5 مل من الدواء لكل 100 كغم من وزن الجسم (7,5 ملغ من إينروفلوكساسين لكل 1 كغم من وزن الجسم)	تحت الجلد مرة واحدة	للذبح للحم - 14 يومًا للحليب - 84 ساعة

لا يُسمح بحقن أكثر من 51 مل في موضع الحقن الواحد - للأبقار.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

FLOCINE-300 (فلوسين - 300)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأصفر.

المكونات

تحتوي 001 مل من الدواء على المادة الفعالة فلورفينيكول - 0,03 غرام. المكونات المساعدة:

ميثيل بيروليدون، كحول إيثيلي، بروبيلين جليكول، بولي إيثيلين جليكول.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف Q10 CTA tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى. (Q10AB09 - إن فلورفينيكول له تأثير مضاد للبكتيريا الإيجابية الغرام

والسلبية الغرام.

الاستخدام

علاج الأبقار والأغنام والماعز من أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي التي تسببها كائنات دقيقة حساسة للفلورفينيكول.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار الأغنام والماعز	بالحقن العضلي بجرعة 1 مل لكل 15 كغم من وزن الجسم	مرتين بفاصل 48 ساعة	للذبح للحوم - 03 يومًا للحليب - 4 أيام
	تحت الجلد - بجرعة 2 مل من الدواء لكل 15 كغم من وزن الجسم	مرة واحدة	للذبح للحوم - 44 يومًا

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

OTC-200 L.A. (أو تي سي 200- طويل المفعول)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

سائل شفاف يتراوح لونه بين الأصفر الداكن والبني.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة: أوكسي تتراسيكلين (على شكل أوكسي تتراسيكلين ديهيدرات) - 002 ملغ. المواد المساعدة: ميثيل بيريوليدون، بولي فاينيل بيريوليدون، أكسيد المغنيسيوم، هيدروكسي ميثان سلفونات الصوديوم، إيثانولامين، ما للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف 10JQ CTA tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازي. 60AA10JQ - أوكسي تتراسيكلين. إن "أو تي سي-002 طويل المفعول" هو مضاد حيوي ممتد المفعول يحتوي على أوكسي تتراسيكلين كمكون فعال. أوكسي تتراسيكلين هو مضاد حيوي من مجموعة التتراسيكلين وله تأثير مضاد للبكتيريا. أوكسي تتراسيكلين فعال ضد معظم بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.

الاستخدام

علاج الحيوانات من التهابات الأولوية والثانوية الحادة والمزمنة في الجهاز الهضمي، والمسالك البولية والتناسلية، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى التهابات الجهاز الحركي (العظام، والمفاصل، والعضلات)، والتهابات السرة، والجلد والأغشية المخاطية، التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسيكلين. الوقاية من المضاعفات البكتيرية الناتجة عن الآثار الضارة للإجهاد أثناء النقل أو الحركة أو تغيير النظام الغذائي، بالإضافة إلى الوقاية من العدوى المحتملة أثناء الولادة أو الجراحة أو بعدها. الأبقار والأغنام والماعز: علاج الحيوانات التي تعاني من التهابات ثانوية كالتهاب الرئوي الفيروسي، والتهاب الأمعاء البكتيري (داء الإشريكية القولونية)، والبرد أثناء النقل.

الجرعات

بالحقن العضلي

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار والأغنام والماعز	1 مل من الدواء لكل 01 كغم من وزن الجسم (02 ملغ من المادة الفعالة لكل 1 كغم من وزن الجسم)	مرة واحدة، وعند الضرورة، يجب إعادة الحقن بعد 72 ساعة	للذبح للحوم - 21 يومًا للحليب - 7 أيام
الحملات	2 مل لكل حيوان		

إذا تجاوز حجم جرعة الحقن 02 مل للأبقار، و5 مل للأغنام والماعز، فيجب تقسيمها وإعطائها في مكانين مختلفين.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

42 شهرًا.

يجب استخدام الدواء خلال 82 يومًا بعد فتح القارورة وأول استخدام له، بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين الأصفر والبني الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة تايلوزين تارترا - 002 ملغ. المواد المساعدة: كحول بنزيلي، بروبيلين جليكول، ماء للحقن. الخصائص الدوائية
رمز تصنيف Q10 CTA tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهاز. 09AF10JQ - تايلوزين، مضاد حيوي من مجموعة الماكروليدات. إن تايلوزين
فعال ضد الكائنات الدقيقة الإيجابية الغرام والسلبية الغرام، بالإضافة إلى الميكوبلازما والكلاميديا والريكتسيا.

الاستخدام

علاج الأبقار والأغنام والماعز من أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي التي تسببها كائنات دقيقة حساسة للتايلوزين.

الجرعات

بالحقن العضلي مرة واحدة يوميًا بالجرعات التالية:

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	52,0 مل لكل 01 كغم من وزن الجسم (5 ملغ من تايلوزين تارترا لكل 1 كغم من وزن الجسم)	يجب أن يستمر العلاج لمدة 24 ساعة أخرى بعد زوال أعراض المرض، على ألا تتجاوز 5 أيام.	للذبح للحوم - 82 يومًا للحليب - 4 أيام
الأغنام والماعز	5,0 مل لكل 01 كغم من وزن الجسم (10 ملغ من تايلوزين تارترا لكل 1 كغم من وزن الجسم)		للذبح للحوم - 42 يومًا

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

SPECTRAN (سبيكتران)

مستحضر معلق للحقن

قوارير سعة 10، 50، 100 مل



مستحضر معلق يتراوح لونه بين الأبيض الكريمي والأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المواد الفعالة:

أموكسيسيلين (على شكل أموكسيسيلين تريهيدرات) - 051 ملغ؛ وبيتاميثازون ديروبيونات (محسوبةً على بيتاميثازون) - 5,0 ملغ؛

المواد المساعدة: كحول بنزيلي، بوتيل هيدروكسي تولوين، بوتيل هيدروكسي أنيسول، ستيرات الألومنيوم، بروبيلين جليكول ديكابريلات / ديكابريرات.

الخصائص الدوائية

إن سبيكتران هو دواء مركب ذو تأثير مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات. المكونات الفعالة في سبيكتران هي المضاد الحيوي أموكسيسيلين والكورتيكوستيرويد بيتاميثازون. يتمتع الأموكسيسيلين بتأثير مضاد للميكروبات واسع الطيف، وأما البيتاميثازون، فيعزز العمليات المضادة للالتهابات في الجسم، ويمنع حدوث ردود فعل تحسسية محتملة (بما في ذلك تجاه مكونات الدواء).

الاستخدام

علاج الكلاب والقطط المصابة بأمراض الجهاز الهضمي (التهاب الأمعاء، التهاب المعدة والأمعاء، التهاب المعدة والأمعاء والقولون)، والجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، التهاب الرئوي القصبي، التهاب الأنف)، والجهاز البولي التناسلي (التهاب الرحم، التهاب بطانة الرحم، التهاب الضرع، فشل الرضاعة، التهاب المثانة، التهاب الإحليل، التهاب الحويضة والكلية)، وأمراض المفاصل، والجلد والأنسجة الرخوة؛ والتهاب الأذن الحاد والمزمن، والتهابات ما بعد الجراحة، والتهابات الجروح، والتهابات ما بعد الولادة، وغيرها من الالتهابات الأولية والثانوية التي تسببها البكتيرية التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للأموكسيسيلين.

الجرعات

بالحقن العضلي أو تحت الجلد مرة واحدة بجرعة 1,0 مل من الدواء لكل 1 كغم من وزن الحيوان. عند الضرورة، يُعطى الدواء مجدداً بعد 84 ساعة.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يوماً بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية. شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

TILMICON-300 (تيلميكون-300)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين الأصفر والبني الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة: تيلميكوسين - 003 ملغ.

المواد المساعدة: كحول بنزلي، بروبيلين جليكول، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف Q10 tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازي. 19AF10JQ - تيلميكوسين.

إن تيلميكوسين هو مضاد حيوي شبه اصطناعي من مجموعة المكاروليدات، يعمل كمضاد للبكتيريا بتركيزات منخفضة، وكمبيد للجراثيم بتركيزات عالية، ويؤثر بشكل رئيسي على بكتيريا إيجابية الغرام، وعلى بعض بكتيريا سلبية الغرام والميكوبلازما.

الاستخدام

علاج الأبقار والأغنام المصابة بداء العصبية النخرية بين الأصابع، وتغفن الحافر (الناتج عن susodon retcabolehciD وmurohporcen muiretcabosuF)، والتهاب الضرع الحاد (الناتج عن acitylomeah aimiehnnaM وadicotlum alleruetsaP)، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها بكتيريا.

الجرعات

تحت الجلد

التنوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	1 مل لكل 30 كغم من وزن الجسم (10 ملغ من تيلميكوسين لكل 1 كغم من وزن الجسم)	مرة واحدة، عند الضرورة، يجب إعادة الحقن بعد 48 ساعة	للذبح اللحوم - 70 يومًا للحليب - 36 يومًا
الأغنام والماعز			للذبح اللحوم - 42 يومًا للحليب - 18 يومًا

خذ الدواء من القارورة بالمحقنة بالجرعة المطلوبة، وافصل المحقنة عن الإبرة، مع ترك الإبرة في القارورة. إذا كان من المخطط علاج مجموعة من الحيوانات، يجب ترك الإبرة في القارورة لأخذ الدواء بالجرعات اللاحقة. ثبت الحيوان وأدخل إبرة أخرى منفصلة تحت الجلد، خلف لوح الكتف. صل المحقنة بالإبرة واحقن في قاعدة الطية الجلدية. عند استخدام الدواء في الحملان، من المهم مراقبة وزن الجسم بدقة لمنع الجرعة الزائدة. إذا تجاوز حجم جرعة الحقن 02 مل للأبقار أو 2 مل للأغنام، فيجب تقسيمها وإعطائها في مكانين مختلفين.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

TULAXAN (تولاكسان)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل

الجديد



الوصف

حل واضح يتراوح من الأصفر إلى البني الفاتح.
المكونات

1 مل من المنتج يحتوي على المادة الفعالة تولاثروميسين - 100 ملغ.

السواغات: مونوثيوجليسيرول، بروبيلين غليكول، حمض الستريك، حمض الهيدروكلوريك، هيدروكسيد الصوديوم، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز التصنيف البيطري ATC QJ01 - الأدوية البيطرية المضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى، الماكروليدات. QJ01FA94 - تولاثروميسين.

تولاثروميسين هو مضاد حيوي شبه اصطناعي من مجموعة الماكرولايد. وهو يختلف عن العديد من الماكروليدات الأخرى من خلال تأثيره المطول (جزئيًا بسبب مجموعاته الأمينية الثلاث)، واسم الفئة الفرعية الكيميائية هو ترياميليد.

يعمل تولاثروميسين بشكل مضاد للجراثيم. نظرًا لقدرته على الارتباط الانتقائي بالحمض النووي الريبوزي البكتيري وتحفيز تفكك peptidyl-tRNA الريبوسوم أثناء النقل، فإنه يمنع التخليق الحيوي للبروتينات الضرورية للبكتيريا.

تطبيق

الماشية: علاج الحيوانات المصابة بالتهاب القرنية والملتحمة المعدي الناجم عن موراكسيلا بوفيس الحساسية للتولاثروميسين. علاج فرط الحساسية لأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها مانهايميا هيموليتيكا، وباستوريل مولتوسيدا، وهيستوفيلوس سومني، والميكوبلازما بوفيس الحساسية للتولاثروميسين.

الأغنام: علاج الحيوانات في المراحل المبكرة من التهاب الجلد البودي المعدي (تعفن القدم) الناجم عن Dichelobacter nodosus، الحساس للتولاثروميسين.

جرعة

تحت الجلد.

النوع من الحيوانات	الجرعات	دورة العلاج	فترة الانسحاب
قرع	1 مل من المنتج لكل 40 كجم من وزن الجسم (2,5 ملغ من تولاثروميسين لكل 1 كجم من وزن جسم الحيوان)	استخدام واحد، إذا لزم الأمر، يمكن إعطاء المنتج مرة أخرى بعد 48 ساعة	اللحوم - 22 يومًا
خروف			اللحوم - 16 يومًا

تعليمات الاستخدام

اسحب الجرعة المطلوبة من المنتج إلى حقنة من القارورة وافصل المحقنة عن الإبرة، تاركًا الإبرة في القارورة. إذا تم التخطيط لعلاج مجموعة من الحيوانات، يجب ترك الإبرة في القارورة للجرعات اللاحقة. قم بتقييد الحيوان وأدخل إبرة أخرى منفصلة تحت الجلد خلف شفرة الكتف. اربط المحقنة بالإبرة وحقن المحلول في قاعدة طية الجلد. عند إعطاء المنتج للحمل، من المهم مراقبة وزن الجسم بدقة لتجنب الجرعات الزائدة.

إذا تجاوز حجم الجرعة 20 مل للماشية أو 2 مل للأغنام، فيجب تقسيمها وحقنها في مواقع مختلفة.

شروط التخزين

يُحفظ في مكان جاف ومظلم، لا يمكن للأطفال الوصول إليه، عند درجة حرارة تتراوح من 5 درجات مئوية إلى 25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان.

بعد أخذ الجرعة الأولى من القارورة، يجب استخدام المنتج في غضون 28 يومًا، بشرط أن يتم تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة حرارة من 5 درجات مئوية إلى 25 درجة مئوية.

AMOXAN-500 (أموكسان- 500)

مسحوق للاستخدام الفموي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



الوصف

مسحوق يتراوح لونه بين الأبيض الكريمي والأصفر الفاتح.

المكونات

تحتوي 001 غرام من الدواء على المادة الفعالة: أموكسيسيلين (على شكل أموكسيسيلين تريهيدرات) - 05 غرام. المواد المساعدة: سترات الصوديوم، ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، كربونات الصوديوم اللامائية. ينتمي أموكسيسيلين إلى مجموعة المضادات الحيوية بيتا لكتاماز. يعطل تركيب جدار الخلية البكتيرية عن طريق تثبيط إنزيمي ترانس ببتيداز وكاربوكسي ببتيداز، مما يسبب اختلال التوازن الأسموزي وموت البكتيريا في مرحلة النمو. إن الدواء فعال ضد بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.

الاستخدام

علاج الدواجن (دجاج التسمين، والدجاج الصغير، والديك الرومي، وصغار الديك الرومي) من أمراض الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والجهاز البولي التناسلي، والمفاصل، والجلد والأنسجة الرخوة التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للأموكسيسيلين.

الجرعات

عن طريق الفم مع ماء الشرب، أو العلف، أو مع بديل الحليب بالجرعات التالية

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الدواجن	عن طريق الفم مع ماء الشرب أو العلف، بناءً على الجرعة اليومية: $M \times 40,0 = m$ - تركيز الدواء في ماء الشرب (غرام): 40,0 - جرعة دواء أموكسان-005: - M - الوزن الحي الإجمالي للدواجن (كغم)	للذبح للحوم - 6 يومًا	

بما أن استهلاك الماء يُمثل حوالي 20% من وزن الحيوان، فإن هذه الجرعة تعادل 004 غرام من أموكسان-005 في 0001 لتر من مياه الشرب.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في العبوة الأصلية من الشركة المصنعة بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية بعد التخفيف في ماء الشرب: 42 ساعة.

CIPROCOLIN (سيبروكولين)

مسحوق للاستخدام الفموي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



الوصف

مسحوق متجانس أبيض أو أصفر فاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادتين الفعاليتين:

سيبروفلوكساسين (على شكل هيدروكلوريد) - 001 ملغ؛ كوليسيتين سولفات - UI 0000001
المواد المساعدة: حمض الأسكوربيك، بيكرونات الصوديوم، سكروز.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف tev CTA هو 100 - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازي. 59AR10JQ - بوليميكسينات، مع أدوية أخرى مضادة للميكروبات. إن سيبروكولين هو دواء مركب وتأثيره العلاجي ناتج عن التأثير التآزري لمكونيه الفعالين: سيبروفلوكساسين وكوليسيتين سولفات.

ينتمي سيبروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكوينولونات. إن كوليسيتين هو مضاد حيوي من مجموعة البوليميكسينات.

الاستخدام

علاج الطيور (الحمام) المصابة بداء الإشريكية القولونية، وداء السالمونيلا، وعدوى المكورات العنقودية، وداء الباستوريلا، والتهاب الأمعاء النخري، والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، والالتهابات المختلطة والثانوية عند الأمراض الفيروسية التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للسيبروفلوكساسين والكوليسيتين.

الجرعات

الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
عن طريق الفم مع الماء بجرعة: 0,5-1,0 غرام من الدواء لكل 1 لتر من الماء.	3-5 أيام	للذبح للحوم - 11 يومًا

خلال فترة العلاج، يجب أن تتلقى الطيور (الحمام) الماء المحتوي على الدواء فقط؛ ويجب تحضير محلول جديد من الدواء يوميًا بكمية محسوبة للاستهلاك اليومي.

فترة الانسحاب

فترة الانسحاب للذبح للحوم - 11 يومًا.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من 5+ إلى 52+ درجة مئوية.

مدة الصلاحية

3 سنوات.

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا. مدة الصلاحية بعد التخفيف: 42 ساعة.

COLIDOXYN (كوليدوكسين)

مسحوق للاستخدام القموي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



المكونات

يحتوي 1 غرام من الدواء على المادتين الفعالتين:

دوكسيسايلكلين هيكلات - 052 ملغ؛ كوليسيتين سولفات - UI 2 004 000.

المواد المساعدة: سيليكات مدخنة، سكروز، حمض الستريك.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف I Q CTA tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازي. 09AR10JQ - تراسيكلينات، مع أدوية أخرى مضادة للميكروبات. إن

دوكسيسايلكلين هو مضاد حيوي مضاد للبكتيريا ينتمي إلى مجموعة التتراسيكلين.

إن كوليسيتين هو مضاد حيوي من مجموعة البوليبيكسينات.

الاستخدام

علاج الأبقار (العجول تحت عمر 8 أسابيع) المصابة بتسمم الدم، وأمراض الجهاز التنفسي (الالتهاب القضيبي الرئوي، والتهاب الغشاء الجنبي والرئة، والتهاب الأنف الضموري، وغيرها) والجهاز الهضمي (داء الإشريكية القولونية، وداء السالمونيلا) الناتجة عن الميكروبات الحساسة لدوكسيسايلكلين وكوليسيتين.

علاج الدواجن (دجاج التسمين، والقطيع الأم، وصغار الدجاج المرباة لاستبدال الكبار، والديك الرومي) المصابة بداء الإشريكية القولونية، وداء السالمونيلا، وداء الطيور، وتسمم الدم، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة لدوكسيسايلكلين وكوليسيتين.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول (تحت عمر 8 أسابيع)	2 غرام من الدواء لكل 001 كغم من وزن الجسم (5 ملغ من دوكسيسايلكلين هيكلات و 48 000 IU من كوليسيتين سولفات لكل 1 كغم من الوزن)	مرتين يوميًا، مع ماء الشرب 3-5 أيام	للذبح للحوم - 41 يومًا
الدواجن	عن طريق الفم مع ماء الشرب أو العلف بجرعة: 10 غرام من الدواء لكل 100 كغم من وزن الجسم (25 ملغ من دوكسيسايلكلين هيكلات و 240 000 IU من كوليسيتين سولفات لكل 1 كغم من الوزن) يوميًا، ما يعادل 200 غرام من الدواء لكل 500-1000 لتر من ماء الشرب	5 أيام	للذبح للحوم - 7 يومًا

لتحضير المحلول الأم، يتم سكب الكمية المطلوبة من ماء الشرب في وعاء صغير، ويفضل أن يكون الماء دافئًا، ويتم إضافة الدواء بأجزاء صغيرة مع التحريك المستمر حتى يذوب المسحوق تمامًا (بنسبة: 2,0 أو 4,0 كغم من الدواء لكل 01 لتر من ماء الشرب). يجب إضافة المحلول الأم المحضر بهذه الطريقة فورًا إلى الكمية المطلوبة من ماء الشرب. عند استخدام الدواء مع ماء الشرب، يتم تحضير المحلول بناءً على الكمية المطلوبة من ماء الشرب (وفقًا لمعايير شرب الماء لكل نوع وفترة عمرية من الحيوانات)، والجرعة، ووزن الحيوانات. يجب تحضير محلول جديد من الدواء يوميًا.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان، بشرط تخزينه في العبوة الأصلية من الشركة المصنعة. مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه مغلقًا بإحكام في مكان مظلم وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات، عند درجة الحرارة من +51 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية بعد التخفيف في ماء الشرب: 42 ساعة.

COLITYL-P (كوليتيل-P)

مسحوق للاستخدام الفموي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



الوصف

مسحوق التدفق الحر المتجانس، يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأصفر.

المكونات

يحتوي 1 غرام من الدواء على المادتين الفعالتين:

تايلوزين تارترات - 05 ملغ؛ كوليستين سولفات - UI 1 000 000.

المواد المساعدة: ثاني أكسيد السيليكون، سكروز.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف 10Q tev CTA - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهاز. 59AR10JQ - بوليميكسينات، مع أدوية أخرى مضادة للميكروبات. إن كوليتيل-P هو دواء مركب وتأثيره العلاجي ناتج عن التأثير التآزري لمكوناته الفعالتين: تايلوزين تارترات وكوليستين سولفات.

الاستخدام

علاج العجول (تحت عمر 3 أشهر)، من أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة لكوليستين وتايلوزين.

علاج دجاج التسمين والديك الرومي من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة لكوليستين وتايلوزين.

الجرعات

عن طريق الفم مع ماء الشرب بجرعة:

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول (تحت عمر 3 أشهر)	مع ماء الشرب 1 غرام من الدواء لكل 01 كغم	3-5 أيام	للذبح للحوم - 21 يومًا
الدواجن	عن طريق الفم مع ماء الشرب أو العلف بجرعة: 1 غرام من الدواء لكل 10 كغم من وزن الجسم، أو 0,5-1,0 كغم من الدواء لكل 1000 لتر من ماء الشرب.	5 أيام	للذبح للحوم - 7 يومًا

يتم إعطاء الدواء للعجول بشكل فردي، مع ماء الشرب، بعد تخفيف الدواء في كمية قليلة من الماء. ويجب تحضير محلول جديد من الدواء يوميًا بكمية محسوبة للاستهلاك اليومي.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

3 سنوات.

بعد فتح القارورة، يجب استخدام الدواء خلال 82 يومًا، بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية. مدة الصلاحية بعد التخفيف في ماء الشرب: 42 ساعة.

COLISTO 6M (كوليستو 6M)

مسحوق للاستخدام الفموي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



الوصف

مسحوق التدفق الحر المتجانس، يتراوح لونه بين الأبيض والأصفر.

المكونات

يحتوي 1 غرام من الدواء على المادة الفعالة كوليستين سولفات - UI 6 000 000. المواد المساعدة: ثاني أكسيد السيليكون، سوربيتول، سكروز، لكتوز أحادي

الهيدرات. الخصائص الدوائية

رمز تصنيف 70AQ CTA - tev - أدوية بيطرية مضادة للميكروبات تُستخدم لعلاج الالتهابات المعوية. 01AA70AQ - كوليستين - مضاد حيوي من مجموعة البوليميكسينات. يعمل هذا الدواء كمبيد للجراثيم ضد بكتيريا سلبية الغرام.

الاستخدام

علاج العجول (تحت عمر 3 أشهر) من أمراض الجهاز الهضمي الناتجة عن ميكروبات حساسة لكوليستين.

علاج الدواجن (دجاج التسمين، والدجاج البياض، والإوز، والديك الرومي، والبط) من أمراض الجهاز الهضمي التي تسببها كائنات دقيقة حساسة لكوليستين.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول (تحت عمر 3 أشهر)	مع العلف أو ماء الشرب أو الحليب 1-2 غرام من الدواء لكل 001 كغم	مرة واحدة يوميًا 7-3 أيام	للذبح للحوم - 3 أيام
الدواجن	علاج الدواجن (دجاج التسمين، والدجاج البياض، والإوز، والديك الرومي، والبط) من أمراض الجهاز الهضمي التي تسببها كائنات دقيقة حساسة لكوليستين.	7-3 أيام	للذبح للحوم - 3 أيام، للبيض - لا توجد

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في العبوة الأصلية من الشركة المصنعة بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية بعد التخفيف في ماء الشرب: 42 ساعة.

DOXAN-50 (دوكسان- 50)

مسحوق للاستخدام الفموي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



المكونات

يحتوي 1 غرام من الدواء على المادة الفعالة: دوكسيسايلكلين هيكلات - 500 ملغ. المواد المساعدة: سيليكات مدخنة، سكروز، حمض الستريك.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف CT A 10JQ - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى. 20AA10JQ - دوكسيسايلكلين.

إن دوكسيسايلكلين هو مضاد حيوي مضاد للبكتيريا ينتمي إلى مجموعة التتراسايلكلين.

الاستخدام

علاج العجول (تحت عمر 8 أسابيع) المصابة بتسمم الدم، وأمراض الجهاز التنفسي (الالتهاب القصبى الرئوي، والتهاب الغشاء الجنبي والرئة، والتهاب الأنف الضموري، وغيرها) والجهاز الهضمي (داء الإشريكية القولونية، وداء السالمونيلا) الناتجة عن الميكروبات الحساسة للدوكسيسايلكلين. علاج الدجاج (دجاج التسمين، صغار الدجاج المرباة لاستبدال الكبار) المصابة بداء الإشريكية القولونية، وداء السالمونيلا. وداء الكلاميديا، وتسمم الدم، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للدوكسيسايلكلين.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول	1 غرام من الدواء لكل 100 كغم من وزن الجسم (5 ملغ من دوكسيسايلكلين هيكلات لكل 1 كغم من الوزن)	مرتين يوميًا، مع ماء الشرب 5 أيام	للذبح للحم - 41 يومًا
الدواجن	عن طريق الفم مع ماء الشرب أو العلف بجرعة: 5 غرام من الدواء لكل 001 كغم من وزن الجسم (52 ملغ من دوكسيسايلكلين هيكلات لكل 1 كغم من الوزن) يوميًا، ما يعادل 001 غرام من الدواء لكل 500-1000 لتر من ماء الشرب	5 أيام	للذبح للحم - 7 يومًا

عن طريق الفم.

عند استخدام الدواء مع ماء الشرب، يتم تحضير المحلول بناءً على الكمية المطلوبة من ماء الشرب (وفقًا لمعايير شرب الماء لكل نوع وفئة عمرية من الحيوانات)، والجرعة، ووزن الحيوانات.

يجب تحضير محلول جديد من الدواء يوميًا. خلال فترة العلاج.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان بشرط تخزينه في العبوة الأصلية من الشركة المصنعة في مكان مظلم وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه مغلقًا بإحكام في مكان مظلم وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات، عند درجة الحرارة من +51 إلى +52 درجة مئوية. لا تجميد. بعد التخفيف في ماء الشرب: 42 ساعة.

PHARMADOX P (فارمادوكس P)

مسحوق للاستخدام الفموي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



الوصف

مسحوق التدفق الحر المتجانس، يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأصفر.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادتين الفعالتين:

دوكسيسايكلين هيكلات - 001 ملغ؛ تايلوزين تارترات - 001 ملغ.

المواد المساعدة: ثاني أكسيد السيليكون، سوربيتول، سكروز، لكتوز أحادي الهيدرات.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف Q10 CTA tev - أدوية بيطرية مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهازى. إن فارمادوكس هو دواء مركب يحتوي على دوكسيسايكلين وتايلوزين. إن دوكسيسايكلين هو مضاد حيوي مضاد للبكتيريا ينتمي إلى مجموعة التتراسيكلين. إن تايلوزين هو مضاد حيوي من مجموعة المكاروليدات، فعال ضد بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.

الاستخدام

العجول، والجدبان، والحملان تحت عمر 8 أسابيع: علاج الحيوانات التي تعاني من تسمم الدم، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي (الالتهاب الرئوي القصبي، والالتهاب الرئوي المتوطن، والتهاب الأنف المزمو، وغيرها)، وأمراض الجهاز الهضمي (داء الإشريكية القولونية، داء السالمونيلا) التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للدوكسيسايكلين والتايلوزين.

الدواجن (الكنايك، ودجاج التسمين، والديك الرومي، وصغار الدجاج المرباة لاستبدال الكبار): علاج الدواجن التي تعاني من داء الإشريكية القولونية، وداء السالمونيلا، وداء الكلاميديا، وتسمم الدم، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للدوكسيسايكلين والتايلوزين. الجرعات عن طريق الفم مع ماء الشرب.

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول والحملان والجدبان (تحت عمر 8 أسابيع)	1-2 غرام من الدواء لكل 01 كغم من وزن الجسم مع العلف أو ماء الشرب أو الحليب	مرة واحدة يوميًا لمدة 3-5 أيام	للذبح اللحوم - 41 يومًا
الدواجن	1 غرام لكل 01 كغم من وزن الجسم، أو 1 غرام لكل 1 لتر من الماء. حسب شدة المرض، يمكن زيادة الجرعة الأولى من الدواء بنسبة مرتين.	3-5 أيام خلال فترة العلاج، يجب أن تتلقى الطيور الماء المحتوي على الدواء فقط. يجب تحضير محلول جديد من الدواء يوميًا بكمية محسوبة للاستهلاك اليومي.	

حسب شدة المرض، يمكن زيادة الجرعة الأولى من الدواء مرتين. للوقاية: يُنصح بخفض الجرعة العلاجية إلى النصف لمدة 3-5 أيام. شروط التخزين في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

3 سنوات.

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا.

TIAM 45 (تيام 45)

مسحوق للاستخدام الفموي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



الوصف

مسحوق التدفق الحر المتجانس، يتراوح لونه بين الأبيض والأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 غرام من الدواء على المادة الفعالة: تيامولين هيدروجين فومارات - 054 ملغ. المواد المساعدة: ثاني أكسيد السيليكون، سوربيتول، سكروز، لكتوز أحادي

الهيئات. الخصائص الدوائية

إن تيامولين هو مضاد حيوي شبه اصطناعي من مجموعة البلوروموتيلين. إن الدواء فعال ضد بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.

الاستخدام

الدواجن (دجاج التسمين، صغار الدواجن، الدجاج البياض، الديك الرومي، وصغار الديك الرومي): الوقاية والعلاج من أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للتيامولين لدى الدواجن.

الجرعات

يتم إعطاء الدواء عن طريق الفم مع ماء الشرب أو العلف.

خلال فترة العلاج والوقاية، يجب أن يكون محلول الدواء المصدر الوحيد لمياه الشرب للدواجن.

الجدول رقم 1 علاج الدجاج

الفئة العمرية	الجرعة اليومية من الدواء لكل 1 كغم من وزن الجسم، غرام	خطة الاستخدام
للأغراض العلاجية والوقائية		
الكتاكيت	0,33-0,28	الأيام 1-3 من العمر
دجاج التسمين من الأسبوع 4-هـ من العمر	0,11-0,067	لمدة يوم أو يومين كل 3-4 أسابيع من العمر؛ حسب المؤشرات
القطيع الأم	0,056	مرة واحدة شهرياً لمدة 3 أيام متتالية؛ حسب المؤشرات
للأغراض العلاجية		
دجاج التسمين، وصغار الدجاج، والقطيع الأم	0,10-0,067	3-5 أيام
القطيع الأم	0,056 غرام	مرة واحدة شهرياً لمدة 3 أيام متتالية؛ حسب المؤشرات

الجدول رقم 3 علاج الديك الرومي

الفئة العمرية	الجرعة اليومية من الدواء لكل 1 كغم من وزن الجسم، غرام	خطة الاستخدام
للأغراض العلاجية والوقائية		
صغار الديك الرومي	0,16	الأيام 1-3 من العمر
صغار الديك الرومي من الأسبوع 4-هـ من العمر	0,11	لمدة 1-3 أيام كل 4-6 أسابيع من العمر؛ حسب المؤشرات
القطيع الأم	0,05	كل شهر لمدة 3-5 أيام متتالية؛ حسب المؤشرات
للأغراض العلاجية		



3-5 أيام	0,11-0,056	صغار الديك الرومي والقطيع الأم
----------	------------	--------------------------------

عند استخدام الدواء مع الماء، يجب تحضير المحلول العلاجي يوميًا، ويجب أن يكون المصدر الوحيد لمياه الشرب. يبقى المحلول العلاجي للدواء ثابتًا لمدة 42 ساعة.

لتحضير كمية أكبر من المحلول، يجب أولاً تحضير المحلول الأم، ثم تخفيفه إلى التركيز المستهدف. يجب تحضير محاليل جديدة من التيامولين يوميًا.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

3 سنوات.

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا.

FLOXY-SPRAY (رذاذ فلوكسي)

رذاذ للاستخدام الخارجي، محلول

في قوارير مع بخاخة، 200 مل



الوصف

سائل أزرق داكن.

المكونات

تحتوي 001 مل من الدواء على المادتين الفعالتين: فلورفينيكول - 5,2 غرام؛ البنفسجي البلوري - 3,0 غرام. المواد المساعدة: ميثيل بيروليدون، كحول إيثيلي، كحول أيزوبروبيل، بولي إيثيلين جليكول، ثنائي ميثيل السلفوكسيد.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف 60DQ CTA - tev - أدوية بيطرية مضادة للميكروبات للاستخدام في الأمراض الجلدية. 09AB10JQ فلورفينيكول

عند استخدامه خارجيًا، يعمل رذاذ-YXOLF موضعياً ولا يدخل في الدورة الدموية عملياً.

الاستخدام

الأبقار: علاج الحيوانات المصابة بالإصابات الجلدية (جروح، شقوق، خدوش)، الآفات المعدية في القرون والحوافر (كما في ذلك العدوى النخرية)، التهاب السرة، إصابات الحلمة، الداحس، التهاب الجلد بين الأصابع، القرحة الوريدية، الخراجات المفتوحة الناتجة عن الكائنات الدقيقة الحساسة للفلورفينيكول، بالإضافة إلى علاج جروح الجلد بعد التدخلات الجراحية.

الأغنام والماعز: علاج الحيوانات المصابة بالجروح ما بعد الإصابة أو الجراحة (كما في ذلك جروح الجلد الناتجة عن قص الصوف)، وآفات المعدية في القرون والحوافر (كما في ذلك تعفن الحافر والعدوى النخرية)، والداحس، والتهاب الجلد بين الأصابع، والقرح، والخراجات المفتوحة الناتجة عن الكائنات الدقيقة الحساسة للفلورفينيكول.

الخيول: علاج الحيوانات المصابة بالجروح ما بعد الإصابة أو الجراحة (كما في ذلك بعد الإخلاء)، وآفات الحوافر المعدية (كما في ذلك العدوى النخرية)، والداحس، والقرح، والكدمات، والخراجات المفتوحة الناتجة عن الكائنات الدقيقة الحساسة للفلورفينيكول.

الجرعات

قبل استخدام الدواء، يتم تنظيف المنطقة المصابة جيداً من الأجسام الغريبة والإفرازات والأنسجة الميتة. يجب الإمساك بالقارورة التي تم رجهها مسبقاً على بُعد 5-01 سم من سطح الجلد المصاب، والضغط على البخاخة مرةً أو مرتين ومعالجة سطح الجسم بمساحة 5×5 سم. يجب استخدام الدواء كل 21 ساعةً، تعتمد مدة العلاج على شدة الإصابة وسرعة الشفاء، ولكن لا ينبغي أن تتجاوز 01 أيام.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجةً مئويةً.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

KETAFUR (كيتافور)

مستحضر معلق للحقن

قوارير سعة 100 مل

الجديد



الوصف

مستحضر معلق للحقن لونه من الأبيض إلى الأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المواد الفعالة:

سيفتيفور هيدروكلوريد - 05 ملغ؛ كيتوروفين - 051 ملغ.

المواد المساعدة: كحول بنزيلي، بوتيل هيدروكسي أنيسول، بوتيل هيدروكسي تولوين، بروبيلين جليكول ديكابريلات / ديكابرات، سوربيتان أوليات (08 NAPS).

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف Q10 CTA tev - أدوية بطيئة مضادة للبكتيريا للاستخدام الجهاز. Q10DD99 - سيفتيفور، وتركيباته.

إن سيفتيفور هو مضاد حيوي ينتمي إلى فئة السيفالوسبورينات من الجيل الثالث. وهو مضاد حيوي واسع الطيف. إن كيتوروفين هو مشتق من حمض البروبيونيك

من مجموعة الأحماض الكربوكسيلية، وله تأثيرات مسكنة وخافضة للحرارة. يؤثر كيتوروفين على الجهاز العصبي المركزي من خلال تثبيط إدراك الألم. يُمتص بسرعة

بعد الحقن العضلي. يرتبط أكثر من 89% من كيتوروفين ببروتينات بلازما الدم ويتركز في الأنسجة الملتهبة. يصل إلى أقصى تركيز له في بلازما الدم خلال أربع ساعات من استخدامه. يبلغ عمر نصفه حوالي أربع ساعات.

الاستخدام

يُستخدم كيتافور لعلاج الماشية المصابة بالعدوى النخرية والتهاب بطانة الرحم، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي المصحوبة بالحمى والألم التي تسببها الكائنات

الدقيقة الحساسة للسيفتيفور.

الجرعات

بالحقن العضلي مرة واحدة يوميًا

التنوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	1 مل لكل 50 كغم من وزن الحيوان (1 ملغ من سيفتيفور و3 ملغ من كيتوروفين لكل 1 كغم من وزن الحيوان)	3-5 أيام عند أمراض الجهاز التنفسي، - 3 أيام عند العدوى النخرية، 5 أيام عند التهاب بطانة الرحم	للذبح للحوم - 8 أيام للحليب - 0 أيام

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

42 شهرًا. يجب استخدام الدواء خلال 82 يومًا بعد فتح القارورة وأول استخدام له، بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

KETOPRO-100 (كيتوبرو- 100)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين عديم اللون والأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

كيتوبروفين - 001 ملغ.

المواد المساعدة: كحول بنزيلي، إل-أرجينين، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف tev CTA A10MQ - أدوية بيطرية لاستيرويدية مضادة للالتهابات ومضادة للروماتزم. 30EA10MQ - كيتوبروفين.

إن كيتوبرو-001 هو مضاد الالتهابات اللاستيرويدي ذو خصائص مسكنة وخافضة للحرارة. بالجرعات الموصى بها، لا يسبب الدواء أي تهيج موضعي، أو حساسية، أو طفرة، أو سرطان، أو سمية جنينية، أو تشوه.

الاستخدام

الأبقار: يُستخدم هذا الدواء لعلاج الحيوانات التي تعاني من التهابات في الجهاز العضلي الهيكلي (العرج، الوذمة الناتجة عن الإصابة، التهاب المفاصل، الفصال العظمي، وغيرها)؛ ولعلاج الالتهابات الناتجة عن أمراض الجهاز التنفسي، ووذمة الغدد الثديية، والتهاب الضرع الحاد.

الخيول: لتخفيف التهاب الألم في أمراض الجهاز العضلي الهيكلي الحادة والمزمنة، وخاصةً: العرج الناتج عن الإصابة، التهاب المفاصل، والفصال العظمي، وإصابات المفاصل (التواء الأربطة، التهاب الغشاء الزليلي)، والكسور، والتهاب الوتر، وإصابات الحوافر (التهاب الجلد، العرج)، والالتهابات بعد الجراحة. علاج أعراض المغص.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأبقار	بالحقن الوريدي مرة واحدة يوميًا بمعدل 3 مل من الدواء لكل 100 كغم من الوزن	مرة واحدة يوميًا لمدة 3 أيام	للذبح للحوم - يوم واحد للحليب - 0 يوم
الخيول	بالحقن الوريدي مرة واحدة يوميًا بمعدل 1 مل من الدواء لكل 45 كغم من وزن الجسم	مرة واحدة يوميًا لمدة 3-5 أيام	

الخيول: تكفي حقنة واحدة لعلاج أعراض المغص. في حال الحاجة إلى تكرار الإعطاء، يجب إعادة تقييم الحالة السريرية للحيوان.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

TERMONORM (تيرمونورم)

مسحوق للاستخدام القوي

أكياس من رقائق معدنية، 1 كغم



المكونات

يحتوي 1 غرام من المسحوق على المادة الفعالة:

حمض أسيتيل الساليسيليك - 007 ملغ؛

المواد المساعدة: كربونات الصوديوم اللامائية، سيليكا مدخنة.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف 10AB20NQ - tev CTA B20NQ - مسكنات الألم وخافضات الحرارة الأخرى. حمض أسيتيل الساليسيليك. إن حمض أسيتيل الساليسيليك هو مسكن ألم غير مخدر من مجموعة الساليسيلات. يتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنة للألم وخافضة للحرارة، ويمنع تراكم الصفائح الدموية، مما يظهر تأثيره المضاد للصفائح.

الاستخدام

يتم استخدام هذا الدواء في العجول لعلاج الحالات المرضية المصحوبة بارتفاع الحرارة، ومتلازمة التهاب الألم الخفيفة والمتوسطة الشدة ذات المنشأ المتنوع (بما في ذلك المنشأ الانتهابي)، بالإضافة إلى الحالات الحموية، وأمراض الجهاز التنفسي، ومتلازمة التهاب الرحم والتهاب الضرع وفشل الرضاعة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والفصال العظمي، والتهاب الحافر، وآلام العضلات والآلام ما بعد الجراحة، والإجهاد الحراري.

يتم استخدام هذا الدواء في الدواجن (دجاج التسمين، ودجاج التربية، وصغار الدجاج المرباة لاستبدال الكبار) لعلاج الحالات المرضية المصحوبة بارتفاع الحرارة، ومتلازمة التهاب الألم الخفيفة والمتوسطة الشدة ذات المنشأ المتنوع (بما في ذلك المنشأ الانتهابي)، بالإضافة إلى الحالات الحموية، وأمراض الجهاز التنفسي، ومتلازمة التهاب الرحم والتهاب الضرع وفشل الرضاعة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والفصال العظمي، والتهاب الحافر، وآلام العضلات والآلام ما بعد الجراحة، والإجهاد الحراري.

الجرعات

يجب خلط الكمية المطلوبة من الدواء مع ما لا يقل عن عشرة أضعاف حجم ماء الشرب مسبقًا، بدرجة حرارة لا تقل عن +53 درجة مئوية، ويتم تحريك المزيج جيدًا لمدة 02-03 دقيقة حتى يذوب تمامًا (يُصاحب الذوبان برغوة كثيفة). يُعطى المحلول الناتج للعجول بشكل فردي، مع تقسيم الجرعة اليومية إلى جرعتين. خلال فترة العلاج. عند استخدام الدواء مع ماء الشرب، يتم تحضير المحلول بناءً على الكمية المطلوبة من ماء الشرب (وفقًا لمعايير شرب الماء لكل نوع وفئة عمرية من الحيوانات)، والجرعة، ووزن الحيوانات. أما الدواجن، فيُضاف المحلول الناتج إلى الماء المخصص للشرب اليومي.

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول	1 غرام من الدواء لكل 7 كغم من وزن الحيوان (001 ملغ من حمض أسيتيل الساليسيليك لكل 1 كغم من وزن الجسم)، ما يعادل 5,1 كغم من الدواء لكل 0001 لتر من مياه الشرب	5-3 أيام	للذبح للحم - يوم واحد الحليب - ممنوع أثناء العلاج
الدواجن	1 غرام من الدواء لكل 7 كغم من وزن الطائر (001 ملغ من حمض أسيتيل الساليسيليك لكل 1 كغم من وزن الجسم)، ما يعادل 600-300 غرام من الدواء لكل 1000 لتر من مياه الشرب	5-3 أيام	يُحظر استهلاك بيض الدواجن المحضّل عليه وقت العلاج بحمض أسيتيل الساليسيليك. للذبح للحم - يوم واحد بعد آخر جرعة من الدواء.

يجب تحضير محلول جديد من الدواء يوميًا.

التحذيرات

يتم استخدام الدواء بالتزامن مع علاج مسببات المرض.

يُحظر استهلاك الحليب المحضّل عليه من الحيوانات وقت العلاج بحمض أسيتيل الساليسيليك.

يُمنع ذبح الحيوانات للحم إلا بعد يوم واحد من آخر جرعة من الدواء. يتم التخلص من اللحوم المحضّل عليها قبل الفترة المذكورة أو إطعامها للحيوانات غير المنتجة، وذلك بناءً على توصية الطبيب البيطري.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

مدة الصلاحية بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء هي 82 يومًا.

TOLTRASAN-50 (تولتراسان - 50)

محلول فموي

زجاجات سعة 1000 مل



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأصفر.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة تولترازوريل - 05 ملغ. المواد المساعدة: بروبيلين جليكول، كحول بنزيلي.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف A15PQ 15PQ - tev CTA - الأدوية البيطرية المضادة الأولي (A15PQ 10). تولترازوريل

يحتوي الدواء على المادة الفعالة تولترازوريل، وهي مشتقة من مجموعة تريازينتيرون، واسعة الطيف للإيمريات التالية: E. sedioneda airemi، E. sinemabala، E. igniolra، E. sivob، E. ittenurb، E. iaraveug، E. amixam، E. sitimigraelem، E. sitim، E. xirtacen، E. baracs، E. allenet، E. sius aropssol، E. iinreuz والأنواع الأخرى في جميع مراحل نموها داخل الخلايا.

لا يسبب الدواء أي طفرة أو سرطان أو تشوه.

الاستخدام

علاج ووقاية صغار الأبقار والأغنام والماعز من داء الأكريات الناتج عن الإيمريات الحساسة للتولترازوريل.

علاج ووقاية الدواجن (دجاج التسمين، ودجاج التربية، وصغار الدجاج المرباة لاستبدال الكبار، والقطيع الأم ودجاج التسمين، والدجاج الرومي المستأنس) من داء الأكريات الناتج عن الإيمريات الحساسة للتولترازوريل.

الجرعات

يتم إعطاء الدواء فمويًا بشكل فردي أو جماعي مع مياه الشرب بالجرعات التالية:

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
العجول	0,3 مل لكل 1 كغم من وزن الجسم	مرة واحدة	للذبح للحم - 63 يومًا
الحملان من عمر أسبوعين	0,4 مل لكل 1 كغم من وزن الجسم		للذبح للحم - 42 يومًا
الدواجن	يتم إعطاؤه فمويًا مع الماء بمعدل 0,5 مل لكل 1 لتر من ماء الشرب، ويُشرب خلال 48 ساعة؛ أو 1,5 مل لكل 1 لتر من ماء الشرب، ويجب أن تشربه الدواجن خلال 8 ساعات لمدة يومين	84 ساعة يجب أن تحصل الدواجن على الماء مع الدواء كمصدر وحيد لماء الشرب. في الحالات الشديدة من المرض، يتم إعادة دورة العلاج بعد 5 أيام عند الحاجة.	للذبح للحم - 14 يومًا

لتحقيق أقصى تأثير وقائي وتقليل إطلاق البيض الإيمري في البيئة الخارجية، يُستخدم الدواء في المزارع غير الآمنة من داء الأكريات، قبل ظهور أولى علامات المرض في القطيع.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 41 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية

CLOSI[®]VERON (كلوزيفيرون)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

سائل شفاف يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والبني الفاتح بدون جزيئات مرئية.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المواد الفعالة:

إيفيرمكتين - 8 ملغ؛ كلوزانتيل - 001 ملغ (على شكل كلوزانتيل ديهيدرات الصوديوم).

المواد المساعدة: بروبيلين جليكول، كحول إيثيلي، كحول بنزيلي.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف CTA 25PQ - tev - أدوية بيطرية مضادة للطفيليات (90GA25PQ كلوزانتيل؛ 10AA4SPQ إيفيرمكتين)

إن دواء كلوزيفيرون هو دواء مركب ذو طيف واسع من التأثير المضاد للطفيليات، يشمل الإيفيرمكتين والكلوزانثيل.

الاستخدام

علاج ووقاية الأبقار والأغنام والماعز من الأمراض الطفيلية التي تسببها الطفيليات الداخلية والخارجية.

الأبقار:

- الديدان الأسطوانية (في مرحلة البلوغ وفي أطوار اليرقات) - .pps aigartresO, .iecalp suhcnomeaH و .pps airepocS, و .mutaidar mumotsoghapseO, .T. sulyngnortsohcir, و .mumotobelh mumotsouB, .pps suridotameN, و .muroluliv araxoxT, و .pps siruhtcT, و .surapiviv suluaocyctiD, و .sullipap sediolynortS, و .pps aloicsaF, المقنوبات:
- يرقات الذباب - .mutaenil amredopyH, .sivob amredopyH:
- القارصة الجربية - .sivob setpocraS, .sivob setporosP:
- القمل الماص - .sunretsruce sunipotameaH, .alutiv suhtangoniL, و .sunretsruce sunipotameaH:

الأغنام والماعز:

- الديدان الأسطوانية (في مرحلة البلوغ وفي أطوار اليرقات) - .pps aigatretoS.O. و .pps suhcnomeaH.T. و .pps sulgnortsohcirT و .pps airepooC و .pps mumotsohagposeO و .pps suridotameN و .pps sulgnortsohcirT و .pps mumotsonuB و .pps aitrebahC و .anivo و .pps sulgnortsoatorP و .airalfi suluaocyotciD و .sulolipap sediolgnortS 'sivo siruhcirT :المقنوبات - .acitapeh aloicsaF
- يرقات الذباب - .sivo sisortseO
- القارمة الجربية - .sivo setporosP و .sivo setporcaS و .S. earpac:
- القمل الحماص - .sulivo suhtangoniL و .sladep .L و .earpac:
- لاجعة المواشي الغنمية - .sunivo sugahpoleM

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعة، مل / كغم من وزن الجسم، طريقة الإطعام	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأيقار	50/1 تحت الجلد	لعلاج داء الديدان الطفيلية وداء الحشرات: مرة واحدة؛ وعند الإصابة بالقراد: مرتين بفاصل 5-7 أيام	35 يومًا
الأغنام والماعز	1,0 مل لكل 33 كغم من وزن الجسم (0,2		

يجب ألا تتجاوز كمية الدواء التي يتم إعطاؤها في مكان الحقن الواحد 01 مل للأبقار و 5 مل للأغنام والماعز. يتم معالجة الحيوانات من الديدان الطفيلية وذباب enantamredopyH قبل الرعي في المراعي ووضعها في الحظائر.

قبل إجراء العلاجات الجماعية، يُختبر الدواء مسبقًا على عدد صغير من الحيوانات (7-8 حيوانات). في حال عدم حدوث أي مضاعفات خلال 2-3 أيام، يُستخدم الدواء لجميع الماشية.

التحذيرات

يُسمح بذبح الحيوانات للحصول للحوم: الأبقار والأغنام، بعد 53 يومًا من آخر جرعة من الدواء. في حالة الذبح القسري للحيوانات قبل الموعد المحدد، يتم استخدام اللحم لإطعام الحيوانات آكلة اللحوم.

قد يحدث ألم وتورم طفيفان في مكان الحقن، ويزولان بسرعة.

شروط التخزين

يُحفظ الدواء في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية. مدة الصلاحية: سنتان اثنتان. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 41 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 41 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.



الوصف

محلول شفاف للحقن، يتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأصفر.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

دورامكتين - 10,0 ملغ.

المواد المساعدة: كحول بنزيلي، إيثيل أوليات، بوتيل هيدروكسي أنيسول، زيت بذرة القطن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف ATC QP54 - أدوية مضادة للطفيليات الداخلية والخارجية، QPS4AA03 - دورامكتين.

دوران هو محلول معقم جاهز للاستخدام يحتوي على المادة الفعالة دورامكتين (10 ملغ / مل). إن دورامكتين هو مادة جديدة من مجموعة الأثيرمكتين، وتتمتع بتأثير جهاز واسع الطيف كمبيد الديدان الأسطوانية والمبيد الحشري ومبيد القراديات، ولها خصائص مبيد اليرقات والبيض.

الاستخدام

علاج والوقاية من أمراض الأبقار والأغنام التي تسببها الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية:

الأبقار:

- الديدان الأسطوانية المعدية والمعوية (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور ال4): *Ostertagia ostertagi* (في ذلك طور اليرقات المشط)، *O. lyrata*، *Haemonchus placei*، *Trichostrongylus axei*، *Trichostrongylus colubriformis*، *T. colubriformis*، *Cooperia oncophora*، *C. punctata*، *C. pectinata*، و *Oesophagostomum radiatum*، *Trichuris spp* (*) (في مرحلة البلوغ)؛
- الديدان الطفيلية التي تصيب الرئة (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور ال4): *Dictyocaulus viviparus*؛
- الديدان الطفيلية التي تصيب العين (في مرحلة البلوغ): *Thelazia spp.*؛
- يرقات ذباب *Hypodermatidae* (الأطوار الطفيلية): *H. lineatus*، *H. lineatus*، *Solenopotes capillatus*، و *Linognathus vituli*؛
- القمل الماص: *Haematopinus eurysternus*، و *Sarcoptes scabiei*، *Psoroptes bovis*؛
- القارمة الجربية: *Psoroptes bovis*، *Sarcoptes scabiei*، و *Nematodirus helvetianus*؛
- القارمة الجربية: *Chorioptes bovis*؛
- يُستخدم أيضًا لعلاج والوقاية من الأمراض التي تسببها الديدان المعدية والمعوية *Nematodirus helvetianus*، والقارمة الجربية *Chorioptes bovis*؛
- يمنع الدواء إعادة إصابة الأبقار بما يلي:

28 يومًا	<i>Trichostrongylus</i>	35 يومًا	<i>Ostertagia ostertagi</i>
28 يومًا	<i>Linognathus vituli</i>	21 يومًا	<i>Cooperia oncophora</i>
42 يومًا	<i>Psoroptes bovis</i>	35 يومًا	<i>Dictyocaulus viviparus</i>
28 يومًا	<i>Haemonchus placei</i>	22 يومًا	<i>Bunostomum phlebotomum</i>
		21 يومًا	<i>Oesophagostomum radiatum</i>

لزيادة الفعالية، يُنصح بمعالجة الماشية التجارية بدواء DORAN (دوران) عند نقلها إلى المراعي، ثم مرة أخرى بعد 8 أسابيع.

الأغنام:

الديدان الأسطوانية المعدية والمعوية (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور ال4):

- *Chabertia ovina* (في مرحلة البلوغ)، و *Cooperia curticei* (اليرقات في الطور ال4)، *C. oncophora*، *Gaigeria pachyscelis*، و *Haemonchus contortus* (اليرقات في الطور ال4)، و *Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*، و *Oesophagostomum columbianum*، و *Strongyloides papillosus*، و *Trichostrongylus axei*، و *Trichostrongylus colubriformis*، و *Trichostrongylus vitrinus*، و *Trichuris spp.* (في مرحلة البلوغ).

* فعال ضد اليرقات في الطور ال4، بما في ذلك تلك التي ليست حساسةً بطبيعتها لمشتقات البنزيميدازول. ¹ للحصول على علاج فعال ووقاية للحيوانات من *Nematodirus battus* (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور ال4)، يُوصى بجرعة 300 ميكروغرام / كغم من وزن الجسم.

القارمة الجربية: *Psoroptes bovis*؛ ديدان الرئة (في مرحلة البلوغ): *Dictyocaulus filaria*؛ ديدان الأنف: *Oestrus ovis*.



طريقة الإعطاء والجرعات

الحد الأقصى لحجم الحقن لكل نوع:

- الأبقار: 5 مل لكل مكان حقن؛
- الأغنام: 1,5 مل لكل مكان حقن؛

موانع الاستخدام

فرط الحساسية لمكونات الدواء.

لا تستخدمه للإناث أثناء الرضاعة، إذا كان الحليب يستخدم للاستهلاك البشري!

لا تستخدم الدواء في الأبقار والعجول الحوامل قبل 60 يومًا من الولادة!

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم، بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة حرارة تتراوح من 15 درجة إلى 30 درجة مئوية.

لا تضعه في الثلاجة!

مدة الصلاحية

24 شهرًا.

بعد أخذ الجرعة الأولى، يجب استخدام الدواء خلال 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم وجاف عند درجة الحرارة من +15 إلى +30 درجة مئوية.



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين عديم اللون والأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة: إيفرمكتين - 10,0 ملغ.
المواد المساعدة: كحول إيثيلي، كحول بنزيلي، بولي فينيل بيروليدون، بولي إيثيلين جليكول، جلسرين.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف ATC vet QP54 - أدوية مضادة للطفيليات الداخلية والخارجية، QP54AA - أفيرمكتين، QP54AA01 ATC vet - إيفرمكتين، ينتمي إلى مجموعة مركبات الأفيرمكتين التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة من مجموعة *Streptomyces avermitilis*. يتمتع إيفرمكتين بكفاءة عالية وطيف واسع من التأثيرات (كالمبيد للحشري، ومبيد القارديات، ومبيد الديدان الأسطوانية) وسمية منخفضة نسبياً. ليس إيفرمكتين فعالاً ضد الملقوبات والديدان الشريطية، لأن حمض غاما أمينوبيوتيريك لا يعمل كناقل عصبي محيطي فيها.

الاستخدام

علاج والوقاية من الأمراض التي تسببها:

الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Nematodirus helvetianus*، و *Ostertagia ostertagi* (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور الـ4)، و *O. lyrata*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *B. phlebotomum*، و *B. punctata*، و *C. punctata*، و *C. punctata*، و *C. punctata*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Haemonchus placei* (في ذلك اليرقات في الطور الـ3)، و *Trichostrongylus axei*، و *T. axei*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Dictyocaulus viviparus* (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور الـ4)؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Hypoderma bovis* (في الطور الـ1 والـ2)، و *H. lineatum*، و *H. lineatum*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Demodex bovis*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Linognathus vituli*، و *Haematopinus eurysternus*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Haemonchus contortus* (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور الـ3 والـ4)، و *Ostertagia circumcincta* (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور الـ3 والـ4)، و *Ostertagia trifurcata* (في مرحلة البلوغ واليرقات في الطور الـ4)، و *Trichostrongylus spp.*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Protostrongylus rufescens* (في مرحلة البلوغ)؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Oestrus var. communis*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Psoroptes var. communis ovis*، و *Sarcoptes scabiei*؛
الأنثاق: بالديدان الأسطوانية المعدية والمعوية: *Psoroptes var. communis ovis*، و *Sarcoptes scabiei*؛

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
الأنثاق	0,2 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم (0,2 ملغ / كغم من الإيفرمكتين)	تحت الجلد في منطقة لوح الكتف مرة واحدة، إذا تجاوزت الجرعة 10 مل، تُعطى في عدة أماكن	لذبح اللحوم - 28 يوماً
الأغنام		تحت الجلد في منطقة لوح الكتف مرة واحدة	

يُنصح بالعلاج المبكر للإصابة بذباب *Hypodermatinae* في الأنثاق (شهرًا أكتوبر ونوفمبر) بجرعة 0,2 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم. عند علاج الحيوانات المصابة بالجرب، وداء الدويدات، والمرض المسبب بقرادة *Chorioptes bovis*، يتم إعادة إعطاء الدواء بعد 7-10 أيام بنفس الجرعات.

التحذيرات

الاستخدام أثناء الحمل والرضاعة: يُمنع استخدام هذا الدواء للإناث قبل أسبوعين من الولادة وخلال أسبوعين بعدها، وكذلك خلال فترة رضاعة الحيوانات التي يُخصص حليبها للاستهلاك البشري.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

KETOSEPT CHLORINE (كيتوسبت كلورين)

عامل للمعالجة الصحية للزرع بعد الحلب

في جراكن من مواد بوليمرية سعة 10 لتر



المكونات

يحتوي 1 جرام من المنتج على المادة الفعالة:
ديجلوكونات الكلورهيكسيدين — 5,0 ملغ.
المواد المساعدة.

الخصائص الدوائية

للمستحضر تأثير مطهر، حيث يظهر جلد الحلمات بفعالية. يمنع الغشاء الواقي الذي يتكون بعد المعاملة من اختراق مسببات الأمراض إلى قناة الحلمة بين عمليات الحلب. يُظهر المنتج أقصى تأثير ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. يخترق ديجلوكونات الكلورهيكسيدين الأغشية داخل الخلوية للخلايا البكتيرية. يستقر على السيتوبلازم ويغير وظيفة الغشاء، مما يثبط استهلاك الأكسجين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى ثلاثي فوسفات الأدينوسين (ATP) وموت الخلية. كما يُلحق الكلورهيكسيدين الضرر بآلية تخليق الحمض النووي (DNA) للكائنات الدقيقة. لديجلوكونات الكلورهيكسيدين تأثير واسع الطيف على البكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجرام، بما في ذلك الكائنات الحية الدقيقة المسببة لالتهاب الضرع (المكورات العنقودية الذهبية، الزائفة الزنجارية، المتغلبة الشائعة، المكورات المعوية البرازية، الإشريكية القولونية، المكورات العقدية اللاإلينية، المكورات العقدية الشاذة، المكورات العقدية الضرعية، الوددية البقريّة، المقيحة (الجرثومة القوسية) الحقيقية، والطحالب الدقيقة، والفيروسات، والفطريات أيضًا). يوفر الدواء نشاطاً مضاداً للميكروبات طويل الأمد ومستمرًا يمنع نمو مسببات الأمراض لمدة 6 ساعات على الأقل بعد استخدام المنتج. في وجود المواد العضوية، لا ينخفض النشاط المضاد للميكروبات للمستحضر. لا يخترق ديجلوكونات الكلورهيكسيدين الجلد.

الاستخدام

يُستخدم كيتوسبت كلورين للمعالجة المطهرة لحلمات الضرع بعد الحلب في الأبقار والماعز والأغنام للوقاية من التهاب الضرع.

طرق الاستخدام والجرعات

بعد الحلب، تُعامل الحلمات محللول جاهز للاستخدام عن طريق غمس كل حلمة بمقدار 3/2 في وعاء خاص بما بعد الحلب يحتوي على المنتج. يجب غسل الغشاء الواقي المتكون بعد المعاملة قبل عملية الحلب التالية.

مدة الصلاحية

24 شهرًا.

بعد الفتح الأول للعبوات - 6 أشهر، إذا تم تخزينها في عبوة محكمة الإغلاق من الشركة المصنعة.

شروط التخزين

يُحفظ في مكان جاف بعيدًا عن متناول الأطفال عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و 25 درجة مئوية. تجنب أشعة الشمس المباشرة. لا تجمد المنتج! يُحفظ المنتج في عبوته الأصلية فقط.

KETOSEPT IODINE (كيتوسبت أيودين)

عامل لعلاج الضرع بعد الحلب

في جراكن من مواد بوليميرية سعة 10 لتر



المكونات

يحتوي 1 جرام من المنتج على المادة الفعالة:

بوفيدون اليود (يما يعادل اليود النشط) — 5 ملغ.
المواد المساعدة.

الخصائص الدوائية

للمستحضر تأثير مطهر، حيث يظهر جلد الحلقات بفعالية، يمنع الغشاء الواقي الذي يتكون بعد المعاملة من اختراق مسببات الأمراض إلى قناة الحلمة بين عمليات الحلب. يُظهر المنتج أقصى تأثير ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. يرجع التأثير المطهر للمنتج إلى قدرة اليود النشط على أكسدة التراكيب داخل الخلوية وأغشية الخلايا الميكروبية، ومجموعات السلفهيدريل الحرة في الإنزيمات والبروتينات الأخرى للكائنات الحية الدقيقة. للمستحضر تأثير واسع الطيف وهو فعال ضد البكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجرام، بما في ذلك الكائنات الحية الدقيقة المسببة لالتهاب الضرع (المكورات العنقودية الذهبية، المكورات المعوية البرازية، المتغلبة الشائعة، الإشريكية القولونية، المكورات العقدية اللاينية، المكورات العقدية الشاذة، المكورات العقدية الضرعية)، و ضد الفطريات، والأوليات، والفيروسات أيضًا. يحدث إطلاق اليود من مركب البولي فينيل بيروليدون ببطء وبشكل متساو عند ملامسة الجلد. وهو مادة منخفضة السمية للحيوانات والبشر، واستخدامها بانتظام يسمح بتحقيق تحسن ملحوظ في الحالة العامة للضرع.

الاستخدام

يُستخدم كيتوسبت أيودين للمعاملة المطهرة لحلمات الضرع بعد الحلب في الأبقار والماعز والأغنام للوقاية من التهاب الضرع.

طرق الاستخدام والجرعات

بعد الحلب، تُعامل الحلقات محلول جاهز للاستخدام عن طريق غمس كل حلمة بمقدار 3/2 في وعاء خاص بما بعد الحلب يحتوي على المنتج. يجب غسل الغشاء الواقي المتكون بعد المعاملة قبل عملية الحلب التالية.

مدة الصلاحية

24 شهرًا.

24 شهرًا. بعد الفتح الأول للجراكن - 6 أشهر، إذا تم تخزينها في عبوة محكمة الإغلاق من الشركة المصنعة.

شروط التخزين

يُحفظ في مكان جاف بعيداً عن متناول الأطفال عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و 25 درجة مئوية.

تجنب أشعة الشمس المباشرة. لا تجمد المنتج! يُحفظ المنتج في عبوته الأصلية فقط.

FROST (فروست)

مضاد التجمد للمطهرات

في جراكن من مواد بوليمرية سعة 1، 10 لتر



تركيبية المنتج، ومحتوى المواد الفعالة والمساعدة، %:

المواد الفعالة: خليط من الكحولات (كحول أيزوبروبيل، كحول إيثيلي مغزّل) لا يقل عن 87%؛
المواد المساعدة: صبغة.

الغرض من المنتج

هذا المنتج مصمّم لتضخيم محاليل التركيز المستهدف من منتجي VIROSAN MAX (فيروسان ماكس) و / أو VIROSAN (فيروسان) بنسبة 1:30 للتطهير في درجات حرارة منخفضة (تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر). الخصائص الاستهلاكية
يشكل المنتج، بعد إضافته إلى المحاليل المائية من المطهرات بالتركيز المستهدف، خليطاً مستقرّاً (محاليل التركيز المستهدف) لا يتجمد في درجات حرارة تحت الصفر (حتى 20 درجة مئوية تحت الصفر).
يوفر المنتج تطهيراً عالي الجودة في درجات الحرارة المحيطة المنخفضة.

طرق استخدام المنتج

ينبغي تحضير محاليل التركيز المستهدف في أماكن جيدة التهوية أو في الهواء الطلق. يجب إغلاق العبوات لتضخيم محاليل التركيز المستهدف بأغطية محكمة الغلق.

من الألاع استخدام ماء الصنبور بدرجة حرارة الغرفة لتضخيم محاليل التركيز المستهدف، وكذلك للشطف.
يجب تحضير محاليل التركيز المستهدف، بناءً على نوع التطهير المُخطّط له (التطهير الوقائي، أو القسري، أو القسري أثناء تفشي مرض خطير بشكل خاص)، ووفقاً للحسابات الواردة في الجدول رقم 1.
الجدول رقم 1 تحضير محاليل التطهير بالتركيز المستهدف

كمية المكونات لتضخيم محلول التركيز المستهدف					تركيز (%) المحلول حسب المنتج
ماء الصنبور	مضاد التجمد، كمية للاستخدام في درجات حرارة مختلفة، لتر	حتى -5 درجة مئوية	حتى -10 درجة مئوية	حتى -15 درجة مئوية	
حتى 100 لتر	50,0	40,0	30,0	20,0	0,5
					1,0
					2,0

يتم التطهير وفقاً لتوصيات النشرة الداخلية للمطهرين VIROSAN MAX (فيروسان ماكس) أو VIROSAN (فيروسان).

التأثير على السطح

تُستخدم محاليل التركيز المستهدف لتطهير الأسطح الداخلية والخارجية الخاضعة للمعالجة.
لا يسبب المنتج أي ضرر للأسطح عند استخدامه وفقاً للتعليمات.
لا تتفاعل محاليل التركيز المستهدف مع الطلاءات ولا تترك آثاراً عليها.

شروط التخزين

يُحفظ في مكان مغطى وجيد التهوية يوفر حمايةً من أشعة الشمس المباشرة، على بُعد مترين على الأقل من أجهزة التدفئة عند درجة حرارة لا تتجاوز 25+ درجة مئوية، وبمعزل عن المواد الأخرى والمنتجات الغذائية، وفي أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.

مدة صلاحية المنتج

3 سنوات من تاريخ الصنع، بشرط تخزينه في عبوة مغلقة من الشركة المصنعة. مدة صلاحية محاليل التركيز المستهدف من المنتج عند درجة الحرارة من 0 إلى 25+ درجة مئوية هي 72 ساعة.
يجب استخدام محاليل التركيز المستهدف من المنتج عند درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية خلال فترة لا تزيد عن 12 ساعة.



الوصف

سائل أخضر شفاف ذو رائحة مميزة.

المكونات

تحتوي كل 001 مل من المنتج على المواد الفعالة:

كلوريد البنزالكونيوم - 0,02 غرام؛ غلوتارلديهايد - 0,01 غرام.

المواد المساعدة: كبريتات النحاس، كبريتات الألومنيوم، بولي فينيل بيروليدون، تريكلون ب، بولييدوكانول، بولي إيثيلين جليكول، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

إن بيديسان هو دواء مركب لتطهير الحافر، وله تأثير مطهر. إن كلوريد البنزالكونيوم والغلوتارلديهايد لهما تأثير مبيد للجراثيم والفطريات والفيروسات. المكونات الخاصة التي يتكون منها بيديسان (مجمعات من الأملاح، ومواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية، ومركبات بوليمرية) تقوّي الحافر، وتمنع تشققه، وتغطي سطحه، وتسدّ العيوب، وتمنع تكوّن المسامية؛ ولها تأثير قابض ومقشّر ومضاد للالتهابات، وتحتفظ بشفاء الجلد المصاب للأنسجة الرخوة والفراغ بين الأصابع.

الاستخدام

يُستخدم هذا الدواء لعلاج الحيوانات المصابة بأمراض الحوافر، وللوقاية من العدوى الخرية وتعفن الحافر وعلاجهما.

الجرعات

يتم استخدام المنتج عن طريق الاستحمام بغمر الحوافر في محاليل الدواء بالتركيز المستهدف أو عن طريق الري. يتم تحضير المحاليل للدواء في عبوات مُعلّمة مصنوعة من أي مادة، وذلك بتخفيف المنتج بالماء بدرجة حرارة الغرفة.

للوقاية من أمراض الحوافر، يُستخدم محاليل الدواء بتركيز 5,2-5% لمدة 7 أيام مرة واحدة شهريًا.

حسب عدد الأبقار، يتم ملء الحمامات وفقًا للجدول رقم 1. الجدول رقم 1

عدد الحيوانات في المزرعة	تركيز محلول، %	الاستخدام
حتى 50 بقرة	2,5	يجب استبدال المحلول كل يومين.
002-05 بقرة	5	يجب استبدال المحلول كل يومين.
0001-002 بقرة	5	يجب استبدال المحلول يوميًا.

بالنسبة للحيوانات التي تعاني من إصابات طفيفة في الأطراف (عند إزالة المناطق المصابة، وقطع الأنسجة الميتة)، يُستخدم محلول الدواء بتركيز 01% عن طريق الري مرتين بفواصل 42 ساعة. ثم يتم الانتقال إلى معالجة الأطراف بمحلول الدواء بتركيز 5% عن طريق الغمر. تتم المعالجة كل يومين، ثلاث مرات على الأقل. في حالة التدخلات الجراحية العميقة مع استئصال الأنسجة المصابة، يُوضع الدواء بضمادات مبللة بالمحلول بتركيز 01%. تُوضع الضمادات كل يومين، ثلاث مرات على الأقل. ثم يتم الانتقال إلى معالجة الأطراف بمحلول الدواء بتركيز 5% عن طريق الغمر.

التحذيرات

لا توجد

التخزين

يُحفظ في عبوة الإنتاج عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية في مستودعات جافة ومظلمة وجيدة التهوية. لا تجميد

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

VIROCLEAN-800 (فيروكلين-800)

منتج منظف تقني قلوي

في جراكن من مواد بوليمرية سعة 10 لتر



المكونات

المكون الفعال الرئيسي للمنتج هو ألكيل بنزين سولفونات الصوديوم 61٪، والمواد المساعدة (مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية، عوامل مرغبة، وماء بنسبة تصل إلى 39٪).

الخصائص الاستهلاكية

في تركيزات محلول التركيز المستهدف التي تزيد عن 2٪، يقضي المنتج على البكتيريا والفطريات ويمنع نموها؛ ويتميز برغوة جيدة وقدرة تنظيف عالية؛ عند استخدامه مع معدات توليد الرغوة، يشكل رغوة ثابتة ومستقرة تدوم طويلاً على الأسطح العمودية، مما يضمن تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها؛ لا يلحق الضرر بأسطح المنتجات المعالجة؛ يذوب جيداً في الماء؛ يعمل بفعالية في الماء مهما كانت درجة صلابته.

الغرض

يُستخدم المنتج في مؤسسات صناعة الأغذية والتجهيز، والقطاع الزراعي الصناعي، وفي النقل. أماكن الإنتاج: المعدات الغذائية والتكنولوجية؛ الأوعية؛ الأحزمة الناقلة؛ الحاويات؛ المخزون؛ الأدوات؛ طاولات العمل. غسل الأواني والخزانات والمعدات في منشآت الصناعات الغذائية وغير الغذائية، ومنشآت المجمعات الزراعية الصناعية باستخدام محطات الغسيل الآلية (في أنظمة الغسيل الآلية).

الاستخدام

يُستخدم ماء الصنبور لتحضير محاليل التركيز المستهدف وللشطف. يجب تحضير المحاليل وفقاً للحسابات الواردة في الجدول، ومدة صلاحية المحاليل المحضرة هي 5 أيام.

كمية المنتج والماء اللازمة لتحضير 1 لتر من محلول التركيز المستهدف، مل	المنتج	الماء	تركيز المحلول، %
099	01		1
589	51		5,1
089	02		2
079	03		3
059	50		5

يمكن استخدام المنتج بوضع محاليل التركيز المستهدف على أسطح الأشياء المعالجة، أو غمر أجزاء المعدات في محاليل المنتج وغسلها بالفرشاة والإسفنجة، مع مراعاة قواعد السلامة عند العمل بالمواد الكاوية. بعد معالجة الأسطح، يتم شطفها بالماء الجاري لإزالة بقايا المنظف. تُشطف الأسطح الخارجية لمدة 3-5 دقائق. تُشطف الأسطح الداخلية لمدة 01-5 دقائق. يتم التحقق من وجود أو عدم وجود مادة قلوية متبقية على الجهاز باستخدام ورق مؤشر الأس الهيدروجيني في النطاق من 0 درجة مئوية إلى +21 درجة مئوية أو في مياه الغسيل باستخدام مقياس الأس الهيدروجيني. للقيام بذلك، بعد الشطف مباشرة، يتم وضع شريط من ورق المؤشر على السطح المبلل والضغط عليه بقوة. يشير اللون الأخضر المزرق لورق المؤشر إلى وجود بقايا مواد قلوية على سطح الجهاز. إذا لم يتغير مظهر الورق، فلا توجد أي بقايا مواد قلوية.

الاحتياطات عند العمل مع المنتج

عند العمل مع المنتج، من الضروري اتباع قواعد السلامة، بالإضافة إلى التعليمات القياسية.

من اللازم تجنب ملامسة السائل للجلد أو العينين عند استخدام المنتج.

يجب تنفيذ جميع الأعمال بملابس عمل مع قفازات مطاطية لحماية اليدين، ونظارات واقية للعينين.

عند الرش (الري)، من الضروري استخدام معدات الوقاية التالية:

للجهاز التنفسي - أجهزة تنفس عادية أو أقنعة غاز صناعية؛ للعينين - نظارات واقية محكمة الغلق؛

للجسم - ملابس عمل؛ للقديمين - أحذية مطاطية؛

للجلد البدين - قفازات مطاطية.

يُحفظ المنتج بمعزل عن الطعام في عبوة محكمة الغلق من الشركة المصنعة في غرفة مغلقة.

مدة وشروط التخزين

يُحفظ المنتج في مكان مغلق وجيد التهوية يوفر حماية من أشعة الشمس المباشرة، على بُعد مترين على الأقل من أجهزة التدفئة عند درجة حرارة لا تقل عن 0 درجة مئوية ولا تتجاوز +52 درجة مئوية. يمكن تخزين المنتج في أماكن مفتوحة مزودة بمظلة تحجب أشعة الشمس المباشرة، وفي عبوات تخزين مزودة بمقياس الحرارة متساوي الحرارة الذي يضمن أن تكون درجة حرارة المنتج لا تقل عن 0 درجة مئوية ولا تزيد عن +52 درجة مئوية.

يتم تخزين المنتج على منصات خشبية في أكواب لا يزيد ارتفاعها عن 5,1 متر. يُحفظ بعيداً عن المواد الأخرى والمأكولات، في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.

مدة الصلاحية

21 شهراً من تاريخ الصنع، في عبوة غير مفتوحة من الشركة المصنعة.

VIROCLEAN-KPM (فيروكلين-KPM)

منتج منظف تقني حمضي

في جراتن من مواد بوليمرية سعة 10 لتر



المكونات

حمض الأرثوفوسفوريك لا يقل عن 20%، وحمض عضوي لا يقل عن 5%؛ المكونات الإضافية: مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية، مثبطات الترسبات الكلسية، مثبطات التآكل، عوامل مغلّية، ماء حتى 100.0%.

الخصائص الاستهلاكية

- المنتج فعال ضد الملوثات المعدنية: رواسب أكاسيد الحديد والكالسيوم والفوسفات، وأملاح عسر الماء، والحجر البولي، والصدأ؛
- فعال ضد الملوثات العضوية (البروتينية)؛
- يتمتع المنتج بقدرة تنظيف عالية مع تكوين رغوة؛
- يمنع تكون الترسبات الكلسية؛
- يحتوي على مثبطات للتآكل: لا يُتلف سطح الأدوات المراد معالجتها عند استخدامه وفقاً للتعليمات؛
- يذوب جيداً في الماء؛
- يقضي على غو البكتيريا والفطريات ومنعه؛
- يعمل بفعالية في الماء بأي درجة من الصلابة.

الغرض

VIROCLEAN-KPM هو منظف رغوي حمضي مركز للتنظيف من الملوثات المعدنية والعضوية. يُستخدم المنتج لغسل الأسطح المختلفة، مثل: الجدران، والأرضيات، والمعدات، والأدوات، والخزانات، والحاويات، والمعدات (في الصناعات الغذائية وغير الغذائية، في مباني القطاع الزراعي الصناعي)، وتنظيف الأحواض، وأحواض الاستحمام، والمراحض وغيرها من الأدوات الصحية، بالإضافة إلى الجدران والأرضيات المكسوة بالبلات، في منشآت خدمات الطعام العامة، ومرافق الرعاية الصحية، في وجود رواسب أكاسيد الحديد والكالسيوم والفوسفات، وأملاح عسر الماء، والحجر البولي، والصدأ.

VIROCLEAN-KPM هو عامل رغوة عالي، مخصص للتنظيف بالرغوة باستخدام أجهزة خاصة.

طريقة الاستخدام

تتم عملية إزالة الشحوم وإزالة طبقة الأكسيد باستخدام محلول تشغيل بتركيز يتراوح بين 5-20%. لإزالة الملوثات الثقيلة وال"القديمة" بشكل خاص، والترسبات الكلسية، والصدأ، ورواسب البيرة والحليب واللحوم، يجب استخدام محاليل مائية من المنتج بتركيز 20-90% أو المنتج غير مخفف. تتراوح درجة حرارة محلول التشغيل للمنتج أثناء الاستخدام من 5 إلى 90 درجة مئوية. تزداد الكفاءة مع زيادة درجة حرارة محلول التشغيل. مدة تعريض محاليل التشغيل هي 30-5 دقيقة.

مدة الصلاحية

12 شهراً من تاريخ الإنتاج، في عبوة محكمة الإغلاق من الشركة المصنعة.

شروط التخزين

يجب تخزين المنتج في غرف مغطاة جيدة التهوية، مع توفير حماية من أشعة الشمس المباشرة، على مسافة لا تقل عن 2 متر من أجهزة التدفئة عند درجة حرارة تتراوح بين 0 و 25 درجة مئوية. يُسمح بالتخزين في مناطق مفتوحة مجهزة بسقيفة تمنع وصول أشعة الشمس المباشرة، وفي خزانات تخزين مزودة بجهاز متساوي الحرارة ضمن درجة حرارة للمنتج تتراوح بين 0 و 25 درجة مئوية. يُخزن المنتج على منصات خشبية مكسدة بارتفاع لا يزيد عن 1,5 متر. يُخزن بشكل منفصل عن المواد الأخرى والمواد الغذائية، بعيداً عن متناول الأطفال.

في جراكن من مواد بوليمرية سعة 1، 10 لتر



سائل شفاف يتراوح لونه بين البني الفاتح والبني الداكن، ذو رائحة مميزة.

تحتوي كل 001 مل من المنتج على المواد الفعالة:

کلورید البنزاکونیوم - 52 غرام؛ غلوتارل دیهاید - 11 غرام.

المواد المساعدة: كحول أيزوبروبيل، زيت التربنتين، مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية، عطر، ماء.

إن فيرسوان هو مظهر مركب له تأثير مييد الجراثيم (suerua succocolyhpats, silaceaf succocopterts, asonigurea sanomoduetsP, .iloc.E, eainomuenn alleisbelK, .sivob muiretcabocysM, .silibarim suetorP, .senegotyconom airetsiL, .pps, amsalpocyM, وتأثير مييد للفظريات (pps, adidnaC, .pps, sulligrepsA, .pps, muirasuF, .pps, mullicineP, وتأثير مييد للفريسات (surivRoR, .suriv esaeid eltsacweN, .surivRoR, .surivRoR, .surivoxymohtrO, .surivoxP, .surivoxymaraP, .surivanoroC, .surivatoR, .surivitseP).

يُستخدم لغسل وتطهير منشآت تربية الماشية والدواجن، والحاضنات، ومحطات التلقيح الاصطناعي، والمركبات، والأسطح، والأشياء والمعدات الخاضعة للإشراف البيطري، ولملء بوابات التطهير.

يحتفظ المنتج بفصلته في الإضاءة الشديدة، وعند استخدام الماء العسر، وفي وجود بقايا مواد عضوية (مثل القمح والبول وبقايا الأعلاف، إلخ)، وهو فعال في نطاق واسع من درجات الحرارة: من 0 إلى +05 درجة مئوية. عند درجات الحرارة أقل من 0 درجة مئوية، يُصح إضافة مضاد التجمد (بروبيلين جليكول ومواد أخرى ذات جودة مماثلة، مما يسمح باستخدام فيروسان حتى في درجات حرارة تصل إلى 02 درجة مئوية تحت الصفر.

يُجرى التطهير بعد تنظيف ميكانيكي وصحي شامل لأسطح الأشياء المراد تطهيرها، يتم التطهير بالمسح، والري، والرش الضايف، وتوليد الرغوة. تُستخدم المحاليل المائية من المنتج للتطهير. يتم تحضير المحاليل للمنتج في عبوات معلّمة مصنوعة من أي مادة، وذلك بتخفيف المنتج بماء الصنبور. يتم تحديد كمية منتج فيروسان المطلوبة لتطهير محلول التركيز المستهدف وفقاً للحسابات الواردة في الجدول رقم 1.

الجدول رقم 1 تحضير محلول التركيز المستهدف من المنتج

الاستخدام عن طريق الرش.

للتطهير الوقائي، يجب استخدام المحلول المائي من المنتج بتركيز 1,0-52,0% بمعدل 1 لتر من محلول التركيز المستهدف لكل 4-21 مترًا مربعًا من المساحة.

مدة التعرض هي 03-51 دقيقة.

للتطهير القسري والنهائي عند الأمراض المعدية البكتيرية، يُستخدم المحلول المائي من المنتج بتركيز 0,5% بمعدل 1 لتر من محلول التركيز المستهدف لكل 4 أمتار مربعة من المساحة.

مدة التعرض هي 06 دقيقة.



للتطهير القسري والنهائي عند الأمراض الفيروسية، يُستخدم المحلول المائي من المنتج بتركيز 0,1-5,0% بمعدل 1 لتر من محلول التركيز المستهدف لكل 4 أمتار مربعة من المساحة.

مدة التعرض هي 06 دقيقة.

للتطهير الوقائي والقسري عند مرض السل في حيوانات المزرعة، يُستخدم المحلول المائي من المنتج بتركيز 2% مع التعرض لمدة 42 ساعة، والمحلول المائي من المنتج بتركيز 3-4% بمعدل 1 لتر من محلول التركيز المستهدف لكل 1 متر مربع من المساحة مع التعرض لمدة لا تقل عن 5 ساعات.

الاستخدام عن طريق توليد الرغوة.

للتطهير الوقائي، يُستخدم المحلول المائي بتركيز 2,0-5,0%، ولكن في هذه الحالة، تتشكل رغوة غير مستقرة تتدفق بسرعة من الجدران والسقف. |

للتطهير القسري، يُستخدم المحلول المائي من المنتج بتركيز 5,0% بمعدل 1 لتر من محلول التركيز المستهدف لكل 4-6 أمتار مربعة من المساحة، ومدة التعرض هي 3 ساعات.

لمعالجة المباني أو المعدات أو وسائل النقل بالرغوة، يلزم استخدام فوهة لتوليد الرغوة.

الاستخدام عن طريق الرش الضبابي.

للتطهير الوقائي أو القسري أو النهائي عن طريق الرش الضبابي (رش الهباء الجوي)، يُستخدم المحلول المائي من المنتج (تُضاف 57,0 لتر من فيروسان إلى 4 لترات من الماء لكل 0001 متر مكعب من حجم الغرفة).

للتطهير الوقائي أو القسري أو النهائي عن طريق الرش الضبابي (رش الهباء الجوي)، يُستخدم المحلول المائي من المنتج (تُضاف 57,0 لتر من فيروسان إلى 4 لترات من الماء لكل 0001 متر مكعب من حجم الغرفة).

يتم رش محلول التركيز المستهدف مع إيقاف التهوية، ومدة التعرض هي 3 ساعات. يمكن إجراء الرش الضبابي بالطريقتين الباردة أو الحارّة باستخدام مولدات الضباب. يتم غسل الأماكن التي قد تتراكم فيها بقايا المنتج والتي يمكن للحيوانات الوصول إليها (مثل المعالف والشاربات، إلخ) بالماء.

ملء بوابات التطهير، يُستخدم المحلول المائي من المنتج بتركيز 5,0%. يجب تجديد المحلول مرة واحدة في الأسبوع أو كلما جف.

شروط التخزين والنقل

يُحفظ في عبوة الإنتاج عند درجة الحرارة من +5 إلى +53 درجة مئوية في مستودعات جافة ومظلمة وجيدة التهوية. يُمنع تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

مدة الصلاحية

3 سنوات

VIROSAN MAX (فيروسان ماكس)

مطهر

في جراكن من مواد بوليمرية سعة 1، 10 لتر



الوصف

سائل شفاف يتراوح لونه بين عديم اللون والبني الداكن، ذو رائحة مميزة.

المكونات

تحتوي كل 1001 مل من المنتج على المواد الفعالة:

كلوريد البنزلكونيوم - 5,21 غرام؛ غلوتارلديهايد - 52 غرام.

المواد المساعدة: كحول أيزوبروبيل، مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية، ماء.

الخصائص الدوائية

إن فيروسان ماكس هو مطهر ومنظف مركب له تأثير مبيد للجراثيم (Suerua succocolyhpat) و (Silaceaf succocotpert) و (Asonigurea sanomodues) و (Eoloc) و (Eainomuennp alleisbel) و (Pps amslpocyM) و (Senegotyconom airetsil) و (Pps adidnaC) و (Pps sulligrepas) و (Pps muraisF) و (Pps mullicineP) وتأثير مبيد للفيرسات (Pps muus anacirfa sitseP) و (Pps surivoeR) و (Pps surivatoR) و (Pps surivanoroC) و (Pps surivoxymaraP) و (Pps surivoxoP) و (Pps surivoxymohrO) و (Pps surivitseP).

الاستخدام

يُستخدم منتج فيروسان ماكس لتطهير منشآت تربية الماشية والدواجن، والحاضنات، ومحطات التلقيح الاصطناعي، والمركبات، والأسطح، والأشياء والمعدات الخاضعة للإشراف البيطري، وللماء بوابات التطهير.

يحتفظ المنتج بفعاليته في الإضاءة الشديدة، وعند استخدام الماء العسر، وفي وجود بقايا مواد عضوية (مثل الشح والبول وبقايا الأعلاف، إلخ)، وهو فعال في نطاق واسع من درجات الحرارة: من 0 إلى +05 درجة مئوية. عند درجات الحرارة أقل من 0 درجة مئوية، يُنصح بإضافة مضاد التجمد (بروبيلين جليكول ومواد أخرى ذات جودة مماثلة)، مما يسمح باستخدام فيروسان ماكس حتى في درجات حرارة تصل إلى 02 درجة مئوية تحت الصفر.

الجرعات

يُجرى التطهير بعد تنظيف ميكانيكي وصحي شامل لأسطح الأشياء المراد تطهيرها. يتم التطهير بالمسح، والري، والرش الضبابي، وتوليد الرغوة. تُستخدم المحاليل المائية من المنتج للتطهير. يتم تحضير محاليل التركيز المستهدف المخصصة لتطهير مختلف الأشياء في عبوات بلاستيكية أو مطلية بالمينا (دون إتلاف المينا) بإضافة كميات مناسبة من المطهر إلى الماء (الجدول رقم 1).

الجدول رقم 1 تحضير محلول التركيز المستهدف من المنتج

كمية المكونات لتحضير محلول التركيز المستهدف، مل				تركيز المحلول حسب المنتج، %
10 لتر		1 لتر		
الماء	VIROSAN MAX (فيروسان ماكس)	الماء	VIROSAN MAX (فيروسان ماكس)	
9975	25	997,5	2,5	0,25
9950	05	599	5	0,5
9900	001	990	10	1,0

عن طريق الرش الضبابي (رش الهباء الجوي)، يُستخدم المحلول المائي من المنتج (يُضاف 1 لتر من المنتج إلى 4 لترات من الماء لكل 1000 متر مكعب من حجم الغرفة). يتم رش محلول التركيز المستهدف مع إيقاف التهوية، ومدة التعرض هي 3 ساعات. يمكن إجراء الرش الضبابي بالطريقتين الباردة أو الحارة باستخدام مولدات الضباب. التطهير بالهباء الجوي باستخدام المولد من طراز "AT-YD": يُستخدم المحلول المائي من المنتج (يُضاف 1 لتر من المنتج إلى 9 لترات من الماء لكل 1000 متر مكعب من حجم الغرفة).

يتم غسل الأماكن التي قد تتراكم فيها بقايا المنتج المطهر (مثل المعالف والشاربات، إلخ) بالماء. ليس من الضروري غسل بقايا الدواء من الأسطح الأخرى. يتم تطهير البيض والأوعية بمحلول 0,25-0,1% عن طريق الري أو الهباء الجوي. مدة التعرض هي 20 دقيقة.

VIROSAN MAX (فيروسان ماكس)

مطهر

في جراكن من مواد بوليميرية سعة 1، 10 لتر



نوع التطهير	حجم المعالجة	تركيز المحلول، %	استهلاك المحلول	مدة التعرض
التطهير الوقائي	الأشياء ذات السطح الأملس	0,25-0,1	0,1 لتر / متر مربع	لا تقل عن 30 دقيقة
	الأشياء ذات السطح الخشن		5,0-52,0 لتر / متر مربع	
	مركبات النقل البري (هما في ذلك العجلات)		0,5 لتر / متر مربع	
	ملء بوابات التطهير	0-0,25	الكمية المطلوبة	
التطهير القسري (الحالي والنهائي) عند الأمراض المعدية البكتيرية والأمراض المعدية الفيروسية	الأشياء ذات السطح الأملس والخشن	0,5-0,25	1,2-1 لتر لكل 4 أمتار مربعة من المساحة	لا تقل عن 60 دقيقة
	مركبات النقل البري (هما في ذلك العجلات)		0,5 لتر / متر مربع	
	ملء بوابات التطهير	0,5	الكمية المطلوبة	
التطهير القسري (الحالي والنهائي) في حالة تفشي مرض خطير بشكل خاص (هما في ذلك حمى الخنازير الأفريقية أو الكلاسيكية)	الأشياء ذات السطح الأملس والخشن	1,0-0,5	0,5-0,3 لتر / متر مربع	لا تقل عن 60 دقيقة
	مركبات النقل البري (هما في ذلك العجلات)		0,5 لتر / متر مربع	
	ملء بوابات التطهير	1,0%	الكمية المطلوبة	يتم إضافته كلما جف.

شروط التخزين

يُحفظ في عبوة الإنتاج عند درجة الحرارة من +5 إلى +53 درجة مئوية في مستودعات جافة ومظلمة وجيدة التهوية. يُمنع تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

مدة الصلاحية

3 سنوات.

VIROSAN F (فيروسان F)

حل التطهير

في جراكن من مواد بوليميرية سعة 10, 15 لتر



المكونات

تحتوي كل 100 مل من المنتج على المواد الفعالة:

كلوريد البنزالكونيوم - 5,0 غرام؛ غلوتارلديهايد - 10,0 غرام؛ فورمالديهايد - 14,8 غرام. المواد المساعدة: مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية، ماء.

الخصائص الدوائية

إن فيروسان F هو مطهر مركب له تأثير مبيد للجراثيم (*E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Proteus mirabilis*، و *Aspergillus spp*, *Salmonella spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*، وتأثير مبيد للفطريات (*Streptococcus faecalis*)، وتأثير مبيد للفيروسات (*Coronavirus*, *Rotavirus*, *Reovirus*, *Newcastle disease virus*, *Penicillium spp*، و *Fusarium spp*، و *Candida spp*, *Paramyxovirus*, *Orthomyxovirus*, *Poxvirus*, *Pestivirus*).

الاستخدام

يستخدم منتج فيروسان F لتطهير منشآت تربية الماشية والدواجن، والحاضنات، ومحطات التلقيح الاصطناعي، والمركبات، والأسطح، والأشياء والمعدات الخاضعة للإشراف البيطري، وملء بوابات التطهير. يحتفظ المنتج بفعاليته في الإضاءة الشديدة، وعند استخدام الماء العسر، وفي وجود بقايا مواد عضوية (مثل القيج والبول وبقايا الأعلاف، إلخ)، وهو فعال في نطاق واسع من درجات الحرارة: من 0 إلى +50 درجة مئوية. عند درجات الحرارة أقل من 0 درجة مئوية، يُصح بإضافة مضاد التجمد (بروبيلين جليكول ومواد أخرى ذات جودة مماثلة)، مما يسمح باستخدام فيروسان F حتى في درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

مسارات الاستخدام والجراعات

الجدول رقم 1 تحضير محلول التركيز المستهدف من المنتج وتوليد الرغوة.

كمية المكونات لتحضير محلول التركيز المستهدف، مل				تركيز المحلول حسب المنتج، %
10 لتر		1 لتر		
الماء	VIROSAN F (فيروسان F) 03	الماء	VIROSAN F (فيروسان F) 3	
0799		799		3,0
0599	05	599	5	5,0
0099	001	099	01	0,1

الجدول رقم 2 يتم التطهير بالمسح، والري (الرش)، وتوليد الرغوة.

نوع التطهير	حجم المعالجة	تركيز المحلول %	استهلاك المحلول	مدة التعرض
التطهير الوقائي عند الأمراض المعدية البكتيرية والفطرية والفيروسية	الأشياء ذات السطح الأملس والخشن	0,3	0,3-0,5 لتر / متر مربع	لا تقل عن 30 دقيقة
	مركبات النقل البري (بما في ذلك العلاجات)		0,5 لتر / متر مربع	
	ملء بوابات التطهير	0,5-0,3	الكمية المطلوبة	حواجز إعادة التعبئة أثناء جفافها
التطهير القسري (الحالي والنهائي) عند الأمراض المعدية البكتيرية والفطرية والفيروسية	الأشياء ذات الأسطح المساء والخشنة	1,0-0,5	0,3-0,5 لتر / متر مربع	لا تقل عن 2 ساعة
	مركبات النقل البري (بما في ذلك العلاجات)		0,5	
	ملء بوابات التطهير		الكمية المطلوبة	حواجز إعادة التعبئة أثناء جفافها

تستخدم المحاليل المائية من المنتج للتطهير.

يتم تحضير محاليل التركيز المستهدف لتطهير مختلف الأشياء في عبوات بلاستيكية أو مطلية بالمينا (دون إتلاف المينا) بإضافة كميات مناسبة من المطهر إلى الماء (الجدول رقم 1). للتطهير الوقائي أو القسري عند الأمراض المعدية البكتيرية والفيروسية عن طريق الرش الضبابي (الرش بالهباء الجوي)، يُستخدم المحلول المائي من المنتج (يُضاف 1 لتر من المنتج إلى 4 لترات من الماء لكل 1000 متر مكعب من حجم الغرفة). يتم رش محلول التركيز المستهدف مع إيقاف التهوية، ومدة التعرض هي 3 ساعات. يمكن إجراء الرش الضبابي بالطريقتين الباردة أو الحارة باستخدام مودلات الضباب.

شروط التخزين

يُحفظ في عبوة الإنتاج عند درجة الحرارة من +5 إلى +35 درجة مئوية في مستودعات مظلمة وجيدة التهوية. يُمنع تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

مدة الصلاحية

3 سنوات.

VIROSAN F2 (فيروسان F2)

محلول مطهر

في جراكن من مواد بوليميرية سعة 1 و 10 لتر



المكونات

يحتوي 100 مل من الدواء على مواد فعالة:

كلوريد بنزالكونيوم — 5,0 جم؛ جلوتارالدهيد — 5,0 غرام؛ فورمالدهيد — 18,5 جم؛ المواد المساعدة.

الخصائص الدوائية

VIROSAN F2 هو مطهر معقد له الإجراءات التالية: مبيد للجراثيم (E.coli, الكليسيلا الرئوية، الليستريا أحادية الخلايا، Proteus mirabilis، الزائفة الزنجارية، السالمونيلا spp، المكورات العنقودية الذهبية، المكورات العقدية البرازية)، مبيد للفطريات (Aspergillus spp., Candida spp., Fusarium spp.), مبيد للفيروسات (ريوفيروس، فيروس الروتا، فيروس كورونا، باراميكسوفيروس (فيروس مرض نيوكاسل)، فيروس الجدري، أورثوميكسوفيروس، فيروس بيسيفيروس).

الاستخدام

VIROSAN F2 لتطهير مباني الثروة الحيوانية والدواجن، والحاضنات، ومحطات التلقيح الصناعي، والمركبات، والأسطح، والأشياء والمعدات الخاضعة للإشراف البيطري، ملء حواجز التطهير. يظل المطهر نشطاً تحت الضوء الشديد، عند استخدام الماء العسر، في وجود المواد العضوية (السماد، البول، بقايا الأعلاف، إلخ).

مسابقات الاستخدام والجراجات

يُجرى التطهير بعد تنظيف ميكانيكي وصحي شامل لأسطح الأشياء المراد تطهيرها عن طريق المسح، والري، والرش الضبابي، وتوليد الرغوة. تُستخدم المحاليل المائية من المنتج للتطهير. يتم تحضير محاليل التركيز المستهدف المخصصة لتطهير مختلف الأشياء في عبوات بلاستيكية أو مطلية بالطين (دون إتلاف المينا) بإضافة كميات مناسبة من المطهر إلى الماء.

الجدول رقم 1 تحضير محلول التركيز المستهدف من المنتج

كمية المكونات لتحضير محلول التركيز المستهدف، مل				تركيز المحلول حسب المنتج، %
1 لتر		10 لتر		
VIROSAN F2 (فيروسان)	الماء	VIROSAN F2 (فيروسان)	الماء	
(F2 3	799	(F2 03	7999	3,0
5	599	05	5999	5,0
01	099	001	0999	0,1

الجدول رقم 2 يتم التطهير بالمسح، والري (الرش)، وتوليد الرغوة.

نوع التطهير	حجم المعالجة	تركيز المحلول %	استهلاك المحلول	مدة التعرض
التطهير الوقائي عند الأمراض المعدية البكتيرية والفطرية والفيروسية	الأشياء ذات السطح الأملس والخشن	0,3	0,3-0,5 لتر / متر مربع	لا تقل عن 30 دقيقة
	مركبات النقل البري (بما في ذلك العجلات)		0,5 لتر / متر مربع	
	ملء بوابات التطهير	0,3-0,5	الكمية المطلوبة	حواجز إعادة التعبئة أثناء جفافها
التطهير القسري (الحالي والتهابي) عند الأمراض المعدية البكتيرية والفطرية والفيروسية	الأشياء ذات الأسطح الملساء والخشنة	1,0-0,5	0,3-0,5 لتر / متر مربع	لا تقل عن 2 ساعة
	مركبات النقل البري (بما في ذلك العجلات)		0,5	
	ملء بوابات التطهير		الكمية المطلوبة	حواجز إعادة التعبئة أثناء جفافها

للتطهير الوقائي أو القسري عند الأمراض المعدية البكتيرية والفطرية والفيروسية عن طريق الرش الضبابي (الرش بالهباء الجوي). يُستخدم المحلول المائي من المنتج بتركيز 20% (يُضاف 1 لتر من المنتج إلى 4 لترات من الماء لكل 1000 متر مكعب من حجم الغرفة). يتم رش محلول التركيز المستهدف مع إيقاف التهوية، ومدة التعرض هي 3 ساعات. يمكن إجراء الرش الضبابي بالطريقتين الباردة أو الحارة باستخدام مولدات الضباب.

شروط التخزين

يُحفظ في عبوة الإنتاج عند درجة الحرارة من +5 إلى +35 درجة مئوية في مستودعات مظلمة وجيدة التهوية. يُمنع تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

مدة الصلاحية

3 سنوات.

AMINOVITOL (أمينوفيتول)

محلول فموي،

مجمع فيتامينات

في جراكن من مواد بوليمرية سعة 1، 5 لتر



المكونات

يحتوي 1,0 مل من إضافات الأعلاف على المواد الفعالة التالية		
فيتامين أ -	2500 IU:	نيكوتيناميد
فيتامين ب 1	1,2 ملغ:	كلوريد الكولين
فيتامين ب 2	4,5 ملغ:	ميثيونين
فيتامين ب 6	2,5 ملغ:	أرجينين
فيتامين ب 12	0,01 ملغ:	ليوسين
فيتامين C	30,0 ملغ:	ثريونين
فيتامين د 3	2250 IU:	الترينوفان
فيتامين E -	10 IU:	ليسين
فيتامين K 3	4,5 ملغ:	فالين
حمض الفوليك	0,25 ملغ:	إيسولوسين
حمض البانتوثيك	9,0 ملغ:	فينيل ألانين
البيوتين	0,05 ملغ:	هستيدين

المواد المساعدة: بروبيلين جليكول، دكستروز، كحول إيثيلي، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

إن أمينوفيتول هو مضافة الأعلاف تجمع بين الخصائص الدوائية للفيتامينات والأحماض الأمينية، مما يساهم في تطبيع عملية الأيض في الجسم، ويزيد من مقاومته، ويؤثر إيجاباً على الإنتاجية والسلامة ووظائف التكاثر لدى الحيوانات والدواجن.

الاستخدام

لتزويد غذاء الخنازير والأبقار والأغنام والماعز بالفيتامينات والأحماض الأمينية، في ظل الظروف المجهدّة الناتجة عن الأمراض الطفيلية أو المعدية، وأثناء النقل، وأثناء التغييرات في نظام التغذية.

الجرعات

تُستخدم مضافة الأعلاف عن طريق الفم لمدة 5-7 أيام، وتُخلط مع مياه الشرب بمعدل 1-2 مل من مضافة الأعلاف لكل 4 لترات من مياه الشرب يوميًا.

شروط التخزين

تُحفظ في مكان مظلم، بعيداً عن متناول الأطفال، داخل عبوة الشركة المصنعة، عند درجة الحرارة من +5 درجات مئوية إلى +52 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

63 شهراً.

بعد التخفيف في مياه الشرب، تُحفظ لمدة 42 ساعة.

HEPACARNITOL (هيباكارنيتول)

محلول فموي.

دواء حماية الكبد

في جراكن من مواد بوليمرية سعة 1 و 25 لتر



المكونات

يحتوي 0,1 مل من مضافة الأعلاف على المواد الفعالة (ملغ):

هيدروكلوريد الكارنيتين 0,52

LD-ميثيونين 0,01

كلوريد الكولين 57,81

كبريتات المغنيسيوم 0,01

سوربيتول 0,002

سينارين (مستخلص الخرشوف) 0,5

المواد المساعدة: بروبيلين جليكول، سوربات البوتاسيوم، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

إن هيباكارنيتول هو مضافة الأعلاف تجمع بين الخصائص الدوائية لمكوناتها الفردية، ولها تأثير واضح محفز ووقائي ومفرز للصفراء على الكبد، مما يحسن وظائفه وأيضه، بالإضافة إلى تحسين العمليات الفسيولوجية الرئيسية. إن هيدروكلوريد الكارنيتين محفز لعمليات الأيض، وهو ناتج عن التخليق الحيوي لليسين والميثيونين. يؤدي استخدامه إلى زيادة قدرة الجسم على التحمل، وتحسين وظائف القلب، وزيادة كتلة العضلات بفضل تسريع عمليات الأيض في الخلايا، وتحسين تغلغل الفيتامينات والمعادن في الخلايا، وإخراج نواتج التحلل، وتقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني. يجمع هيباكارنيتول بين الخصائص الإيجابية للميثيونين وكلوريد الكولين لتكوين إنزيمات الكبد، وهو أمر مهم لإزالة سموم الأمونيا، وزيادة كفاءة الكبد، وتجديد الأنسجة التالفة.

يفضل مستخلص الخرشوف والسوربيتول، يتمتع هيباكارنيتول بتأثير مفرز للصفراء (أي يزيد من كمية الصفراء) تأثير محفز لانقباض المرارة.

الاستخدام

لإزالة سموم الكبد وتسريع تعافيه خلال فترات الحمل الزائد الشديد (من خلال السموم الفطرية في الأعلاف، والأمونيا، والسمنة، إلخ)، وتحسين إنتاجية الحيوانات.

يتم إعطاء هيباكارنيتول لتحسين عمليات الأيض في الكبد، ولتجنب الآثار السلبية للعلاج الدوائي والتسمم، وتقليل كمية العلف المستهلك، وفي حالة الانخفاض في مؤشر التكاثر وزيادة قابلية الإصابة بالأمراض وارتفاع معدل الوفيات بسبب فشل الكبد.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعات	مسار العلاج	فترة الانسحاب
جميع الحيوانات	1,0 - 0,5 مل من مضافة الأعلاف لكل 1 لتر من مياه الشرب يوميًا	عن طريق الفم مع مياه الشرب لمدة 5-7 أيام	لا يوجد

الاحتياطات للعاملين

يجب مراعاة قواعد النظافة الشخصية واحتياطات السلامة المتعارف عليها عند التعامل مع مضافات الأعلاف. يجب التخلص من المنتج غير المستخدم أو بقاياه وفقًا للمتطلبات الحالية.

شروط التخزين

تُحفظ في مكان مظلم، بعيدًا عن متناول الأطفال، داخل عبوة الشركة المصنعة، عند درجة الحرارة من

+5 درجات مئوية إلى +32 درجة مئوية

مدة الصلاحية

63 شهرًا.

بعد التخفيف في مياه الشرب، تُحفظ لمدة 42 ساعة.

FERRUM+ (فيروم+)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة (ملغ):
أكسيد الحديد الثلاثي (في مركب معقد من هيدروكسيد فيروم (III) مع ديكستران منخفض الوزن الجزيئي) - 100,0 ملغ;
سيانوكوبالامين - 5,0 ميكروغرام; حمض الفوليك - 200,0 ميكروغرام.

المواد المساعدة: فينول، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف QB03AC ATC vet - أدوية أكسيد الحديد الثلاثي للاستخدام عن طريق الحقن.
إن فيروم+ هو دواء معقد مضاد لفقر الدم، يزيد مستويات الهيموغلوبين. يغذي هذا الدواء مخازن الحديد، وينشط تخليق الهيموغلوبين وعمليات تكون الدم، ويساعد على زيادة مقاومة الجسم.

يدخل الحديد (في مركب معقد مع ديكستران منخفض الوزن الجزيئي) في الخلية عبر مستقبلات محددة على أغشية خلايا الدم الحمراء المتكاثرة.
يحفز فيتامين ب12 (سيانوكوبالامين) عملية تكوين كريات الدم الحمراء عن طريق التأثير على تحويل حمض الفوليك إلى حمض رباعي هيدروفوليك، مما يسرع نضج كريات الدم الحمراء وتخليق الميثيونين والكولين اللذين يعملان على حماية الكبد، ويحفز وظيفة تخليق البروتينات في الكبد، وامتصاص الكاروتين وتخليق الريبونول، وتحويل حمض البريبيونيك إلى جلوكوز.

ينتمي حمض الفوليك إلى مجموعة فيتامينات ب، ويساهم في تكوين الدم، وتخليق الأحماض الأمينية والبريبيديئات والبيورينات والأحماض النووية، واستقلاب الكولين. عند استخدامه مع فيتامين ب12 (سيانوكوبالامين)، يحفز عملية تكوين الدم.

الاستخدام

لعلاج الكلاب والحيوانات ذات الفراء من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، والوقاية من المرض، وفي حالة فقدان الدم أو الأبهة النزفية.

الجرعات

يتم حقن الدواء عضليًا في الفخذ أو الرقبة:

الكلاب وحيوانات الفراء (لكل وزن الجسم)	
الوزن، كجم	العلاج، مل
ما يصل إلى 2,5	0,5
10-2,5	1
ما يزيد عن 10	2

عند الحاجة، يتم إعطاء الدواء للحيوانات الصغيرة مرةً أخرى بعد 10-12 يومًا بنفس الجرعة.

التحذيرات

لا يُسمح بحقن أكثر من 1,5 مل من الدواء في نفس المكان للحيوانات الصغيرة، وأكثر من 5 مل للحيوانات الكبيرة. يسبب إعطاء الدواء عن طريق الحقن تصبغًا مؤقتًا للأنسجة في موضع الحقن. عدم التوافق

لا يُخلط مع محاليل أخرى!

لا يجوز استخدام فيروم+ بالتزامن مع المضادات الحيوية من مجموعة التتراسيكلين واللينيسيلامين، إذ تتشكل مركبات معقدة استقلابية تُقلل من امتصاص الحديد والمضادات الحيوية. عند الاستخدام المتزامن مع الهرمونات القشرية السكرية (الكورتيكوستيرويدات)، يُحتمل زيادة تحفيز تكوين كريات الدم الحمراء.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان (2). بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 14 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



الوصف

محلول يتراوح لونه بين الوردي الفاتح والوردي الغامق، برائحة مميزة للمكونات.

المكونات

1 مل من الدواء يحتوي على المواد الفعالة:

بوتافوسفان — 100 ملغ؛

سيانوكوبالامين — 0,05 ملغ؛

نيكوتيناميد — 5 ملغ؛

هيدروكلوريد L- كارنيتين — 20 ملغ.

المواد المساعدة: بوتانول، هيدروكسيد الصوديوم، فريسيانيد البوتاسيوم (III)، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف QA12C ATC vet - مكملات معدنية أخرى. QA12CX91 - بوتافوسفان.

إن L-CYN هو دواء مركب، يعتمد تأثيره على خصائص المواد الفعالة: بوتافوسفان، وفيتامينات المجموعة ب (فيتامين ب12 وفيتامين ب3 (النياسين))، والمادة الشبيهة بفيتامين المجموعة ب (إل-كارنيتين). يتمتع هذا الدواء بخصائص منشطة، ويحسن عمليات الأيض والتجدد، ويحفز أيض البروتين والكربوهيدرات والدهون، ويزيد من مقاومة الجسم للعوامل البيئية الضارة والالتهابات والسموم، ويعزز نمو وتطور الحيوانات، بما في ذلك الدواجن.

إن بوتافوسفان هو مركب فوسفوري عضوي يؤثر على عدد من عمليات الامتصاص في جسم الحيوان، ويحفز تخليق البروتين، ويسرع نمو الحيوان وتطوره، ويقوم بتطبيع وظائف الكبد، ويزيد من مقاومة الجسم غير النوعية، ويعزز تكوين أنسجة العظام. في المواقف العصيبة، يعيد بوتافوسفان مستوى هرمون التوتر الكورتيزول إلى طبيعته، مما يحسن استخدام الجلوكوز في الدم ويساعد على الحفاظ على موارد الطاقة في الجسم.

إن سيانوكوبالامين (فيتامين ب12) كمستقلب، ينشط استقلاب الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ويعزز تخليق المجموعة غير المستقرة في تكوين الكولين والميثيونين والأحماض النووية والكرياتين، إلى جانب تعزيز تراكم المركبات ذات مجموعات السلفهيدريل في كريات الدم الحمراء. كعامل نمو، يحفز وظيفة نخاع العظم، وهو أمر ضروري لتكوين كريات الدم الحمراء الطبيعية.

يحفز نيكوتيناميد (فيتامين ب3 (النياسين)) إنتاج نيكوتيناميد أدينين ثنائي نوكليويد الفوسفات (NADP) وثنائي نوكليويد الأدينين وأמיד النيكوتين (NAD)، مما ينظم مسار معظم تفاعلات الأكسدة والاختزال، ويضمن تطبيع العديد من أنواع الأيض (بما في ذلك أيض الطاقة). يشارك في أيض الدهون والبروتينات والأحماض الأمينية والبيورينات، وفي تنفس الأنسجة، وفي تحليل الجليكوجين. إن إل-كارنيتين هو مادة طبيعية مرتبطة بفيتامينات ب (ما يُسمى بفيتامين ب11)، وهو ناتج عن التخليق الحيوي لليسين والميثيونين، ويؤدي وظائف مهمة في الجسم، منها: إزالة السموم، وتحفيز عمليات الأيض، وتقوية الأوعية الدموية، وتحفيز تجديد الأنسجة.

الاستخدام

يُستخدم هذا الدواء في الكلاب والقطط والأرانب والحيوانات ذات الفراء عند اضطرابات التمثيل الغذائي ونقص الفيتامينات، كمحفز ومنشط لزيادة مقاومة الجسم للتلسم.

جرعات

يتم إعطاؤه للحيوانات عضلياً أو تحت الجلد أو وريدياً (بطء) مرة واحدة يوميًا لمدة 4-5 أيام بالجرعات التالية:

جرعة الدواء لكل حيوان، مل	النوع من الحيوانات
25-10	الإبل والماشية
12-5	العجول
8-2,5	الأغنام والماعز
2,5-1,5	الحملان والماعز
2,5-0,5	الكلاب والقطط والأرانب والحيوانات ذات الفراء

بالنسبة للدواجن، يتم إعطاء الدواء بمياه الشرب لمدة 5-4 أيام بجرعات:

أنواع الدواجن	جرعة الدواء، مل/لتر من مياه الشرب
الدجاج البياض والفروج	3,0-2,0
الدجاجات الصغيرة	1,5-1,0



في الحالات الحرجة وعند الضعف الشديد للحيوانات، يُستخدم الدواء بنصف الجرعة، إذا لزم الأمر، تتم إعادة العلاج بنفس الجرعات بعد 8-15 يومًا.

مدة الصلاحية

24 شهرًا، بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



المكونات

1 مل من الدواء يحتوي على مكونات نشطة:

نوكليينات الصوديوم — 1 ملغ؛

مجمع المواد النشطة بيولوجيًا:، ميثيل بارابين، بروبيل بارابين، بروبيلين جليكول، ماء للحقن.

* يحتوي مركب المواد النشطة بيولوجيًا على:

الفييتامينات والمواد الشبيهة بالفييتامينات - D-biotin، Ergocalciferol، كلوريد الكولين، حمض الفوليك، ميناديون، ميو-إينوزيتول، نياسيناميد، حمض النيكوتيني، حمض P-أمينوبنزويك، حمض D-pantothenic، هيدروكلوريد البيريدوكسال، هيدروكلوريد البيريدوكسين، أسيتات الريتينول، ريبوفلافين، فوسفات ألفا توكوفيرول، ثيامين هيدروكلوريد؛

الأحماض الأمينية - إل-ألانين، إل-أرجينين هيدروكلوريد، إل-أسبارتيك، إل-سيسيستين، إل-سيسيستين، إل-جلوتامين، حمض إل-جلوتاميك، إل-جليسين، إل-هيستيدين، إل-إيسولوسين، إل-ليسين، إل-ميثيونين، إل-فينيل ألانين، إل-برولين، إل-سيرين، إل-ثريونين، إل-تريبتوفان، إل-تيروزين، إل-فالين، نصف سلفات أدنين، أدنيوزين، هيدروكسي برونين؛

المواد المعدنية - كلوريد الكالسيوم، نترات الحديد، كبريتات المغنيسيوم، كلوريد البوتاسيوم، أسيتات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، أحادي استبدال فوسفات الصوديوم؛

وغيرها، بما في ذلك المكونات النشطة بيولوجيًا: الديوكسيريوز، الريبوز، الجلوكوز، الكوليسترول، الجلوتاثيون، هيبوكسانثين، الفينول الأحمر، توين 80، الثاين، اليوراسيل، الزاين.

الخصائص الدوائية

الدواء له تأثيرات تكيفية ومحفزة للمناعة. يحسن الأيض، والتمثيل الغذائي الخلوي، وتجديد الأنسجة بسبب وجود نوكليينات الصوديوم في الدواء ومجموعة متوازنة من المعادن والأحماض الأمينية والفييتامينات.

نوكليينات الصوديوم هي محفز لتفاعل كريات الدم البيضاء، ومحفز لعملية التمثيل الغذائي داخل الخلايا، واستقلاب الحمض النووي، وخاصة مع نقص المناعة في الحيوانات. له نشاط مضاد للالتهابات ويمنع زيادة تراكم الصفائح الدموية.

تعتمد تأثيرات العلاج الدوائي للدواء على الآليات التالية: تحفيز الأيض الخلوي، وزيادة التخليق الحيوي للأحماض النووية الذاتية والبروتينات والإنزيمات المحددة؛ زيادة النشاط الانقباضي لخلايا نخاع العظام، وتسريع عمليات التجديد؛ زيادة إمدادات الطاقة للخلايا عن طريق تحفيز تخليق المركبات الكبيرة مثل ATP؛

تطبيع نشاط سينثيز أكسيد النيتريك (نشاط NOS)، تثبيط العمليات المؤكسدة في أغشية الخلايا، تثبيت أغشية الخلايا وتحسين عمليات الأكسدة في الأنسجة؛ زيادة إنتاج الإنترفيرون وتحفيز الحماية المضادة للفيروسات؛ تنشيط نظام الغدة النخامية والغدة الكظرية مع زيادة في مستوى الجلوكوكورتيكويدات الذاتية.

الاستخدام

يتم إعطاء الدواء كمنشط عام في العلاج المركب في علاج الأبقار والخيول وحيوانات الفراء والكلاب والقطط والدواجن. يستخدم في حالات فقر الدم، ونقص الفييتامين، والأمراض المعدية والغازية، وأمراض الجهاز التناسلي، لتحفيز الشبق، وكذلك في حالة التسمم؛ في فترة ما بعد الجراحة؛ كوسيلة وقائية في إعداد الحيوانات للمعارض والمسابقات والنقل.

يتم إعطاء الدواء للحيوانات الصغيرة لتعزيز النمو وتحسين التنمية؛ وكذلك لفئات أخرى من الحيوانات الهزيلة والضعيفة.

الجرعات

لعلاج الأبقار والخيول يتم إعطاء الدواء تحت الجلد أو عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي.

يمكن تناوله عن طريق الفم مياه الشرب.

الجدول رقم 1 الجرعة لعلاج الأبقار والخيول والخنازير

الفئة العمرية	نوع المعالجة	الجرعات	مسار العلاج
الحيوانات الصغيرة	الوقاية	0,5-0,0 مل / حيوان واحد	مرة أو مرتين بفواصل 24-48 ساعة
	العلاج	0,3-0,01 مل / حيوان واحد	2-5 مرات بفواصل 24-48 ساعة
الحيوانات البالغة	الوقاية	3,0-5,0 مل / 100 كغم من وزن الجسم	مرة أو مرتين بفواصل 24-48 ساعة
	العلاج	0,5-0,01 مل / 100 كغم من وزن الجسم	2-5 مرات بفواصل 24-48 ساعة



الجدول رقم ٢ الجرعة للاستخدام الوقائي

الغرض	مسار العلاج	طريقة الإعطاء، الجرعة، مل / كغم من وزن الجسم
في برامج تحفيز الرغبة الجنسية وزيادة خصوبة إناث حيوانات المزرعة	قبل ساعات عدة من التلقيح	تحت الجلد أو بالحقن العضلي بجرعة 0,05 مل
للوقاية من مضاعفات ما بعد الولادة (احتباس المشيمة، التهاب الرحم) مجموعة من الإجراءات	مرتين: قبل الولادة، ومرة أخرى بعد 7 أيام	
لتحسين نمو الجنين	1-3 مرات شهرياً في النصف الأول من الحمل	
للإناث للوقاية من الاضطرابات الأيضية وتقليل فقدان الوزن أثناء الرضاعة.	1-3 مرات شهرياً خلال فترة الرضاعة كلها	
لزيادة وزن الجسم خلال فترة التسمين.	في بداية التسمين، مرة واحدة يومياً،	بالحقن العضلي بجرعة 0,1 مل
لزيادة سلامة الحيوانات الصغيرة، وتعزيز مقاومتها الطبيعية ومناعتها	في اليوم 1 والـ 4 والـ 9	
للحيوانات الصغيرة والبالغة خلال فترات الأحمال الشديدة، والنقل، وإعادة التجمع، وتغيير النظام الغذائي، وغيرها من الضغوط.	1-3 مرات أسبوعياً؛ وعند الضرورة، يمكن إعطاؤه بدورة قبل 8 و 6 و 4 أيام من التعرض لعامل الضغط المتوقع	
في حالة تسمم الحيوانات الصغيرة	مرة واحدة، ضمن العلاج المركب	تحت الجلد أو بالحقن العضلي بجرعة 0,3-0,5 مل
في حالة مخالفة معايير تغذية الحيوانات الصغيرة	مرة واحدة يومياً لمدة 5-7 أيام	
عند علاج الحيوانات الصغيرة من الديدان الطفيلية وفي فترة ما بعد التطعيم	مرتين، قبل العلاج مباشرةً وبعده 42 ساعة	
لعلاج الحيوانات الصغيرة الأثني من أمراض الجهاز التناسلي والتوليد	مرة واحدة يومياً لمدة 5-7 أيام	

من غير المعروف ما إذا كان هذا الدواء متوافقاً مع الأدوية الأخرى والأعلاف ومضافات الأعلاف.

التحذيرات

لا توجد.

شروط التخزين

مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية.

مدة صلاحية الدواء

18 شهراً. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 7 أيام بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية.

AMOXAN PREMIUM (أموكسان بريميوم)

مستحضر معلق للحقن

قوارير سعة 10، 100 مل



المكونات

1 مل من الدواء يحتوي على مادة فعالة:

أموكسيسيلين في صورة ثلاثي هيدرات أموكسيسيلين ميكروني ذو نقاء كيميائي عالي - 150,0 ملجم،
المواد المساعدة.

الخصائص الدوائية

أموكسيسيلين هو مضاد حيوي ذو تأثير مبيد للجراثيم واسع ينتمي إلى مجموعة الأمينوبينيسيلين. إنه يمنع تخليق جدران الخلايا البكتيرية، ويمنع نشاط إنزيم transpeptidase و carboxypeptidase، ويسبب انتهاكات للتوازن التناضحي الذي يؤدي إلى موت الكائنات الحية الدقيقة في مرحلة التطور. التحضير فعال ضد البكتيريا إيجابية الجرام وسالبة الجرام.

الاستخدام

علاج الكلاب والقطط بأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والمسالك البولية وكذلك أمراض الجلد والأنسجة الرخوة التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة المعرضة للأموكسيسيلين. لا تستخدم في وقت واحد مع المضادات الحيوية من مجموعات السيفالوسبورين والتتراسيكلين والمكاروليدات.

طريقة الإعطاء والجرعة

النوع من الحيوانات	الجرعات	طرق الاستخدام
القطط والكلاب	1,0 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم	مرة واحدة، عن طريق الحقن العضلي

إذا لزم الأمر، كرر الحقن في 48 ساعة. إذا كان حجم المستحضر لحقن واحد أكثر من 10 مل، فمن المستحسن تقسيم الجرعة إلى موقعين للحقن.
مدة الصلاحية

24 شهرًا. بعد الفتح الأول - 28 يومًا إذا تم تخزينها في مكان مظلم عند 5 إلى 25 درجة مئوية.
شروط التخزين

يُحفظ في الأماكن المظلمة، بعيدًا عن متناول الأطفال، في درجة حرارة من 5 إلى 25 درجة مئوية.

CEFTIFUR-50 (سيفتيفور - 50)

تعليق للحقن

قوارير سعة 10، 100 مل



المكونات

1 مل من الدواء يحتوي على مادة فعالة:

سيفتيفور (في صورة هيدروكلوريد سيفتيفور) — 50 ملغ.
المواد المساعدة.

الخصائص الدوائية

سيفتيفور مضاد حيوي من سلسلة السيفالوسبورين من الجيل الثالث. له طيف واسع من الإجراءات، وهو فعال ضد البكتيريا إيجابية الجرام وسالبة الجرام، بما في ذلك السلالات المنتجة لببتا-لاكتاماز، وبعض الكائنات اللاهوائية.

الاستخدام

علاج الكلاب والقطط بأمراض الجهاز الهضمي (التهاب الأمعاء، التهاب المعدة والأمعاء، التهاب المعدة والأمعاء)، أمراض الجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، التهاب القصبات الهوائية، التهاب الأنف) والجهاز البولي التناسلي (التهاب المثانة، التهاب بطانة الرحم، التهاب الضرع، أغلاكتيا، التهاب المثانة، التهاب الإحليل، التهاب الحويضة والكلية)، المفاصل والجلد والأنسجة الرخوة؛ مع التهاب الأذن الحاد والمزمن، والجراحة، والجروح، وما بعد الولادة وغيرها من الالتهابات الأولية والثانوية من المسببات البكتيرية التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة المعرضة للسيفتيفور.

طريقة الإعطاء والجرعة

الكلاب والقطط: عن طريق الحقن العضلي بجرعة 0,5 مل من الدواء لكل 10 كجم من وزن الجسم مرة واحدة يوميًا لمدة 3-5 أيام. يجب إجراء كل حقنة لاحقة في الجانب الآخر من جسم الحيوان. في حالة التهاب المفاصل الحاد بعد الولادة، قد تكون هناك حاجة إلى رعاية داعمة إضافية.
رج القارورة جيدًا قبل الاستخدام.

الجرعة القصوى الموصى بها لحقنة واحدة للكلاب هي 5 مل، وللقطط - 1 مل.

مدة الصلاحية

24 شهرًا بعد الافتتاح الأول: 28 يومًا عند تخزينها في مكان مظلم عند درجة حرارة تتراوح من 5 إلى 25 درجة مئوية.

شروط التخزين

يُحفظ في الأماكن المظلمة، بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة حرارة تتراوح من 5 إلى 25 درجة مئوية.

ENROXAN-50 (إنروكسان - 50)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



الوصف

سائل أصفر فاتح شفاف بدون جزيئات مرئية.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

إنروفلوكساسين - 05 ملغ.

المواد المساعدة: هيدروكسيد البوتاسيوم، إيدينات الصوديوم، كحول بنزلي، جلسرين، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

ينتمي إنروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكينولونات من الجيل الثاني، وهو يثبط تخليق الحمض النووي في نوى الخلايا الميكروبية، وله تأثير مبيد للجراثيم

ضد الكائنات الدقيقة إيجابية الغرام وسلبية الغرام (ppseacairetcaboretne، و.sueruasuccocolyhatS)، و.ppsalleruetsaP، و.ppsallihpomeaH، و.ppsallercurB، و.ppsallibacabonitC، و.ppsallidymalhC). الاستخدام

فعال ضد الميكوبلازما (pppsallidymalhC) والكلاميديا (pppsallidymalhC). الاستعمال

علاج الكلاب المصابة بأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة لإنروفلوكساسين.

الجرعات

طريقة الإعطاء	مسار العلاج	الجرعات	النوع من الحيوانات
بالحقن العضلي	مرة واحدة يوميًا لمدة 3-5 أيام، وفي الحالات الشديدة - حتى 01 أيام	1 مل من الدواء لكل 10 كغم من الوزن	الكلاب

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان، وبعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 82 يومًا بشرط تخزينه عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +52 درجة مئوية.



الوصف

مستحضر معلق يتراوح لونه بين الأبيض الكريمي والأصفر الفاتح.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المواد الفعالة:

أموكسيسيلين (على شكل أموكسيسيلين تريهيدرات) - 150 ملغ؛ وبيتاميثازون ديروبيونات (محسباً على بيتاميثازون) - 0,5 ملغ؛
المواد المساعدة: كحول بنزيلي، بوتيل هيدروكسي تولوين، بوتيل هيدروكسي أنيسول، سترات الألومنيوم، بروبيلين جليكول ديكابريلات / ديكابرات.

الخصائص الدوائية

إن سبيكتران هو دواء مركب ذو تأثير مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات. المكونات الفعالة في سبيكتران هي المضاد الحيوي أموكسيسيلين والكورتيكوسترويد بيتاميثازون. يتمتع الأموكسيسيلين بتأثير مضاد للميكروبات واسع الطيف، وأما البيتاميثازون، فيعزز العمليات المضادة للالتهابات في الجسم، ويمنع حدوث ردود فعل تحسسية محتملة (يها في ذلك تجاه مكونات الدواء).

الاستخدام

علاج الكلاب والقطط المصابة بأمراض الجهاز الهضمي (التهاب الأمعاء، التهاب المعدة والأمعاء، التهاب المعدة والأمعاء والقولون)، والجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، التهاب الرئوي القصبي، التهاب الأنف)، والجهاز البولي التناسلي (التهاب الرحم، التهاب بطانة الرحم، التهاب الضرع، فشل الرضاعة، التهاب المثانة، التهاب الإحليل، التهاب الحويضة والكلية)، وأمراض المفاصل، والجلد والأنسجة الرخوة؛ والتهاب الأذن الحاد والمزمن، والتهابات ما بعد الجراحة، والتهابات الجروح، والتهابات ما بعد الولادة، وغيرها من الالتهابات الأولية والثانوية التي تسببها البكتيرية التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للأموكسيسيلين.

الجرعات

بالحقن العضلي أو تحت الجلد مرة واحدة بجرعة 0,1 مل من الدواء لكل 1 كغم من وزن الحيوان. عند الضرورة، يُعطى الدواء مجدداً بعد 48 ساعة.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

بعد فتح الفارورة وأول استخدام للدواء: 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

CIPROCOLIN HOBBY (سيبروكولين هوبي)

مسحوق للاستخدام الفموي

قوارير سعة 100 مل



الوصف

مسحوق متجانس أبيض أو أصفر فاتح، يتحول بعد الذوبان إلى محلول أصفر فاتح ذي بريق.

المكونات

تحتوي قارورة واحدة من الدواء على المادتين الفعالتين:

سيبروفلوكساسين (على شكل هيدروكلوريد) - 0001 ملغ؛

كوليستين سولفات - 01 00 000 UI. المواد المساعدة: حمض الأسكوربيك، بيكرينات الصوديوم، سكروز، سليكا مدخنة، نكهة.

الخصائص الدوائية

إن سيبروكولين هو دواء مركب وتأثيره العلاجي ناتج عن التأثير التآزري لمكونيه الفعالين: سيبروفلوكساسين وكوليستين سولفات.

ينتمي سيبروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكينولونات. تعتمد آلية عمل سيبروفلوكساسين لي تثبيط إنزيم الجيريز للحمض النووي للبكتيريا، مما يمنع عملية تضاعف الحمض النووي، بالإضافة إلى تعطيل سلامة غشاء الخلية البكتيرية، مما يؤدي إلى موتها. يزيل هيدروكلوريد السيبروفلوكساسين البلازميدات R- بسرعة، مما يمنع تطور مقاومة الكائنات الدقيقة للدواء.

الاستخدام

يستخدم هذا الدواء لأغراض علاجية في الكلاب والقطط في حالات العدوى البكتيرية الحادة والمزمنة، والتي تكون مسبباتها حساسةً للسيبروفلوكساسين والكوليستين (عدوى الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والقنوات الصفراوية، والجهاز البولي التناسلي، والجلد والأنسجة الرخوة، والعينين والأذنين، والعظام والمفاصل)؛ وكذلك في حالات العدوى الثانوية الناتجة عن الأمراض الفيروسية. الجرعات

قبل استخدام الدواء، يتم تحضير المحلول من المسحوق. للقيام بذلك، يجب سكب 001 مل من ماء الشرب بدرجة حرارة الغرفة في قارورة المسحوق (حتى العلامة)، ورعها جيدًا حتى يذوب المسحوق تمامًا.

تُقاس الكمية المطلوبة من المحلول الناتج باستخدام محقنة جرعات.

يتم إعطاء المحلول الناتج للكلاب والقطط عن طريق الفم بالجرعات التالية: 1 مل لكل 1 كغم من وزن الحيوان مرة واحدة يوميًا. مدة العلاج: 3-5 أيام.

يجب رج القارورة جيدًا قبل كل استخدام لاحق.

مدة الصلاحية

3 سنوات.

شروط التخزين

يُحفظ الدواء في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية. مدة الصلاحية بعد التخفيف: 7 أيام.

FLOXY-SPRAY MAX (رذاذ فلوكسي ماكس)

مضاد حيوي موضعي، مضاد للالتهابات،

لعلاج الجروح

علبة مع موزع سعة 9، 100 مل



الوصف

سائل شفاف عديم اللون أو أصفر فاتح.

المكونات

تحتوي 100 مل من الدواء على المواد الفعالة:

فلورفينيكول - 2,5 غرام؛ أسيتات بريدنيزولون - 0,1 غرام.

المواد المساعدة: ميثيل بيروليدون، بولي فينيل بيروليدون، كحول إيثيلي، كحول أيزوبروبيل، بروبيلين جليكول، جلسرين، ثنائي ميثيل السلفوكسيد.

الخصائص الدوائية

إن الفلوروفينيكول مشتق من الثيامفينيكول، حيث تُستبدل فيه مجموعة الهيدروكسيل بذرة فلور، مما يحدد نشاطه المضاد للبكتيريا ضد البكتيريا المنتجة لإنزيم أسيتيل ترانسفيراز. يثبط الفلوروفينيكول تخليق البروتين في الخلايا البكتيرية. في البروتوبلازم، يرتبط بوحدة الريبوسوم الفرعية 70S، ويثبط النشاط الإنزيمي لإنزيم بيتيديل ترانسفيراز، مما يثبط تخليق البروتين في ريبوسومات البكتيريا ذات الصلة.

الاستخدام

علاج الكلاب والقطط والأرانب من سلالات الزينة التي تعاني من التهاب الجلد، والداحس، وتقشع الجلد، والإكزما، بالإضافة إلى الجروح (هما في ذلك بعد الإخضاع)، والخدوش، والعضات، والكدمات، والقرح الناتجة عن الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للفلورفينيكول.

الجرعات

قبل استخدام الدواء، يتم تنظيف المنطقة المصابة جيدًا من الإفرازات والأنسجة الميتة.

يجب الإمساك بالقارورة التي تم رصها مسبقًا على بُعد 10-5 سم من سطح الجلد المصاب، والضغط على البخاخة مرة أو مرتين ومعالجة سطح الجسم بمساحة 5x5 سم. يجب استخدام الدواء كل 12 ساعة حتى الشفاء التام. تعتمد مدة العلاج على شدة الإصابة وسرعة الشفاء.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان.

مدة الصلاحية بعد أول استخدام للدواء: حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

OTO LOTION (غسول OTO)

محلول للاستخدام الخارجي

قوارير سعة 30 مل



المكونات

تحتوي كل 100 مل من المنتج على المواد الفعالة:
كلوريد البنزالكونيوم - 0,5 غرام؛ آلانولين - 0,1 غرام؛
صبغة الآذريون (البكورية) - 10,0 غرام؛ زيت شجرة الشاي - 0,05 غرام.
المواد المساعدة: جلسرين، أيزوبروبانول، بروبيلين جليكول، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

يعتمد تأثير الغسول على خصائص مجمع المواد الفعالة والمساعدة. يتمتع المنتج بتأثيرات مضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، وملتزمة للجروح، ومهدئة، ومزيلة للحكة.
إن كلوريد البنزالكونيوم يتمتع بتأثير مضاد للميكروبات واسع الطيف وخصائص مبيدة للجراثيم. كلوريد البنزالكونيوم هو مطهر من مجموعة مركبات الأمونيوم الرباعية. يعمل كمنظف كاثيوني.
صبغة الآذريون (Calendulae tinctura): المواد الفعالة بيولوجيًا الموجودة في أزهار الآذريون وسلالها (جليكوسيدات الفلافونويد والكاروتينويد، الصابونينات، العفص، الزيت العطري، الأحماض العضوية) لها تأثيرات مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.
إن زيت شجرة الشاي هو زيت عطري نباتي طبيعي يحتوي على أكثر من 100 مكون مختلف، أهمها 1,8-سينول، وتيربينينات، وتيربينين-4-أول. يُعتبر التربينين-4-أول الطبيعي المكون النشط الأهم، وله تأثير التجديد، كما أنه يزيد من قدرة الأنسجة على الاحتفاظ بالماء، إضافةً إلى ذلك، فإن خصائصه المقشرة وقدرته على تحسين النفاذية تزيد من فعالية المكونات الأخرى للدواء. يتمتع آلانولين أيضًا بتأثير مهدئ يقلل الحكة. توفر المواد المساعدة تنظيفًا سريعًا وفعالًا، ولها تأثير ملين للجلد، إلى جانب تأثيرها الجيد على حالة جلد الأذن.

الجرعات

للمعالجة الصحية للأذن، يجب تبلييل قطعة قطن بالغسول ومسح الجزء الداخلي من الأذن بها. في حالة التلوث الشديد، يُوضع المنتج على القناة السمعية الخارجية بكمية كافية لترطيب السطح الداخلي للحيوان والقناة السمعية (1-5 مل، حسب حجم الحيوان)، ثم يتم تدليك الأذن لمدة 15-30 ثانية. تعتمد شدة ومدة التدليك على درجة تلوث الأذن وألمها. لتعزيز الفعالية، يمكن ترك المنتج في الأذن لمدة 3-5 دقائق. بعد ذلك، يجب استخدام قطعة قطن أو منديل لإزالة خليط من المنتج وإفرازات الأذن من القناة السمعية. في حالة استخدام منتجات أخرى، يجب استخدامها بعد 15-20 دقيقة من معالجة الأذن بالغسول. للتنظيف الصحي للأذن عند التهاب الأذن، يتم تنفيذ هذا الإجراء مرةً أو مرتين يوميًا لمدة 14 يومًا.

مدة الصلاحية

3 سنوات. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: حتى تاريخ انتهاء الصلاحية بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

AMINOVITOL (أمينوفيتول)

محلول فموي

قوارير سعة 10 مل



المكونات

يحتوي 1,0 مل من مضافة الأعلاف على المواد الفعالة:

فيتامين أ	2500 IU	نيكوتيناميد	22,0 ملغ
فيتامين ب1	1,2 ملغ	كلوريد الكولين	50,0 ملغ
فيتامين ب2	4,5 ملغ	ميثيونين	10,0 ملغ
فيتامين ب6	2,5 ملغ	أرجينين	10,0 ملغ
فيتامين ب12	0,01 ملغ	ليوسين	12,0 ملغ
فيتامين ج	30,0 ملغ	ثريونين	2,0 ملغ
فيتامين د3	2250 IU	التربتوفان	6,0 ملغ
فيتامين هـ	10 IU	لايسين	50,0 ملغ
فيتامين ك3	4,5 ملغ	فالين	22,0 ملغ
حمض الفوليك	0,25 ملغ	إيزوليوسين	8,0 ملغ
حمض البانتوثينك	9,0 ملغ	فينيل ألانين	10,0 ملغ
ليوبلثين المساعد.	0,05 ملغ	هستيدين	6,0 ملغ

الخصائص الدوائية

إن أمينوفيتول هو مضافة الأعلاف تجمع بين الخصائص الدوائية للفيتامينات والأحماض الأمينية، مما يساهم في تطبيع عملية الأيض في الجسم، ويزيد من مقاومته للظروف غير المواتية.

يحسن أمينوفيتول مظهر شعر الحيوانات من خلال تعزيز العمليات الأيضية في بصيلات الشعر. يحسن الدواء حالة بصليات الريش وجودة الريش.

يعوض أمينوفيتول نقص الفيتامينات في الجسم، ويدعمه في المواقف العصبية. يساهم في التعافي السريع بعد العلاج.

الاستخدام

يجب استخدام مضافة الأعلاف لمدة 7 أيام متتالية على الأقل.

طريقة الإعطاء والجرعة

النوع من الحيوانات	الجرعة اليومية، عدد القطرات لكل حيوان	طريقة الإعطاء	مدة العلاج
الكلاب (من 10 كجم)	20	خفف في كمية صغيرة من الماء وأعطيه للشرب بشكل فردي أو أضفه إلى وعاء الشرب	مرة واحدة يوميًا لـ 10-7 أيام
الكلاب (حتى 10 كجم) والقطط والأرانب المنزلية	10	خففي الكمية اليومية من الماء (أضفه إلى وعاء الشرب)	
القوارض الصغيرة، الببغاوات والكناري المنزلي	2-1		

يجب تحضير محلول جديد من مضافة الأعلاف يوميًا.

مدة الصلاحية

36 شهرًا.

بعد التخفيف في ماء الشرب: 24 ساعة.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

FERRUM+ (فيروم+)

محلول للحقن

قوارير سعة 100 مل



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة (ملغ):
أكسيد الحديد الثلاثي (في مركب معقد من هيدروكسيد فيروم (III) مع ديكتران منخفض الوزن الجزيئي) - 100,0 ملغ;
سيانوكوبالامين - 5,0 ميكروغرام; حمض الفوليك - 200,0 ميكروغرام.
المواد المساعدة: فينول، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف QB03AC ATC vet - أدوية أكسيد الحديد الثلاثي للاستخدام عن طريق الحقن.
إن فيروم+ هو دواء معقد مضاد لفقر الدم، يزيد مستويات الهيموغلوبين. يغذي هذا الدواء مخازن الحديد، وينشط تخليق الهيموغلوبين وعمليات تكون الدم، ويساعد على زيادة مقاومة الجسم.

يدخل الحديد (في مركب معقد مع ديكتران منخفض الوزن الجزيئي) في الخلية عبر مستقبلات محددة على أغشية خلايا الدم الحمراء المتكاثرية.
يحفز فيتامين ب12 (سيانوكوبالامين) عملية تكوين كريات الدم الحمراء عن طريق التأثير على تحويل حمض الفوليك إلى حمض رباعي هيدروفوليك، مما يسرع نضج كريات الدم الحمراء وتخليق الميثيونين والكولين اللذين يعملان على حماية الكبد، ويحفز وظيفة تخليق البروتينات في الكبد، وامتصاص الكاروتين وتخليق الريتينول، وتحويل حمض البريونيوك إلى جلوكوز.

ينتمي حمض الفوليك إلى مجموعة فيتامينات ب، ويساهم في تكوين الدم، وتخليق الأحماض الأمينية والبريدينات والبيورينات والأحماض النووية، واستقلاب الكولين. عند استخدامه مع فيتامين ب12 (سيانوكوبالامين)، يحفز عملية تكوين الدم.

الاستخدام

لعلاج الكلاب والحيوانات ذات الفراء من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، والوقاية من المرض، وفي حالة فقدان الدم أو الأهبّة النزفية.

الجرعات

يتم حقن الدواء عضليًا في الفخذ أو الرقبة:

الكلاب وحيوانات الفراء (حسب وزن الجسم)	
الوزن، كجم	الجرعة، مل
حتى 2,5	0,5
10-2,5	1
أكثر من 10	2

عند الحاجة، يتم إعطاء الدواء للحيوانات الصغيرة مرة أخرى بعد 10-12 يومًا بنفس الجرعة.

التحذيرات

لا يُسمح بحقن أكثر من 1,5 مل من الدواء في نفس المكان للحيوانات الصغيرة، وأكثر من 5 مل للحيوانات الكبيرة. يسبب إعطاء الدواء عن طريق الحقن تصبغًا مؤقتًا للأنسجة في موضع الحقن. عدم التوافق

لا يُخلط مع محاليل أخرى!

لا يجوز استخدام فيروم+ بالتزامن مع المضادات الحيوية من مجموعة التتراسيكلين واللينيسلايد، إذ تتشكل مركبات معقدة استقلابية تُقلل من امتصاص الحديد والمضادات الحيوية. عند الاستخدام المتزامن مع الهرمونات القشرية السكرية (الكورتيكوستيرويدات)، يُحتمل زيادة تحفيز تكوين كريات الدم الحمراء.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان (2). بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 14 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المكونات الفعالة:

بوتافوسفان — 100 ملغ؛

سيانوكوبالامين — 0,05 ملغ؛

نيكوتيناميد — 5 ملغ؛

هيدروكلوريد L- كارنتين — 21 ملغ.

المواد المساعدة: بوتانول، هيدروكسيد الصوديوم، فريسيانيد البوتاسيوم (III)، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف ATC QA12C - مكملات معدنية أخرى. QA12CX91 - بوتافوسفان.

إن L-CYN هو دواء مركب، يعتمد تأثيره على خصائص المواد الفعالة: بوتافوسفان، وفيتامينات المجموعة ب (فيتامين ب12 وفيتامين ب3 (النياسين))، والمادة الشبيهة بفيتامين المجموعة ب (إل-كارنتين). يتمتع هذا الدواء بخصائص منشطة، ويحسن عمليات الأيض والتجدد، ويحفز أيض البروتين والكربوهيدرات والدهون، ويزيد من مقاومة الجسم للعوامل البيئية الضارة والالتهابات والسموم، ويعزز نمو وتطور الحيوانات، بما في ذلك الدواجن.

إن بوتافوسفان هو مركب فوسفوري عضوي يؤثر على عدد من عمليات الامتصاص في جسم الحيوان، ويحفز تخليق البروتين، ويسرع نمو الحيوان وتطوره، ويقوم بتنطيع وظائف الكبد، ويزيد من مقاومة الجسم غير النوعية، ويعزز تكوين أنسجة العظام. في المواقف العصبية، يعيد بوتافوسفان مستوى هرمون التوتر الكورتيزول إلى طبيعته، مما يحسن استخدام الجلوكوز في الدم ويساعد على الحفاظ على موارد الطاقة في الجسم.

إن سيانوكوبالامين (فيتامين ب12) كمستقلب، ينشط استقلاب الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ويعزز تخليق المجموعات غير المستقرة في تكوين الكولين والميثيونين والأحماض النووية والكرياتين، إلى جانب تعزيز تراكم المركبات ذات المجموعات السلفهيدريل في كريات الدم الحمراء. كعامل نمو، يحفز وظيفة نخاع العظم، وهو أمر ضروري لتكوين كريات الدم الحمراء الطبيعية.

يعزز نيكوتيناميد (فيتامين ب3 (النياسين)) إنتاج نيكوتيناميد أدينين ثنائي نوكليوتيد الفوسفات (NADP) وثلاثي نوكليوتيد الأدينين وأميد النيكوتين (NAD)، مما ينظم مسار معظم تفاعلات الأكسدة والاختزال، ويضمن تطبيع العديد من أنواع الأيض (بما في ذلك أيض الطاقة). يشارك في أيض الدهون والبروتينات والأحماض الأمينية والبيورينات، وفي تنفس الأنسجة، وفي تحليل الجليكوجين. إن إل-كارنتين هو مادة طبيعية مرتبطة بفيتامينات ب (ما يسمى بفيتامين ب11)، وهو ناتج عن التخليق الحيوي لليسين والميثيونين، ويؤدي وظائف مهمة في الجسم، منها: إزالة السموم، وتحفيز عمليات الأيض، وتقوية الأوعية الدموية، وتحفيز تجديد الأنسجة.

الاستخدام

يُستخدم هذا الدواء في الكلاب والقطط والأرانب والحيوانات ذات الفراء عند اضطرابات التمثيل الغذائي ونقص الفيتامينات، كمحفز ومنشط لزيادة مقاومة الجسم للتسمم.

الجرعات

يتم إعطاؤه للحيوانات عضلياً أو تحت الجلد أو وريدياً (بطيء) مرة واحدة يوميًا لمدة 4-5 أيام بالجرعات التالية:

النوع من الحيوانات	جرعة الدواء لكل حيوان، مل
الكلاب والقطط والأرانب وحيوانات الفراء	2,5-0,5

في الحالات الحرجة وعند الضعف الشديد للحيوانات، يُستخدم الدواء بنصف الجرعة.

إذا لزم الأمر، تتم إعادة العلاج بنفس الجرعات بعد 8-15 يومًا.

مدة الصلاحية

سنتان اثنتان (2)، بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



الوصف

محلول شفاف يتراوح لونه بين الأحمر والأحمر مع لمسة قرمزية أو وردية.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

نوكليونات الصوديوم - 1 ملغ.

المواد المساعدة: مجمع مواد نشطة بيولوجيًا*، ميثيل بارابين، بروبيل بارابين، بروبيلين جليكول، ماء للحقن.

*يحتوي مجمع المواد النشطة بيولوجيًا على:

الفيتامينات والمواد الشبيهة بالفيتامينات - D-بيوتين، إرغوكالسيفرول، كلوريد الكولين، حمض الفوليك، ميثادايون، ميو-إنوزيتول، نياسيناميد، حمض النيكوتينيك، حمض بارا أمينوبنزويك، حمض D-بانثوثيك، هيدروكلوريد البيريدوكسال، هيدروكلوريد البيريدوكسين، أسيتات الريتينول، ريبوفلافين، فوسفات ألفا توكوفيرول، هيدروكلوريد الثيامين؛

الأحماض الأمينية - إل-ألانين، هيدروكلوريد إل-أرجينين، حمض الأسبارتيك، إل-سيسيتين، إل-سيسيتين، إل-جلوتامين، حمض الجلوتاميك، جلايسين، إل-هستيدين، إل-إيزوليوسين، إل-ليوسين، إل-ليسين، إل-ميثيونين، إل-فينيل ألانين، إل-برولين، إل-سيرين، إل-ثريونين، إل-تريبتوفان، إل-تريوسين، إل-فالين، هيمسلفات الأدينين، أدينين، أدينوسين، هيدروكسي برونين؛

المعادن - كلوريد الكالسيوم، ترات الحديد، كبريتات المغنيسيوم، كلوريد البوتاسيوم، أسيتات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، فوسفات أحادي الصوديوم؛ المكونات الأخرى، بما في ذلك المكونات النشطة بيولوجيًا: ريبوز منقوص الأكسجين، ريبوز، جلوكوز، كوليسترول، جلوتاثيون، هيبوكسائين، حمرة فينول، توين 80، ثايمين، يوراسيل، زانثين.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف QL03 ATC vet - منبهات مناعة. يتمتع الدواء بتأثير مكثف ومحقق للمناعة ومنشط عام؛ ويحسن عملية الأيض، والتمثيل الغذائي الخلوي، وتجديد الأنسجة، بفضل احتوائه على نوكليونات الصوديوم ومجموعة متوازنة من المعادن والأحماض الأمينية والفيتامينات.

إن نوكليونات الصوديوم هو محقق تفاعلات كريات الدم البيضاء، ومحقق التمثيل الغذائي الخلوي، والتبادل النووي في جسم الحيوان، خاصةً عند ضعف المناعة. كما أنه يتمتع بنشاط مضاد للالتهابات، ويقوم بتنشيط تراكم الصفائح الدموية المتزايدة.

تعتمد التأثيرات العلاجية الدوائية للدواء على الآليات التالية: تحفيز عمليات التمثيل الغذائي الخلوي، وزيادة التخليق الحيوي للأحماض النووية الداخلية والبروتينات والإنزيمات المحددة؛ وزيادة النشاط الانقسامى لخلايا نخاع العظام، وتسريع عمليات التجديد؛ وزيادة إمداد الخلية بالطاقة عن طريق تحفيز تخليق المركبات الكبيرة للطاقة، مثل أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)؛ وتنشيط نشاط مخلقة أكسيد النتريك، وتنشيط العمليات التأكسدية في أغشية الخلايا، وتنشيط أغشية الخلايا، وتحسين عمليات الأكسدة والاختزال في الأنسجة؛ وزيادة إنتاج الإنترفرون وتحفيز الحماية المضادة للفيروسات؛ وتنشيط الجهاز النخامي الكظري مع زيادة مستوى الهرمونات القشرية السكرية (الكورتيكوستيرويد).

الاستخدام

يُستخدم هذا الدواء كمنشط ضمن مجموعة من الإجراءات العلاجية في علاج الحيوانات ذات الفراء، والكلاب، والقطط. يتم استخدامه لعلاج فقر الدم، ونقص الفيتامينات، والأمراض المعدية والطفيلية، وأمراض الجهاز التناسلي، ولتحفيز الرغبة الجنسية، وكذلك في حالة التسمم وفي فترة ما بعد الجراحة؛ كمقوّم عام ذي غرض وقائي أثناء تحضير الحيوانات للمعارض والمسابقات والنقل.

يُستخدم هذا الدواء في الحيوانات الصغيرة لتعزيز نموها وتطورها، وفي فئات أخرى من الحيوانات المنهكة والضعيفة.

الجرعات

في علاج الأبقار والخيول، يتم إعطاء الدواء بالحقن تحت الجلد أو بالحقن العضلي أو الوريدي. من الممكن استخدامه عن طريق الفم مع مياه الشرب.



الجدول رقم 1 جرعة الدواء لعلاج الكلاب والقطط والحيوانات ذات الفراء والطيور الزينة

مسار العلاج	الجرعات	الغرض
10-7 مرات بفواصل زمني قدره 24 ساعة	الجرعات: 1,0-0,5 مل/كجم من وزن الجسم	في حالات التسمم، والأمراض البكتيرية والفيروسية؛ وفي الفترة ما بعد الجراحة.
مرتين، في اليوم السابق للعلاج، ومرة أخرى في اليوم التالي للعلاج		عند علاج الحيوانات من الديدان الطفيلية
في بداية الشهرين الأول والثاني من الحمل، في دورات من 10 حقن مع فاصل زمني قدره 24 ساعة		أثناء الحمل لتحسين حالة وتطور الأجنة
10 حقن بفواصل زمني قدره 24 ساعة مباشرة بعد الولادة		في فترة الرضاعة لتحسين جودة الحليب
في دورات من 5 حقن بفواصل 24 ساعة، ابتداءً من الشهر الثاني من العمر. يمكن تكرار الدورات شهرياً حتى عمر 6 أشهر		لتحسين نمو الحيوانات الصغيرة
3 حقن بفواصل زمني قدره 24 ساعة لمدة 3 أيام قبل الحدث المقرر		لأغراض وقائية أثناء تحضير الحيوانات للمعارض والمسابقات والنقل
في دورات من 10 حقن بفواصل 24 ساعة، يمكن تكرار الدورات مرة كل 3 أشهر		في طب الشيفوخة لتحسين نوعية الحياة والعمليات الأيضية

مدة الصلاحية

18 شهراً، بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 7 أيام بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية.



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المواد الفعالة:

سيروفلوكساسين (على شكل هيدروكلوريد سيروفلوكساسين) - 5 ملغ؛ ديكساميثازون (على شكل ديكساميثازون فوسفات الصوديوم) - 1 ملغ. المواد المساعدة: هيدروكسيد الصوديوم، حمض اللاكتيك، كلوريد البنزالكونيوم، تريلون ب، كلوريد الصوديوم، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

إن سيرونورم هو دواء مركب يتميز بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات بفضل تأثير سيروفلوكساسين وديكساميثازون. ينتمي سيروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكينولونات. تعتمد آلية عمل سيروفلوكساسين على تثبيط إنزيم الجيريز للحمض النووي للبكتيريا، مما يمنع عملية تضاعف الحمض النووي، بالإضافة إلى تعطيل سلامة غشاء الخلية البكتيرية، مما يؤدي إلى موتها. يزيل هيدروكلوريد السيروفلوكساسين البلازميدات R- بسرعة، مما يمنع تطور مقاومة الكائنات الدقيقة للدواء. الدواء فعال ضد بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام. ديكساميثازون هو الهرمون القشري السكري (الكورتيكوسترويد) الاصطناعي ذو تأثير مضاد للالتهابات والحساسية والإفرازات، يتميز ببداية مفعول سريعة ومدة قصيرة.

يثبت ديكساميثازون أغشية الخلايا، ويقلل نفاذية الشعيرات الدموية، وله تأثير مضاد للإفرازات من خلال تثبيته لأغشية اليبوسومات. عند الاستخدام الموضعي، يكون الامتصاص الجهازى منخفضاً. بعد تقطيره في العين، يتغلغل ديكساميثازون جيداً في ظهارة القرنية والملتحمة؛ وفي الوقت نفسه، تُلاحظ تركيزات علاجية في سائل العين؛ وفي حالة التهاب أو تلف الغشاء المخاطي للعين، تزداد سرعة الاختراق. مدة مفعوله المضاد للالتهابات بعد تقطير قطرة واحدة من المحلول تراوح بين 4 و8 ساعات.

الاستخدام

علاج القطط والكلاب:

من الأمراض المعدية والالتهابية في العين والأذن الناتجة عن الكائنات الدقيقة الحساسة للسيروفلوكساسين؛ من الأمراض التحسسية في الجزء الأمامي من العين المصحوبة بعدوى بكتيرية؛ للوقاية من التهابات العين والأذن ما بعد الجراحة وللعلاج.

الجرعات

يجب تقطير الدواء في كيس الملتحمة أو قناة الأذن، قطرة أو قطرتين، 2-3 مرات يوميًا.

مدة العلاج هي 5-7 أيام عادةً. إذا لزم الأمر، يمكن تمديد مدة العلاج إلى أسبوعين.

في حال وجود إفرازات قيحية شديدة، أو إفرازات أخرى شديدة، أو قشور (خشارة)، يتم إجراء المعالجة الصحية الأولية للعينين / القناة السمعية الخارجية: تُوضع 3-4 قطرات من الدواء، ثم تتم إزالة الإفرازات بمسحات شاش (تُستخدم مسحات معقمة للعينين). بعد ذلك، يتم تقطير قطرة أو قطرتين من الدواء.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



الوصف

محلول شفاف خالي من الجزيئات المرئية.

المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

سيروفلوكساسين (على شكل هيدروكلوريد سيروفلوكساسين) - 5 ملغ.

المواد المساعدة: هيدروكسيد الصوديوم، حمض اللاكتيك، كلوريد البنزالكونيوم، تريلون ب، كلوريد الصوديوم، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف ATC vet QS03 - أدوية بيطرية تُستخدم في طب العيون والأذن. QS03AA07 - سيروفلوكساسين.

إن CIPROX (سيبروكس) هو دواء ذو خصائص قوية مضادة للميكروبات بفضل تأثير السيروفلوكساسين. ينتمي سيروفلوكساسين إلى مجموعة الفلوروكينولونات.

مؤشرات الاستخدام

علاج الكلاب والقطط المصابة بالأمراض المعدية والالتهابية في العين وملحقاتها (التهاب الملتحمة الحاد والمزمن، التهاب القرنية والملتحمة، التهاب القرنية، قرح القرنية وتآكلاتها، التهاب القرنية، التهاب القرنية والجسم الهدبي، التهاب الجفن) وفي الأذنين (التهاب الأذن الوسطى الحاد والمزمن بمختلف مسبباته) الناتجة عن الكائنات الدقيقة الحساسة للسيروفلوكساسين:

- الوقاية من الأمراض المعدية بعد الإصابات أو تعرض العين لأجسام غريبة ومواد عدوانية؛
- عند العمليات التحسسية الحادة في الجزء الأمامي من العين، والمعقدة بعدوى بكتيرية؛
- للوقاية من التهاب العين والأذن وعلاجه قبل وبعد الجراحة.

طريقة الإعطاء والجرعة

يتم تقطير الدواء في كيس الملتحمة أو قناة الأذن، قطرة أو قطرتين، 2-3 مرات يوميًا، حسب درجة الإصابة.

مدة العلاج هي 5-7 أيام عادةً. إذا لزم الأمر، يمكن تمديد فترة العلاج حتى أسبوعين.

في حال وجود إفرازات قيحية شديدة، أو إفرازات أخرى شديدة، أو قشور، يجب إجراء المعالجة الصحية الأولية للقناة السمعية الخارجية والعيون (تُستخدم مسحات معقمة للعيون) باستخدام مواد تنظيف متخصصة، وبعد ذلك تقطير قطرة أو قطرتين من الدواء. شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية

24 شهرًا.

يجب استخدام الدواء خلال 28 يومًا بعد فتح القارورة وأول استخدام له، بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المواد الفعالة:
إيفيرميكتين - 1 ملغ؛ كلوتريمازول - 10 ملغ؛ فلوروفينيكلول - 2,5 ملغ؛
بيتامتازون (على شكل ديبريونات) - 1 ملغ.
المواد المساعدة: ثاني ميثيل السلفوكسيد، كحول إيثيلي، بولي إيثيلين جليكول، بروبيلين جليكول.

الخصائص الدوائية

يتميز أوتوفلوكس بتأثيرات مضادة للطفيليات والفطريات والميكروبات، بالإضافة إلى خصائص مضادة للالتهابات والحكة. يعتمد التأثير الدوائي لأوتوفلوكس على خصائص إيفيرميكتين، وكلوتريمازول، وفلوروفينيكلول، وبيتامتازون.
ينتمي إيفيرميكتين إلى مجموعة الأفرميكتين التي تنتجها الكائنات الدقيقة من فصيلة *streptomyces avermitilis*. يُعزز الإيفيرميكتين في الديدان الأسطوانية والقراد والحشرات ويرقات ذباب الخيل ارتباط حمض غاما أمينوبيوتيريك بمستقبلات خاصة على النهايات العصبية للطفيلي، مما يُعيق تعصيبه، ويسبب شلله وموته. يؤدي الإيفيرميكتين إلى موت الأنواع التالية من الطفيليات الخارجية: *Otodectes*, *Haematopinus*, *Sarcoptes*, *Demodex*, *Gastrophilus*, و *Hypoderma*, *Linognathus*, *Damalina*, *Solenopotes*, *Hematobia*, *Psoroptes*, *Oestrus*, *Melophagus*, وغيرها.
ينتمي كلوتريمازول إلى مشتقات الإيميدازول. يرتبط تأثير كلوتريمازول بتعطيل تخليق الإرغوستيرول، وهو جزء من غشاء الخلية الفطرية. نتيجة لذلك، تتغير بنية الأغشية وخصائصها، ويُلاحظ انحلال الخلايا. الفطريات الجلدية، وفطريات الخميرة، وفطريات العفن، والوتدية المستدقة حساسة للكلوتريمازول. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع كلوتريمازول بتأثير مضاد للميكروبات على بكتيريا إيجابية الغرام وسلبية الغرام.
إن الفلوروفينيكلول مشتق من الثيامفينيكول، حيث تُستبدل فيه مجموعة الهيدروكسيل بذرة فلور، مما يحدد نشاطه المضاد للبكتيريا ضد البكتيريا المنتجة للإنزيم أسيتيل ترانسفيراز. يتمتع الفلوروفينيكلول بتأثير مضاد للبكتيريا على بكتيريا إيجابية الغرام وبكتيريا سلبية الغرام.
ينتمي بيتامتازون إلى مجموعة الهرمونات القشرية السكرية الاصطناعية (الكورتيكوستيرويدات)، وله تأثيرات مضادة للالتهابات، ومضادة للحكة، ومضادة للحساسية، ومضادة للتكاثر.

الاستخدام

دواء أوتوفلوكس مخصص لعلاج الحيوانات الصغيرة غير المنتجة (الكلاب والقطط وأرانب الزينة) التي تُعاني من التهابات الأذن من مسببات مختلفة، بما في ذلك تلك التي تسببها الطفيليات الخارجية و / أو المعقدة بسبب العدوى الفطرية أو البكتيرية.

الجرعات

عند علاج الحيوانات المصابة بالتهاب الأذن، يتم تنظيف صوان الأذن والقناة السمعية أولاً من شمع الأذن والإفرازات والقشور (الخشارة). بعد ذلك، يتم تقطير الدواء في كل أذن بالجرعة الموضحة في الجدول مرتين يوميًا لمدة 10-5 أيام، حسب الأعراض السريرية.
الجدول رقم 1 الجرعات

وزن الحيوان، كجم	عدد القطرات (في أذن واحدة)
حتى 1	1
1-5	2
5-10	3
10-15	4
أكثر من 15	5

لتحسين معالجة الأذن، يجب طي صوان الأذن طويلاً إلى نصفين وتدليك قاعدته برفق.

مدة الصلاحية

24 شهراً. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يوماً بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

الجديد



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

توبراميسين - 3 ملغ؛

المواد المساعدة: كلوريد البنزالكونيوم، كلوريد الصوديوم، كبريتات الصوديوم، تيلوكسابول، حمض البوريك، حمض الكبريتيك، هيدروكسيد الصوديوم، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف QS01 ATC vet - أدوية بيطرية تُستخدم في طب العيون. QS01AA12 - توبراميسين.

إن توبراميسين هو مضاد حيوي سريع المفعول من مجموعة الأمينوغليكوزيد. يعمل كمبيد للجراثيم عن طريق تثبيط تخليق البروتين على مستوى الريبوسومات وتعطيل سلامة الغشاء الخارجي للبكتيريا.

إن توبراميسين فعال في علاج الأمراض التي تسببها البكتيريا إيجابية الغرام (*Staphylococcus aureus*، *S. epidermidis*، *Streptococcus pneumoniae*، *Escherichia coli*، *Pseudomonas aeruginosa*، *Enterobacter aerogenes*، *Proteus mirabilis*، *Morganella morganii*، ومعظم سلالات *P. vulgaris*، *Haemophilus influenzae*، *H. aegyptius*، *Moraxella lacunata*، *Acinetobacter calcoaceticus*، وبعض أنواع *Neisseria*).

الاستخدام

علاج الكلاب والقطط المصابة بالأمراض المعدية والالتهابية في العين وملحقاتها (التهاب الملتحمة البكتيري والتحسسي، التهاب كيس الدمع، متلازمة العين الكرزية والعين الحمراء) الناجمة عن الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض الحساسة للتوبراميسين.

الجرعات

بالنسبة للقطط ذات أي وزن، الجرعة هي قطرة أو قطرتين في كيس الملتحمة للعين المصابة (في كيسي الملتحمة للعينين المصابتين) كل 12 ساعة أو كل 4 ساعات في حالة العدوى الحادة.

بالنسبة للكلاب ذات أي وزن، الجرعة هي قطرة أو قطرتين في كيس الملتحمة للعين المصابة (في كيسي الملتحمة للعينين المصابتين) كل 12 ساعة أو كل 4 ساعات في حالة العدوى الحادة.

مدة العلاج: 10-15 أيام. يجب ألا تلمس القطارة أي سطح، بما في ذلك سطح عين حيوانكم الأليفة.

الشكل الصيدلاني

قوارير بوليمرية ذات قطارة سعة 5 و10 مل.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

مدة صلاحية الدواء

سنتان اثنتان.

بعد فتح القارورة: 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان مظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

لاستخدام في الطب البيطري!



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:
بروبوفول - 10,0 ملغ.

المواد المساعدة: ماركوفول 15 هيدروكسي ستيرات، بيروكربيتيت الصوديوم، تريلون ب، كحول بنزيلي، ماء للحقن.
الخصائص الدوائية

رمز تصنيف QN01AX10 ATC vet - بروبوفول.

ينتمي دواء RELAX (ريلاكس) إلى مجموعة أدوية التخدير غير الاستنشاقية، وهو مهدئ ذو مفعول فائق القصر. البروبوفول، أي المادة الفعالة في دواء RELAX (ريلاكس)، يتميز بدرجة عالية من المحبة للدهون، ويخترق الحاجز الدموي الدماغي بسهولة، ويُحدث تأثيراً تخديرياً سريعاً وقصيراً المدى مع ظهور أعراض طفيفة لمرحلة الإثارة. في غضون 30-60 ثانية، يحدث نوم ناتج عن تأثير البروبوفول غير النوعي على القنوات الأيونية لأغشية الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي. تصل مدة التخدير بعد جرعة واحدة من الدواء بالجرعة الموصى بها إلى 8 دقائق. عند الحفاظ على التخدير بالوضع المعتاد، لا يُلاحظ تراكم ملحوظ للدواء. بعد الإعطاء الوريدي، يرتبط البروبوفول ببروتينات البلازما (98%)، ويُستقلب بشكل رئيسي في الكبد عن طريق الاقتران مع تكوين مستقلبات غير نشطة يتم إخراجها من جسم الحيوان بشكل رئيسي عن طريق البول (حوالي 88%).

يتراوح عمر النصف في المرحلة الأولية السريعة من توزيع البروبوفول بين 1 و 8 دقائق، وفي المرحلة البطيئة من التوزيع بين 30 و 70 دقيقة، وفي مرحلة الإخراج بين 4 و 23 ساعة.

يُستخدم البروبوفول مع الأتروبين، والغليكوكورتيكويدات، والأسيسبرومازين، والزلازين، والكيثامين، والأوكسي مورفون، والهالوثان، والإيزوفلوران. لم يُلاحظ أي تعارض دوائي.

الاستخدام

يُستخدم دواء RELAX (ريلاكس) في الكلاب والقطط للتخدير العام قصير المدى (خاصةً عند الحاجة إلى فترة الخروج القصيرة من التخدير)، وللتخدير التمهيدي وللحفاظ على التخدير الأساسي. يمكن استخدام هذا الدواء للتخدير التمهيدي أثناء الولادة القيصرية لدى الكلاب.

يتم إعطاء دواء RELAX (ريلاكس) للحيوانات في الحالات التالية: للتخدير قصير المدى خلال الإجراءات الجراحية والتشخيصية قصيرة الأمد (حتى 5 دقائق) - مرة واحدة؛ وللتخدير التمهيدي والحفاظ على التخدير الأساسي عن طريق حقن إضافية، وللتخدير التمهيدي أثناء التخدير الاستنشاقية.

الجرعات

التخدير التمهيدي

من أجل التخدير القصير المدى، يتم إعطاء RELAX (ريلاكس) وريدياً بجرعة محسوبة لوزن الحيوان، مرة واحدة لمدة تتراوح بين 10 و 60 ثانية حتى ظهور التأثير المخدر.

وردت الجرعات الموصى بها حسب وزن كل حيوان في الجدول رقم 1. في الممارسة العملية، لتحقيق عمق التخدير المطلوب، يجب زيادة الجرعة الإجمالية بعناية مع الأخذ في الاعتبار ما يلي: الاستجابة السريعة، على سبيل المثال، عن طريق إعطاء ¼ الجرعة المحسوبة، مع فاصل زمني قصير (20-30 ثانية) لتقييم تأثير كل جرعة لاحقة على عمق التخدير والمؤشرات الفسيولوجية.

الجدول رقم 1 الجرعات

النوع من الحيوانات	النوع من التخدير	جرعة دواء XALER (ريلاكس)، مل / كغم من وزن الحيوان
الكلاب	التخدير العام القصير المدى بدون تخدير تمهيدي	
	مع تخدير تمهيدي بدون ناهضات α2	0,65 مل (6,5 ملغ من بروبوفول)
	مع تخدير تمهيدي بناهضات α2 (زلازين، ميديتوميدين)	4,0 مل (4 ملغ من بروبوفول)
القطط	التخدير العام القصير المدى بدون تخدير تمهيدي	
	مع تخدير تمهيدي بدون ناهضات α2	0,8 مل (8 ملغ من بروبوفول)
	مع تخدير تمهيدي بناهضات α2 (زلازين، ميديتوميدين)	6,0 مل (6 ملغ من بروبوفول)

الحفاظ على التخدير باستخدام دواء RELAX (ريلاكس)

للتخدير العام باستخدام RELAX (ريلاكس)، قد تختلف جرعات الصيانة اختلافاً كبيراً بين الحيوانات. يُعطى الدواء بجرعات صغيرة، حوالي 0,1 مل / كغم من وزن الحيوان، عند انخفاض ملحوظ في تأثير التخدير. يمكن إعطاء جرعات إضافية كلما دعت الحاجة، بعد انتظار 20-30 ثانية لتقييم تأثير الجرعة السابقة. تشير التجربة إلى أن الجرعات من 0,125 إلى 0,25 مل / كغم من وزن الحيوان تحافظ على التخدير لمدة 5 دقائق تقريباً.



الحفاظ على التخدير عن طريق التخدير الاستنشاق

قبل التخدير الاستنشاق، يُستخدم دواء RELAX (ريلاكس) للتخدير التمهيدي بنفس جرعات التخدير القصير المدى، ولكن قد يلزم تركيز أولي أعلى من غاز التخدير مقارنةً باستخدام الباربيتورات للتخدير التمهيدي.

موانع الاستخدام

زيادة حساسية الحيوان الفردية لمكونات الدواء (كما في ذلك في التاريخ المرضي)، وأمراض الجهازين القلبي الوعائي والتنفسي الشديدة اللا تعويضية.

لا يُستخدم RELAX (ريلاكس) للتخدير لدى الإناث الحوامل إذا كان الهدف هو الحفاظ على النسل!

يجب استخدام الدواء بحذر في الحيوانات المنهكة، والمصابة بنقص حجم الدم، وأمراض الكلى والكبد والرتة.

لا يُستخدم في الحيوانات المنتجة!

الآثار الجانبية

عند استخدامه وفقاً لتوصيات النشرة الداخلية، عادةً ما يكون جيد التحمل من قبل الحيوانات. قد يسبب استخدام هذا الدواء، كما هو الحال مع أدوية التخدير العام الأخرى، انقطاع النفس القصير المدى، وانخفاض ضغط الدم، وبطء القلب لدى الحيوان. في هذه الحالات، يتم اللجوء إلى التهوية الاصطناعية للرئتين، ووصف علاج الأعراض والعلاج لتعطيل آلية تطوّر المرض.

التحذيرات

لا تجميد!

لا تخلط الدواء مع أدوية أخرى في نفس المحقنة!

يتوافق الدواء مع الأدوية المستخدمة في التخدير التمهيدي، ومرخيات العضلات، ومخدر الاستنشاق، ومسكنات الألم؛ ولم تتم ملاحظة أي تفاعلات دوائية غير مرغوب فيها.

مدة الصلاحية

24 شهراً بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يوماً بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

فينيبوت 100 ملغ.

المواد المساعدة: بروبيلين جليكول، ميثيل بارابين، بروبيل بارابين، هيدروكسي إيثيل السليلوز، نكهة، سكروز، ماء نقي.

الخصائص الدوائية

رزم تصنيف QN06BX ATC vet - منشطات نفسية أخرى ومنشطات الذهن. QN06BX22 - فينيبوت.

من الفينيبوت الذي هو جزء من الدواء، هو مشتق فينيلي من حمض غاما أمينوبيوتيريك وفينيثيلامين. يؤثر إيجاباً على العمليات الأيضية في الخلايا العصبية للدماغ.

يُظهر فينيبوت تأثيراً منشطاً للذهن، كما أنه له تأثيراً مضاداً (مهدئاً) للقلق (بفضل كونه مشتقاً من حمض غاما أمينوبيوتيريك). لا يؤثر على المستقبلات الكولينية والأدرينالية. يعزز عمليات التثبيط المرتبطة بحمض غاما أمينوبيوتيريك، ويؤثر على الحالة الوظيفية من خلال تطبيع عملية الأيض وتنشيط الدورة الدموية الدماغية.

له تأثير واضح في تصحيح التوتر، كما أنه يعيد عمليات الإثارة والتثبيط في الجهاز العصبي المركزي إلى طبيعته. يُمتص الدواء بسرعة بعد تناوله عن طريق الفم، ويتغلغل جيداً في جميع أنسجة الجسم، بما في ذلك الحاجز الدموي الدماغي. يتم استقلاب 80-95% من الدواء في الكبد إلى نواتج أيضية غير نشطة، بينما يتم إخراج 5% منه عن طريق الكلى دون تغييره.

الاستخدام

يتم وصف دواء ANTISTRESS (أنتيسستريس) لتخفيف الإثارة وتصحيح الاضطرابات السلوكية النفسية المنشأ لدى القطط والكلاب التي تعاني من التوتر، والرهاب، والعدوان دون أسباب واضحة، وعند زيادة الإثارة الجنسية (بالتزامن مع موانع الحمل)، وكذلك للوقاية من دوار الحركة.

الجرعات

تُعطى قطرات ANTISTRESS (أنتيسستريس) للقطط والكلاب عن طريق الفم على جذر اللسان مرتين يومياً بالجرعات التالية:

للقطط - قطرة واحدة من الدواء (4 ملغ من فينيبوت) لكل 1 كغم من وزن الحيوان؛ للكلاب - قطرتان من الدواء (8 ملغ من فينيبوت) لكل 1 كغم من وزن الحيوان.

مدة استخدام الدواء هي 10-15 يوماً. في حال ظهور علامات إثارة شديدة واضطرابات سلوكية نفسية المنشأ (عدوانية، خوف، فرط نشاط، سلوك جنسي مفرط)، يمكن تمديد فترة العلاج إلى 20 يوماً.

إذا ظهرت على الحيوانات علامات الإثارة و / أو الاضطرابات السلوكية مجدداً، يتم إعادة استخدام الدواء بنفس الجرعات، وفقاً لنفس الخطة. للوقاية من الإجهاد (عند النقل، تغيير البيئة، انفجارات الألعاب النارية، مغادرة المالك، المشاركة في المعارض والمسابقات)، يتم استخدام الدواء قبل 3-5 أيام من الحدث القادم وخلال 1-4 أيام من انتهائه.

للوقاية من دوار الحركة، يُستخدم مرة واحدة بالجرعات المذكورة أعلاه قبل ساعة إلى ساعتين من موعد بدء نقل الحيوانات. في حال ظهور علامات واضحة لدوار الحركة (قيء)، يكون الدواء غير فعال.

لتصحيح السلوك المصاحب لزيادة النشاط الجنسي، تُستخدم قطرات ANTISTRESS (أنتيسستريس) بنفس الجرعات مع موانع الحمل. تعتمد مدة الاستخدام على حساسية الحيوانات الفردية ودرجة إثارته.

مدة الصلاحية

24 شهراً. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يوماً بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

PHYTOCAT (فيتوكات)

محلول فموي

قوارير سعة 100 مل



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على 0,5 مل من المستخلص المائي (1:10) من خليط من المواد الخام النباتية الطبية: عشبة عصا الراعي (بطباط الطيور) 12,5 ملغ؛ من عشبة كنبث الحقول 7,5 ملغ؛ أوراق عنب الدب 5,0 ملغ؛ عشبة العقدة الجبلية 25 ملغ؛ المواد المساعدة: بروبيلين جليكول، ميثيل بارابين، بروبيل بارابين، ماء نقى

الخصائص الدوائية

تعتمد آلية عمل دواء فيتوكات على فعالية المواد النشطة بيولوجيًا من النباتات الطبية في تركيبه. يتميز دواء فيتوكات بتأثيرات مدرة للبول، ومزيلة للأحماض، ومضادة للالتهابات؛ كما أنه يذيب الحصوات (باستثناء الأكسالات). يحتوي عشبة عصا الراعي (POLYGONUM AVICULARE L.)، بطباط الطيور) على مجموعة من الفلافونويدات، والعفص، والفيتامينات، ومركبات حمض السيليسيك؛ وله خصائص مدرة للبول؛ ويعزز إخراج الحصوات في حالات حصوات المسالك البولية؛ وله تأثير مضاد للالتهابات؛ ويحسن حالة جدران الشعيرات الدموية. تحتوي عشبة كنبث الحقول (EQUISETUM ARVENSE L.) على أشكال قابلة للذوبان في الماء من حمض السيليسيك (حتى 25%) ومجموعاته مع مركبات عضوية؛ فلافونويدات؛ صابونينات تريتينين؛ كما أن له تأثير مدر للبول؛ وتأثير مرقق؛ وتأثير واضح مضاد للالتهابات. يحتوي عنب الدب (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI L.) على جليكوسيدات، ميثيل أربوتين، أربوتين، هيدروكينون، هالوتانين؛ أحماض اليورسوليك والفاليك والإيلاجيك؛ وله تأثير مدر للبول، ومطهر، ومضاد للالتهابات، ومزيل للأحماض، يزيد من إدرار البول، ويظهر خصائص مضادة للبكتيريا عند التفاعل القلوي للبول. تحتوي عشبة العقدة الجبلية (AERVA LANATA L.) على فلافونويدات، وسكريات متعددة، ومخاط، وأحماض عضوية، وعفص، وكومارينات، وصابونين؛ وله تأثير مدر للبول ومزيل للأحماض مصحوب بزيادة في إطلاق أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، وانخفاض محتوى اليوريا في بلازما الدم.

الاستخدام

يُستخدم دواء فيتوكات للوقاية والعلاج من متلازمة المسالك البولية، وحصوات المسالك البولية، والأمراض الالتهابية في الكلى والمثانة والمسالك البولية (التهاب الحويضة، التهاب المثانة، التهاب الإحليل) لدى القطط والكلاب.

الجرعات

لعلاج متلازمة المسالك البولية، والمراحل الأولى من حصوات المسالك البولية، والأمراض الالتهابية في الكلى والمثانة والمسالك البولية، يُستخدم الدواء مع الأدوية المسكنة للأعراض عن طريق الفم مرتين يوميًا لمدة 3 أسابيع، بالجرعات التالية:

النوع من الحيوانات	الوزن	الجرعة لحيوان واحد، مل
القطط	حتى 5 كجم	2
	أكثر من 5 كجم	4
الكلاب	حتى 5 كجم	2
	5-10 كجم	4
	أكثر من 10 كجم	8

لأغراض وقائية ومنع انتكاس المرض، يُستخدم فيتوكات عن طريق الفم بنفس جرعات العلاج، مرة واحدة يوميًا، لمدة 7-10 أيام، تتم إعادة الدورة كل 2-3 أشهر. يُمكن إضافة الدواء إلى مياه الشرب. لا توجد معلومات حول عدم توافق الدواء مع الأدوية الأخرى.

مدة الصلاحية

24 شهرًا.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

كابريجولين - 50 ميكروغرام؛

المواد المساعدة: بروبيلين جليكول ديكابريلات / ديكابرات.

الخصائص الدوائية

إن الكابريجولين، الذي هو جزء من الدواء، هو مشتق من الإرغولين، يعمل كناهض لمستقبلات الدوبامين، مما يثبط إفراز الغدة النخامية للبرولاكتين، أي الهرمون الرئيسي المحفز لتكوين الحليب. انخفاض مستويات البرولاكتين يمنع الرضاعة ويساهم في اختفاء العلامات السريرية للحمل الكاذب لدى الكلاب والقطط. بعد تناوله عن طريق الفم، يصل تثبيط إفراز البرولاكتين إلى ذروته بعد 4-8 ساعات، ويستمر لعدة أيام، حسب الجرعة. يتم إخراج الكابريجولين من الجسم على شكل نواتج أيضية، بشكل رئيسي مع البراز (60%)، وبدرجة أقل مع البول (22%).

الاستخدام

يُستخدم أنتيلاك في الكلاب والقطط لإيقاف الرضاعة وفقًا للمؤشرات السريرية (على سبيل المثال، خلال الفطام المبكر للجراء والقطط الصغيرة) ولإنهاء الحمل الكاذب.

الجرعات

يُعطى الدواء عن طريق الفم مع الطعام أو مباشرة في جذر اللسان بجرعة 0,1 مل (3 قطرات، ما يعادل 5 ميكروغرام من كابريجولين لكل 1 كغم من وزن الجسم) لكل 1 كغم من وزن الحيوان، مرة واحدة يوميًا لمدة 4-6 أيام.

موانع الاستخدام

لا يُستخدم في حالة وجود حساسية فردية تجاه الكابريجولين لدى الحيوان. لا يُستخدم في الكلاب والقطط الحوامل. لا يُستخدم في الحيوانات الإناث المرضعة خلال فترة تغذية الصغار. لا يُستخدم في الحيوانات التي تعاني من قصور كلوي أو كبدي. لا يُستخدم في الحيوانات التي تعاني من انخفاض ضغط الدم.

التحذيرات

لا يُستخدم هذا الدواء مع مضادات الدوبامين (مثل ميتوكلوبراميد)، وكذلك مع الأدوية الخافضة لضغط الدم. في حال تقويت جرعة واحدة أو أكثر من الدواء، يجب استئناف العلاج في أسرع وقت ممكن، بالجرعة المخطط لها ووفقًا لجدول الاستخدام.

الآثار الجانبية

يتم تحمل الدواء بشكل جيد بالجرعات الموصى بها. في أول يومين من استخدام الدواء، نادرًا ما قد تحدث آثار جانبية كالقيء وفقدان الشهية والخمول، وهي آثار تزول تلقائيًا ولا تتطلب إلغاء الدواء. في حالة القيء غير القابل للسيطرة، يتم إلغاء الدواء. في حالات نادرة جدًا، قد تعاني الحيوانات الحساسة لمشتقات الإرغولين من ردود فعل تحسسية في شكل حكة، وتورم، والتهاب الجلد، وشرى، والتي تختفي بعد التوقف عن تناول الدواء واستخدام مضادات الهستامين.

مدة الصلاحية

24 شهرًا. بعد فتح القارورة وأول استخدام للدواء: 28 يومًا بشرط تخزينه في مكان جاف ومظلم عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



المكونات

يحتوي 1,0 مل من مضافة الأعلاف على المواد الفعالة:
هيدروكلوريد كارنتين - 25,0 ملغ DL-ميثيونين - 10,0 ملغ
كلوريد الكولين 18,75 ملغ كبريتات المغنيسيوم 10,0 ملغ سوربيتول 200,0 ملغ
سينارين (مستخلص الخرشوف) 5,0 ملغ المواد المساعدة.

الخصائص الدوائية

إن هيباكارنيتول هو مضافة الأعلاف تجمع بين الخصائص الدوائية لمكوناتها الفردية، ولها تأثير واضح محفّز ووقائي ومفرّز للصفراء على الكبد، مما يحسّن وظائفه وأيضه، بالإضافة إلى تحسين العمليات الفسيولوجية الرئيسية.
إن هيدروكلوريد الكارنتين محفّز لعمليات الأيض، وهو ناتج عن التخليق الحيوي لليسين والميثيونين. يؤدي استخدامه إلى زيادة قدرة الجسم على التحمّل، وتحسين وظائف القلب، وزيادة كتلة العضلات بفضل تسريع عمليات الأيض في الخلايا، وتحسين تغلغل الفيتامينات والمعادن في الخلايا، وإخراج نواتج التحلل، وتقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني.
يجمع هيباكارنيتول بين الخصائص الإيجابية للميثيونين وكلوريد الكولين لتكوين إنزيمات الكبد، وهو أمر مهم لإزالة سموم الأمونيا، وزيادة كفاءة الكبد، وتجديد الأنسجة التالفة. يحمي خلايا الكبد من التأثيرات الضارة للسموم ويسرع تجديدها. يحسّن العمليات الأيضية في الكبد.
بفضل مستخلص الخرشوف والسوربيتول، يتمتع هيباكارنيتول بتأثير مفرّز للصفراء (أي يزيد من كمية الصفراء) تأثير محفّز لانقباض المرارة.
يعزّز هيباكارنيتول المناعة.

الاستخدام

لإزالة سموم الكبد، وتسريع تعافيه خلال فترات الإجهاد الشديد.
يُستخدم هيباكارنيتول بعد التخلص من الديدان.
يُوصى به كمزيج للسموم بعد أي إجهاد أو عمليات التهاوية في جسم الحيوان.
يُستخدم هيباكارنيتول لتحسين عمليات الأيض في الكبد، وذلك لتجنب الآثار السلبية للعلاج الدوائي والتسمم.

الجرعات

النوع من الحيوانات	الجرعة اليومية من القطرات لحيوان واحد	طريقة الإعطاء	مسار العلاج
الكلاب (من 10 كغم)	20	يتم تخفيف مضافة الأعلاف في كمية قليلة من الماء، ويجب إعطاؤها للحيوان بشكل فردي أو إضافتها إلى وعاء الشرب.	مرة واحدة يوميًا لمدة 7-10 أيام.
الكلاب (حتى 01 كغم)، القطط، أرانب الزينة	10	يتم تخفيفها في الحجم اليومي من الماء (وإضافتها إلى وعاء الشرب).	
القوارض الصغيرة، البغاوات، الكناري المنزلي	2-1		

مدة الصلاحية

36 شهرًا، بعد التخفيف في مياه الشرب، تُحفظ لمدة 24 ساعة.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



5 قوارير زجاجية من الليوفيليزات +
5 قوارير زجاجية من المذيب لكل علبة



المكونات

يحتوي الدواء المجفف بالتجميد (كتلة مجففة بالتجميد يتراوح لونها بين الأبيض والأصفر الفاتح) على المادة الفعالة أديميبتونين-4، بيوتان ثنائي السلفونات - 95,0 ملغ (ما يعادل 50 ملغ من كاتيون أديميبتونين).

يحتوي المحلول المذيب (سائل شفاف يتراوح لونه بين عديم اللون والأصفر الباهت) على إل-ليسين، وهيدروكسيد الصوديوم، وماء للحقن.

الخصائص الدوائية

إن الأديميبتونين (S-أدينوسيل الميثيونين) هو حمض أميني طبيعي موجود في جميع أنسجة الجسم وسوائله الحيوية تقريبًا. بشكل رئيسي، يعمل كالأزيم المساعد ومتبرع مجموعة الميثيل في تفاعلات نقل الميثيل، وهي عملية أساسية لدى الحيوانات. تُعد عملية نقل الميثيل التي يشترك فيها الأديميبتونين أساسية في تكوين النواقل العصبية في الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الكاتيكولامينات (دوبامين، نورادرينالين، أدرينالين)، وسروتونين، وميلاتونين، وهستامين. يزيد الأديميبتونين من مستويات الجلوتاثيون الكبدية لدى المصابين بتلف الكبد. إن حمض الفوليك (الفولات) وفيتامين ب12 عاملان أساسيان في عمليتي استقلاب الأديميبتونين واستعادته.

بعد الإعطاء الوريدي، تتكون الحركة الدوائية للأديميبتونين من مرحلة توزيع سريع وواضح في الأنسجة ومرحلة إخراج نهائية بنصف عمر حوالي ساعة ونصف. يكاد الامتصاص بعد الإعطاء العضلي أن يكون كاملاً (96%)، ويصل إلى أقصى تركيز في البلازما بعد حوالي 45 دقيقة من الإعطاء.

الاستخدام

يُستخدم في الكلاب والقطط في الحالات التالية:

1. ركود صفراوي داخل الكبد، بما في ذلك الحيوانات التي تعاني من التهاب الكبد المزمن ذي مسببات مختلفة؛
2. ركود صفراوي داخل الكبد لدى الحيوانات الحوامل (باستثناء القطط)؛
3. أمراض الكبد في جميع مراحل المرض، بما في ذلك تليف الكبد؛
4. التسمم بمواد سامة للكبد لتعزيز عملية الأيض؛
5. علاج التهاب الأمعاء والتهاب الكبد عند منشأ مختلف في المسار الحاد للمرض كمضاد للأكسدة؛
6. الإجهاد النفسي والجسدي على الجهاز العصبي (التوتر، الصرع، إلخ) كعامل استقرار وعامل داعم.

الجرعات

يُعطى الدواء وريدياً أو عضلياً، مرة واحدة يومياً بجرعة 0,2-0,4 مل (ما يعادل 10-20 ملغ من كاتيون الأديميبتونين) لكل 1 كغم من وزن الحيوان.

مدة العلاج بالحقن هي 5-10 أيام.

للاستخدام، يجب إذابة الدواء المجفف بالتجميد في المحلول المذيب المرفق مباشرة قبل الاستخدام. يجب أن يكون هذا المحلول شفافاً، خالياً من أي جزيئات مرئية، ويتراوح لونه بين عديم اللون والأصفر.

للإعطاء الوريدي، يجب تخفيف الجرعة المطلوبة من الأديميبتونين المذاب بالمحلول المذيب، في 200 مل من محلول كلوريد الصوديوم 0,9% أو محلول دكستروز (جلوكوز) 5%، وإجراء التسريب الوريدي البطيء على مدى 40-60 دقيقة. يمكن أيضاً تخفيف الجرعة المطلوبة من الدواء المذاب بالمحلول المذيب، في 20 مل من محلول كلوريد الصوديوم 0,9%، وحقنه وريدياً ببطء.

للإعطاء تحت الجلد أو عضلياً، لا يلزم تخفيف الجرعة المطلوبة من الدواء المذاب بالمحلول المذيب.

مدة الصلاحية

24 شهراً.

شروط التخزين

في مكان مظلم بعيداً عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة من +5 إلى +25 درجة مئوية.



المكونات

يحتوي 1 مل من الدواء على المادة الفعالة:

سرات ماروبيتانت (محسوبة على ماروبيتانت) - 10 ملغ.

المواد المساعدة: سلفوبوتيل إيثر بيتا الديكسترين الحلقي، ميتا كريسول، ماء للحقن.

الخصائص الدوائية

رمز تصنيف ATC vet 04A04 - مضادات القيء والغثيان. QA04AD90 ماروبيتانت.

إن ماروبيتانت هو المناهضة الانتقائية للغاية لمستقبلات النيوروكينين 1 (NK1) والتي تمنع عمل المادة P. أي ناقل عصبي رئيسي يشارك في عملية القيء، في الجهاز العصبي المركزي.

من خلال تثبيط ارتباط المادة P في الباحة المنخفضة، يوفر الماروبيتانت فعالية ذات طيف واسع ضد الأسباب العصبية (المركزية) والخلطية (الطرفية) للقيء، كما يظهر أيضًا نشاطًا مضادًا للقيء ضد مسببات القيء المركزية والطرفية، بما في ذلك الأيودورفين وشراب عرق الذهب (في الكلاب) والزيلازين (في القطط).

مؤشرات للاستخدام

الكلاب:

الكلاب:

— لعلاج والوقاية من الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي؛

— لمنع القيء، باستثناء القيء الناتج عن داء الحركة؛

— لعلاج الحيوانات المريضة التي تظهر عليها أعراض القيء إلى جانب التدابير الداعمة الأخرى؛

— للوقاية من الغثيان والقيء بعد الجراحة وتحسين التعافي من التخدير العام بعد استخدام ناهض المستقبلات الأفيونية μ للمورفين.

القطط:

— لعلاج والوقاية من الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي؛

— لعلاج القيء إلى جانب التدابير الداعمة الأخرى.

طرق الإعطاء والجرعات

تحت الجلد أو بالحقن الوريدي.

يتم إعطاء الدواء تحت الجلد أو عن طريق الحقن الوريدي مرة واحدة يوميًا بجرعة 1 ملغ من الماروبيتانت لكل 1 كغم من وزن الجسم (1 مل من الدواء لكل 10 كغم من وزن الجسم) لمدة 5 أيام متتالية. يجب أن يتم إعطاء الدواء عن طريق الحقن الوريدي مرة واحدة، دون خلط الدواء مع محاليل أخرى.

ولمنع القيء، يجب تناول الدواء قبل ساعة واحدة. يستمر التأثير حوالي 24 ساعة، لذا يمكن إجراء العلاج في الليلة السابقة لإعطاء الدواء الذي قد يسبب القيء، على سبيل المثال، في حالة إجراء العلاج الكيميائي.

نظرًا لأن الحركة الدوائية لها العديد من الاختلافات، ويتراكم الماروبيتانت في الجسم بعد تناول جرعة متكررة مرة واحدة يوميًا، فقد تكون الجرعة الأقل من الموصى بها كافية لبعض الأفراد، حتى عند تناول جرعات متكررة.

مدة الصلاحية

24 شهرًا.

بعد ثقب القارورة للمرة الأولى، يجب تخزين محلول الحقن "ماروكس" في الثلاجة عند درجة الحرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية واستخدامه خلال 60 يومًا من لحظة الثقب للمرة الأولى. لا يجوز ثقب السدادة أكثر من 25 مرة.

شروط التخزين

في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن متناول الأطفال، عند درجة الحرارة لا تزيد عن +30 درجة مئوية.

لا تجميد!

ENROXAN MAX (إنروكسان ماكس) - 63
 ENROXAN-100 (إنروكسان 100-) - 53
 ENROXAN-100 (إنروكسان 100-) - 62
 ENROXAN-50 (إنروكسان 50-) - 61
 FERRUM+ (فروم+) - 102
 FLOCINE-100 (فلوسين 100-) - 64, 54
 FLOCINE-300 (فلوسين 300-) - 64
 FLOXY-SPRAY (رذاذ) - 79
 FLOXY-SPRAY MAX (رذاذ) - 112
 FROST (فروست) - 90
 HEPACARNITOL (هيباكارنيتول) - 101, 128
 IVERON-10 (إيفرون 10-) - 87
 KETAFUR (كتافور) - 80
 KETOPRO-120 (كتوبرو 120-) - 81
 KETOSEPT CHLORINE (كتوسبت كلورين) - 88
 KETOSEPT IODINE (كتوسبت أيودين) - 89
 L-CYN - 103, 104
 OTC-200 L.A (أو تي سي 200- طويل المفعول) - 65
 OTO LOTION (غسول) - 113
 OTOFLOX (أوتوفلوكس) - 121
 OXYCOLIN (أوكسيكولين) - 85
 PEDISAN (بيديسان) - 91
 PHARMADOX P (فارمادوكس P) - 76
 PHARMAXIN-200 (فارماكسين 200-) - 66
 PHYTOCAT (فيتوكات) - 126
 RELAX (ريلاكس) - 123
 SPECTRAN (سبيكتران) - 67, 110
 STIMULUS (ستيمولوس) - 105, 117
 TERMONORM (تيرمونورم) - 82
 TIAM 45 (تيام 45) - 77
 TILMICON-250 (تيلميكون 250-) - 68
 TILMICON-300 (تيلميكون 300-) - 68
 TOLTRASAN-50 (تولتراسان 50-) - 83
 TRICOLIN (تريكولين) - 56
 TULAXAN (تولاكسان) - 69
 VIROCLEAN-800 (فيروكلين 800-) - 92
 VIROCLEAN-KPM (فيروكلين 93-) - 93
 VIROSAN (فيروسان) - 94, 95
 VIROSAN F (فيروسان F) - 98
 VIROSAN F2 (فيروسان F2) - 99
 VIROSAN MAX (فيروسان ماكس) - 96

اللقاحات
 BOVIMUN 4 (بوفيمون 4) - 47
 BOVIMUN LSD (بوفيمون 46 - LSD)
 BOVIMUN MAST (بوفيمون 48 - MAST)
 BOVIMUN NEO (بوفيمون نيو) - 49
 NDIGO MAX (إنديجو ماكس) - 36
 LAPIMUN GEM (لايبيمون 51 - GEM)
 LAPIMUN GEM-2 (لايبيمون 52 - GEM-2)
 LAPIMUN GEMIX (لايبيمون 53 - GEMIX)
 LAPIMUN GEMIX-3 (لايبيمون 54 - GEMIX-3)
 LAPIMUN MIX (لايبيمون 50 - MIX)
 POLIMUN IB MULTI (بوليمون IB مولتي) - 22
 POLIMUN IB VAR2 (بوليمون IB VAR2)
 POLIMUN IB H120 (بوليمون IB H120)
 POLIMUN IBD (بوليمون IBD)
 POLIMUN IBD+ (بوليمون IBD+)
 POLIMUN IBD Light (بوليمون IBD لايت) - 18
 POLIMUN LA-SOTA (بوليمون 24 - LA-SOTA)
 POLIMUN ND + IB (بوليمون 25 - ND + IB)
 POLIMUN ND + IB inac (بوليمون ND + IB معطل) - 33
 POLIMUN ND CLON 124 (بوليمون 26 - ND CLON 124)
 POLIMUN ND CLON 124 + IB H120 (بوليمون 27 - ND CLON 124 + IB H120)
 POLIMUN ND HITCHNER B1 (بوليمون 28 - B1)
 POLIMUN ND HITCHNER B1 + IB H120 (بوليمون 29 - HITCHNER B1 + IB H120)
 POLIMUN ND IB EDS (بوليمون 31 - ND IB EDS)
 POLIMUN ND inac (بوليمون ND معطل) - 32
 POLIMUN POX (بوليمون 16 - POX)
 POLIMUN REO 1133 (بوليمون 30 - REO 1133)
 POLIMUN REO 1133 inac (بوليمون REO 1133 معطل) - 34
 POLIMUN SALMO (بوليمون سالمو) - 35
 POLIMUN AE (بوليمون 15 - AE)
 POLIMUN AE+POX (بوليمون 17 - AE+POX)
 RABITEST (رابيتست) - 56
 المستحضرات الصيدلانية
 AMINOVITOL (أمينوفيتول) - 100, 114
 AMOXAN PREMIUM (أموكسان بريميوم) - 57, 107
 AMOXAN-500 (أموكسان 500) - 70
 ANTILACT (أنتيلكت) - 127
 ANTISTRESS (أنتيستريس) - 125
 CEFTIFUR-50 (سيفتيفور 50-) - 59, 108
 CIPROCOLIN (سيبروكولين) - 70
 CIPROCOLIN HOBBY (سيبروكولين هوبي) - 111
 CIPRONORM (سيرونورم) - 119
 CLAMOXAN (كلاموكسان) - 58
 CLOSIVERON (كلوزيفرون) - 84
 COLIDOXYN (كوليدوكسين) - 72
 COLISTO 6M (كوليستو 6M) - 74
 COLITYL-P (كوليتيل-P) - 73
 DANOXAN-25 (دانوكسان 25-) - 60
 DOXAN-50 (دوكسان 50-) - 75
 ENROCOLIN (إنروكولين) - 52

قائمة المكونات الفعالة

بروبوفول - 123	حمض سيتيل ساليسيليك - 82
نيوكليينات الصوديوم الأمريكية - 105، 117	ألانتوين - 113
السوربيتول - 101، 128	أموكسيسيلين ثلاثي هيدرات - 57، 58، 67، 70، 107، 110
زيت شجرة الشاي - 113	أرجنين - 100، 117
ثريونين - 100، 114	كلوريد البنزالكونيوم - 94، 96، 98، 99
فومارات هيدروجين تيامولين - 77	بيتاميثازون ديبروبيونات - 67، 110، 121
تيلميكوسين - 55، 68	بوتافوسفان - 103، 116
تولترازوريل - 83	كارنيتين هيدروكلوريد - 101، 103
تريميثوبريم - 56	هيدروكلوريد سيفتوفور - 59، 80، 108
التربتوفان - 100، 114	ديغلوكونات الكلورهيكسيدين - 88
طرطرات التيلوزين - 66، 73، 76	كلوريد الكولين - 100، 101، 105، 117
فيتامين أ - 100	سيبروفلوكساسين هيدروكلوريد - 71، 111، 120
فيتامين ب 1 - 100	كلوزانتيل - 84
فيتامين ب 12 - 100، 103، 116	كلوترمازول - 121
فيتامين ب 2 - 100	كبريتات كوليستين - 52، 56، 70، 71، 73، 74، 75، 111، 76
فيتامين ب 6 - 100	السيانوكوبالامين - 13، 115، 116
فيتامين سي - 100	السينارين - 101، 128
فيتامين د 3 - 100	دانوفلوكساسين ميسيلات - 60
فيتامين هـ - 100	ديكساميثازون فوسفات الصوديوم - 119
فيتامين ك 3 - 100	ديل ميثيونين - 101، 129
	دوكسي سيكلين هيكلت - 72، 75، 76
	إنزوفلوكساسين - 52، 53، 56، 61، 71، 109
	فلورفينيكول - 54، 64، 79، 112، 121
	حمض الفوليك - 100، 102، 114، 115، 117، 129
	الفورمالديهايد - 98، 99
	غلوتارالدهيد - 99
	إيسولوسين - 100، 105
	كحول الأيزوبروبيل - 90
	آيفرمكتين - 84، 87، 121
	عشب العقدة - 126
	L - كارنيتين هيدروكلوريد - 101، 102، 128
	الليوسين - 100، 114
	ليسين - 100، 117
	كبريتات المغنيسيوم - 101، M
	الميثيونين - 102، 115
	نيكوتيناميد - 103، 114، N
	أوكسيتيتراسيلين هيدروكلوريد - 65
	فينيل ألانين - 105، 117
	بوفيدون اليود - 89
	أسيتات بريدنيزولون - 112

OUR PARTNERS



AZERBAIJAN
VETART MMC



BAHRAIN
MY PETS VETERINARY CENTER W.L.L.



BANGLADESH
GLOTECH APPLIANCES LTD



CAMEROON
SODIPROVET SARL



CYPRUS
OSSAN TRADING LTD



DOMINICANA



EGYPT
EGY VAC LTD.



GHANA
TRIBECO LIMITED



IRAQ
YARA BARZ LTD



JAPAN
MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.



JORDAN
ARABIAN DRUG & TRADING



KAZAKHSTAN
FEED TRADE LLP
AGRO SEMYA LLC



KENYA
TWIGA CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
DIAR PHARMACEUTICALS
AL EMAR



KUWAIT
SAMVET W.L.L



LEBANON
LEBANON POULTRY LTD



LIBYA
ALMARAY ALALAMIA



NEPAL
MEDVET PHARMA PVT. LTD.



NIGERIA
CONFIDENCE PHARMACEUTICAL LTD



OMAN
HASANAH OMAN



PAKISTAN
HI- TECH
MS ENTERPRICES



PHILIPPINES



QATAR
GULF RIDER



SRI LANKA
KENTOVET PHARMACEUTICAL LTD



TURKEY
SIMYA PETS VETERINARY CLINIC



UGANDA
BRENTec INVESTMENTS LIMITED



UNITED ARAB EMIRATES
PROVIDENCE MEDICAL SUPPLIES LLC
GULF RIDER



UZBEKISTAN
BIOMEDICAL INNOVATION



VIETNAM
AGRIVET CO. LTD



YEMEN
KHAIRAT TAHAMA



ZAMBIA
VETAVIANA SERVICES LIMITED



UKRAINE
LLC "BIOTESTLAB"

+380 44 245-77-25
info@biotestlab.net
www.biotestlab.ua

Always in touch

