

منتجات بيطرية للحيوانات الأليفة



المفتاح لصحة الحيوان



استراتيجية الريادة: من علامة تجارية محلية إلى عالمية

BIOTESTLAB (بايوتست لاب) — شركة متخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق الأدوية البيطرية في كل من أوكرانيا والخارج. هدفنا هو أن نصبح شركة رائدة عالميًا وأن نجعل أوكرانيا موردًا رئيسيًا للأدوية البيطرية في جميع أنحاء العالم.

\$ 25+
مليون

استثمارات في التطوير
2021-2024

موظف

+330

سنة من الخبرة

36

دولة تصدير

+20

عالميًا من حيث مجموعة المنتجات

ضمن أفضل

20



جدول المحتويات

قطرات للاستخدام الخارجي

- 4..... TOBRANORM (توبرانورم)
5..... CIPROX (سيبروكس)
6..... OTO LOTION (غسول)
7..... CIPRONORM (سيبرونورم)
8..... OTOFLOX (أوتوفلوكس)

أدوية المسالك البولية

- 9..... PHYTOCAT (فايتوكات)

المهدئات

- 10..... ANTISTRESS (أنتيسريس)

تنظيم الدورة الجنسية

- 11..... ANTILACT (انتيلاكس)

الأدوية المهدئة (للتخدير)

- 12..... RELAX (ريلاكس)

مضادات القيء

- 14..... MAROX (ماروكس)

واقيات الكبد

- 16..... GEPAX (جيباكس)
18..... HEPACARNITOL (هيباكارنيتول)

الفيتامينات والأحماض الأمينية

- 19..... AMINOVITOL (أمينوفيتول)

الفيتامينات ومحفزات المناعة

- 20..... L-CYN (إل-سين)
21..... STIMULUS (ستيمولوس)

أدوية للعلاج الخارجي

- 22..... FLOXY-SPRAY MAX (فلوكسي-سبراي ماكس)

المضادات الحيوية

- 23..... CIPROCOLIN (سيبروكولين)
24..... CEFTIFUR-50 (سيفتيفور-50)
25..... SPECTRAN (سبكتران)

الجديد

TOBRANORM (توبرانورم)

الدواء العيني الوحيد في أوكرانيا
القائم على توبراميسين 0.3%



شكل العبوة - 10 مل




علاج أمراض العين المعدية
والالتهابية ذات المسببات البكتيرية

المكونات في 1 مل:
توبراميسين، 3 مجم




نُقَطَّر
1-2 قطرة



2-3 مرات يوميًا
لمدة 7-10 أيام



تأثير واضح مضاد
للميكروبات



علاج غير مؤلم

الجديد

CIPROX (سيبروكس)

مفعول قوي - لعيون وآذان صحية
محلول سيبروفلوكساسين



شكل العبوة - 10 مل




تركيز عال من المادة الفعالة — لعلاج
فعال للأمراض المعدية
والالتهابية للعيون والأذان

المكونات في 1 مل:
سيبروفلوكساسين - 5 مجم



تُقطَر
1-2 قطرة



2-3 مرات يوميًا
لمدة 5-7 أيام



تأثير واضح مضاد
للميكروبات



علاج غير مؤلم

OTO LOTION (غسول OTO)

بطل نظافة الأذن
العناية تبدأ بالوقاية

كلوريد البنزلكونيوم — 0.5 جم
الأنثونين — 0.1 جم
صبغة الأذريون (ماريجولد) — 10.0 جم
زيت شجرة الشاي — 0.05 جم

في 100 مل
المكونات



له تأثير مضاد للميكروبات



يخفف الالتهاب



يقضي على الحكة

يزيل الأوساخ القديمة

يقلل من عدد الخلايا الميتة



يجفف قناة الأذن

يحسن بشكل كبير
النبيت الجرثومي للأذنين

شكل العبوة - 30 مل



في علاج التهاب الأذن:
1-2 مرة يوميًا لمدة 7-14 يومًا



ثم تُمسح بقطعة قطن
مبللة باللوشن



يُترك المنتج في الأذن
لمدة 1-2 دقيقة



يُقطر 1-5 مل
وذلك الأذن لمدة 15-30 ثانية

CIPRONORM (سيبرونورم)

تأثير مزدوج في علاج العيون والأذنين
سيبروفلوكساسين + ديكساميثازون، معلق (معلق دوائي)

علاج التهاب الأذن والتهاب الملتحمة
البكتيري والأرجي (التحسسي)

المكونات في 1 مل:
سيبروفلوكساسين - 5 مجم
ديكساميثازون - 1 مجم



شكل العبوة - 10 مل



تُقَطَّر 1-2 قطرة



3-2 مرات يوميًا لمدة 5-7 أيام



استخدام اقتصادي



تخفيف المرحلة الحادة من الالتهاب
في غضون 24 ساعة



تأثير واضح مضاد للميكروبات

OTOFLOX (أوتوفلوكس)

نهج متكامل لعلاج التهاب الأذن بمسبباته المختلفة



مضاد للطفيليات (إيفر مكنين)



مضاد للميكروبات (فلورفينيكول)




مضاد للفطريات (كلوتريمازول)



مضاد للحساسية (بيتاميثازون)



شكل العبوة - 10 مل



2 مرة يوميًا لمدة 5-10 أيام



تأكد من التقطير في كلتا الأذنين



نظف الأذن



مفعول سريع وقوي



استخدام اقتصادي



PHYTOCAT (فيتوكات)



الطبيعة في حماية الكلى



عشبة *Aerva lanata*؛ 25 مجم
(تأثير مطهر ومدر للبول)
وتقليل مستوى
اليوريا وإزالة الرمل



عشبة عقدة الطير (Knotweed)؛ 12.5 مجم
(تأثير مدر للبول ومضاد للالتهابات، ويحسن
حالة جدران الشعيرات الدموية)



أوراق عنب الدب؛ 5 مجم
(تأثير مدر للبول، مضاد
للالتهابات ومدر للملح)



عشبة ذيل الحصان؛ 7.5 مجم
(تأثير مدر للبول، مضاد
للالتهابات ومرقق)

الوقاية

4-2 مل لكل حيوان
مرة واحدة يوميًا
لمدة 7-10 أيام
كل 3 أشهر

العلاج

4-2 مل لكل حيوان
مرتان (2) يوميًا.
مدة العلاج 3 أسابيع

✓ تركيز عالٍ من المواد الفعالة

✓ لا توجد آثار جانبية مقارنة بالأدوية الصناعية

✓ عبوة واحدة تكفي لدورة علاجية كاملة

✓ تحتوي المجموعة على حقنة توزيع



شكل العبوة - 30 مل، 50 مل، 100 مل

ANTISTRESS (أنتيستريس)

حيوان أليف هادئ - مالك هادئ
المكونات في 1 مل: فينيبوت - 100 مجم

تأثير واضح في تصحيح التوتر في حالات:

- المخاوف، العدوانية،
- الشعور بالقلق أثناء النقل، الضوضاء العالية،
- الانفصال عن المالك والمواقف اليومية الأخر
- الإثارة الجنسية المتزايدة

تطبيع عمليات الأيض
في الجهاز العصبي المركزي
بفضل النشاط منشط الذهن

يقطر في الفم:

القطط — قطرة واحدة لكل 1 كجم من وزن الجسم
الكلاب — قطرتان لكل 1 كجم من وزن الجسم
لا يزيد عن مرتين يوميًا!
مدة العلاج: 10-15 يومًا.
للوفاية من الإجهاد:
قبل 3-5 أيام من الحدث و 1-4 أيام بعده

عبوة واحدة تكفي لدورة علاجية
(للحيوانات حتى 5 كجم)



(أنتي لاکت) ANTILACT

إيقاف الرضاعة من دون هرمونات
المكونات في 1 مل: كابيرجولين - 50 ميكروجرام

جرعات مناسبة بالتقطير

دواء غير هرموني
يقضي على علامات الحمل الكاذب
يوقف الرضاعة في وقت قصير
يمنع تطور التهاب الضرع الإرضاعي
يعيد الحالة النفسية والعاطفية إلى طبيعتها



مرة واحدة يوميًا
لمدة 4-6 أيام



3 قطرات لكل 1 كجم
من وزن الجسم



عن طريق الفم
على جذر اللسان



RELAX (ريلاكس)

تخدير خفيف - هذوء للطبيب

محلول البروبوفول البيطري الوحيد بتركيز 1% في أوكرانيا



محلول غرواني صاف: إعطاء سهل، مفعول سريع

مدة الصلاحية بعد فتح العبوة هي 28 يومًا

غياب منعكس البلع

بدون مرحلة إثارة

الجرعة: جرعة بلعة واحدة بدون تخدير أولي
القطط: 0.6-0.8 مل/كجم من وزن الجسم
الكلاب: 0.4-0.65 مل/كجم من وزن الجسم



شكل العبوة - 10 مل، 50 مل

يُعد ريلاكس محلولاً كولويدياً معقماً وخالياً من البيروجينات يحتوي على بروبوفول بنسبة 1% مخصص للإعطاء الوريدي. يُستخدم في القطط والكلاب من أجل التخدير العام قصير الأمد، سواء لإحداث التخدير أو للحفاظ عليه أثناء العملية. تُضاف إلى ريلاكس مواد حافظة تضمن سلامة المحلول المعقم لمدة تصل إلى 28 يوماً بعد فتح القارورة. في التطبيق العملي، ولتحقيق تخدير مناسب، يجب تعديل جرعة ريلاكس وفقاً لاستجابة الحيوان بعد إعطاء الدواء. ويُعطى وريداً إما بالطريقة السريعة (الحقن اللفاف) أو بالتقطير الوريدي. ولتحقيق دقة أكبر في الجرعات، يمكن تخفيف ريلاكس بمحلول كلوريد الصوديوم 0.9% بنسبة 1:4 قبل الإعطاء. عند استخدام التهيئة المسبقة (Premedication)، تُخفّض جرعة ريلاكس المطلوبة للوصول إلى نفس مستوى التخدير

إلى جانب العمليات الجراحية، يُستخدم ريلاكس أيضاً في:

- تقديم الرعاية الطبية للحيوانات المصابة؛
- طب الأسنان (مثل خلع الأسنان أو إزالة الجير)؛
- أثناء إجراءات التشخيص مثل الموجات فوق الصوتية (Ultrasound)، الأشعة السينية (X-ray)، التصوير المقطعي المحوسب (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

في عام 2017، خضع عقار ريلاكس (RELAX) لتجربة سريرية على الحيوانات المستهدفة (الكلاب والقطط) أجريت في المعهد الحكومي لأبحاث الأدوية البيطرية والمواد المضافة للأعلاف داخل العيادات البيطرية في لفيف. وأظهرت الدراسة أن ريلاكس عامل فعال وآمن للتخدير قصير الأمد في القطط والكلاب أثناء العمليات الجراحية.

البروتوكول الموصى به لاستخدام ريلاكس مع التهيئة المسبقة (Premedication)

التهيئة المسبقة (Premedication)

النوع من الحيوانات	سيدازين 0.1% (Sedazine)	ميديتين 0.1% (Meditin)	Zoletil 100
القطط	من 0.1 إلى 0.15 مل لكل كغ من وزن الجسم	من 0.1 إلى 0.2 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم	من 0.05 إلى 0.1 مل لكل كغ من وزن الجسم
الكلاب	من 0.05 إلى 0.15 مل لكل كغ من وزن الجسم	من 0.1 إلى 0.2 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم	من 0.05 إلى 0.1 مل لكل كغ من وزن الجسم

RELAX (ريلاكس)

القطط: 0.12 مل لكل 1 كغ من وزن الجسم	الكلاب: 0.1 مل لكل 1 كغ من وزن الجسم
--------------------------------------	--------------------------------------

يُعد ريلاكس متوافقاً مع الأدوية المستخدمة في التهيئة المسبقة، ومرخيات العضلات، والمخدرات الاستنشاقية، والمسكنات. ولم تُلاحظ أي تداخلات ديناميكية دوائية سلبية عند استخدامه. يمكن توفير مسكنات الألم بعد الجراحة باستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

الجديد

MAROX (ماروكس)

التحكم السريع في القيء عند الضرورة



شكل العبوة - 10 مل، 20 مل

مؤشرات الاستخدام:

تحكم موثوق في الغثيان بعد الجراحة
والغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي
علاج حالات القيء بالتزامن مع تطبيق
تدابير الدعم الأخرى
الوقاية من الغثيان والقيء بعد العمليات
الجراحية مع تعزيز التعافي بعد التخدير
العام

علاج ومنع الغثيان والقيء في الكلاب والقطط

المكونات



في 1 مل: ماروبيتان، 10 مجم
(محلول للحقن)

- يمنع مستقبلات النيوروكينين التي تسبب القيء
- تأثير ملحوظ في 30-60 دقيقة - مثالي لحالات الطوارئ
- يستمر التأثير العلاجي لمدة تصل إلى 24 ساعة
- تحكم موثوق في الغثيان بعد الجراحة والغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي
- إدارة مرنة للاستخدام وجرعات مناسبة
- ليس له آثار مهدئة
- له تأثير مسكن للألم

الوقاية	العلاج		الاستخدام
الكلاب والقطط من عمر 4 أشهر فأكثر	الكلاب والقطط من عمر 4 أشهر فأكثر	الكلاب من عمر 2 إلى 4 أشهر	أنواع وأعمار الحيوانات
1 ملغ لكل 1 كغ من وزن الجسم (1 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم) *تحت الجلد SC أو **في الوريد IV	1 ملغ لكل 1 كغ من وزن الجسم (1 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم) *تحت الجلد SC أو **في الوريد IV	1 ملغ لكل 1 كغ من وزن الجسم (1 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم) *تحت الجلد SC	الجرعة وطريقة الإعطاء:
يُعطى الدواء قبل 60 دقيقة من إعطاء أي دواء قد يسبب القيء	مرة واحدة يوميًا لمدة تصل إلى خمسة أيام متتالية		مدة العلاج

* عند إعطاء الدواء تحت الجلد
** أما عند الإعطاء الوريدي، فيجب أن يتم الحقن خلال مدة تتراوح بين 1-2 دقيقة، دون خلط الدواء مع أي محاليل أخرى

استخدمه مبرّدًا
* عند الحقن تحت الجلد



مرة واحدة يوميًا
لمدة تصل إلى خمسة أيام متتالية



مجم 1
لكل 1 كجم
من وزن الجسم



عن طريق الحقن تحت الجلد
أو في الوريد

GEPAX (جيباكس)

واق للكبد (هيباتوبروتكتور) قابل للحقن للكلاب والقطط،
(ADEMETIONINÉ) قائم على مادة أديميثيونين



المكونات

مجفف بالتجميد — إس-أدينوسيل-إل-ميثيونين (SAmE)
مذيب — إل-كارنيتين (L-Carnitine)، ومواد مساعدة

مؤشرات الاستخدام:

الوقاية والعلاج للكلاب والقطط المصابة بأمراض الكبد أو المرارة أو القنوات الصفراوية الحادة أو المزمنة
علاج مُصاحب في حالات الأمراض المعدية أو الطفيلية أو الأورام (السرطانية)



يوفر الطاقة لخلايا الكبد، ويطلق آليات لاستعادة بنيته وجميع وظائفه

- يحمي الكبد من السموم
- يعيد بناء البنية الخلوية لخلايا الكبد (hepatocytes)
- يستعيد طاقة الخلايا

جرعة مريحة وسهلة الاستخدام

من 10 إلى 20 كغ



GEPAX 200 (جيباكس 200)

إس-أدينوسيل-إل-ميثيونين
أديميثيونين) — 380 ملغ لكل زجاجة / (SAME)

حتى 10 كغ



GEPAX 100 (جيباكس 100)

إس-أدينوسيل-إل-ميثيونين
أديميثيونين) — 190 ملغ لكل زجاجة / (SAME)

مرة واحدة يوميًا
لمدة 5-10 أيام



وريدًا
عضليًا
تحت الجلد



يُحضَّر المحلول مباشرة
قبل الاستخدام



HEPACARNITOL (هيباكارنيتول)

هيباتوبروتكتور مركب سهل الاستخدام


التركيب
في كل 1 مل من المضافات العلفية:

كلوريد الكارنيتين — 25 ملغ
دي-إل-ميثيونين — 10 ملغ
كلوريد الكولين — 18.75 ملغ
كبريتات المغنيسيوم — 10 ملغ
سوربيتول — 200 ملغ
سينارين (مستخلص الخشوف) — 5 ملغ



شكل العبوة - 10 مل

- يحمي خلايا الكبد من السموم ويسرّع تجددتها
- يحسّن العمليات الأيضية في الكبد
- ويمنع التناكس الدهني
- يعزز المناعة



مرة واحدة يوميًا
لمدة 7-10 أيام



تُعطي 10 قطرات
(مل) / لكل حيوان 0.5
10 قطرات (0.5 مل) /
تُخفف في 0.5 مل من الماء



حتى 10 كغ: 10 قطرات
(0.5 مل) / لكل حيوان
من 10 كغ فأكثر: 20 قطرة
(1 مل) / لكل حيوان



AMINOVITOL (أمينوفيتول)

تركيبة فيتامينات متوازنة لحيواناتك الأليفة

التركيب
في كل 1 مل من المضافات العلفية:

- فيتامين A — 2500 وحدة دولية (IU)
- فيتامين B1 — 1.2 ملغ
- فيتامين B2 — 4.5 ملغ
- فيتامين B6 — 2.5 ملغ
- فيتامين B12 — 0.01 ملغ
- فيتامين C — 30 ملغ
- فيتامين D3 — 2250 وحدة دولية (IU)
- فيتامين E — 10 وحدة دولية (IU)
- فيتامين K3 — 4.5 ملغ
- حمض الفيروليك — 0.25 ملغ
- حمض البانتوثينيك — 9 ملغ
- البيوتين — 0.05 ملغ
- النياسيناميد — 22 ملغ
- كلوريد الكولين — 50 ملغ
- ميثيونين — 10 ملغ
- أرجينين — 10 ملغ
- ليوسين — 12 ملغ
- ثريونين — 2 ملغ
- ترينوفان — 6 ملغ
- ليسين — 50 ملغ
- فالين — 22 ملغ
- ايزوليوسين — 8 ملغ
- فينيل ألانين — 10 ملغ
- هستيدين — 6 ملغ



شكل العبوة - 10 مل

يعوّض نقص الأحماض الأمينية والفيتامينات؛
يدعم الجسم في حالات التوتر؛
يساعد على التعافي السريع بعد العلاج

تُعطى 10 قطرات (0.5 مل)
لكل حيوان /
10 قطرات (0.5 مل) /
تُخفف في 0.5 مل من الماء



حتى 10 كغ: 10 قطرات
(مل) / لكل حيوان (0.5)
من 10 كغ فأكثر:
قطرة (1 مل) / لكل حيوان 20



مرة واحدة يوميًا
لمدة 7-10 أيام



L-CYN (إل-سين)

يمنح الطاقة والنمو

بوتافوسفان يقلل من مستويات الكورتيزول ويحسن استخدام الجلوكوز في الدم — مما يطلق الطاقة

L-carnitine
(إل-كارنيتين)/فيتامينات B₁₁ يعزز نقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا ويحفز تحويل الطاقة

B₁₂ يسهم في تطبيع عملية تكوين الدم (hematopoiesis)

B₃ الإنزيمات المساعدة — طاقة للخلايا والأنسجة

الجرعة: للكلاب والقطط والأرانب والقوارض - حقن عضلي
أو تحت الجلد أو في الوريد 0.5-2.5 مل لكل حيوان



شكل العبوة - 10 مل، 100 مل

STIMULUS (ستيمولوس)

فعل طاقة الحيوية لدى حيوانك الأليف!

يحتوي على مواد حيوية فعالة

200 =

نوكليينات الصوديوم
فيتامينات ومواد شبيهة بالفيتامينات
أحماض أمينية، معادن
مكوّنات حيوية أخرى

٩٠
٣٥
١٠
٥



لكل أنواع الحيوانات



طرق الإعطاء: تحت الجلد، وريدياً



عن طريق الفم مع الماء



خصائص مضادة للأكسدة
ومضادة لنقص الأوكسجين



يحمي الجسم من التوتر



تُقلل وقت التعافي

شكل العبوة - 10 مل، 100 مل

تحفيز جميع العمليات الفسيولوجية في الجسم

يُستخدم كعامل داعم بعد العمليات الجراحية

يُعيد العمليات الأيضية أثناء الإجهاد أو العدوى أو التسمم

للصغار — لتحفيز النمو وتحسين التطور

للحيوانات المنهكة — للتعافي السريع

للكبار — للحفاظ على النشاط الحيوي

الجرعة:



1 مل / كغ من وزن الجسم، بحد أقصى 20 مل لكل حيوان

FLOXY-SPRAY MAX

(رذاذ فلوكسي ماكس)

عامل مضاد للالتهابات ومساعد على التئام الجروح للحيوانات غير المنتجة

لا يلون، بل يعالج



يُعطى تأثيرًا طويل
الأمد على المناطق المصابة



سهولة الاستخدام والجودة الاقتصادية



شكل العبوة - 9 مل، 30 مل
50 مل، 100 مل

فلورفينكول — 2.5 غ
(يعمل كمضاد للبكتيريا موجبة وسالبة الغرام)



برينيزولون — 0.1 غ
(مضاد للالتهاب، للحساسية، ولإفرازات الزائدة)

لعلاج التهاب الجلد بجميع أنواعه (باستثناء الفطري)، التهاب محيط الظفر، التهاب الجلد القيجي، والإكزيما.
كما يُستخدم للجروح الناتجة عن العمليات الجراحية أو الصدمات أو العضات أو الخدوش أو القرع أو الخراجات المفتوحة.

CIPROCOLIN (سيبروكولين)

مسحوق مضاد حيوي فموي حديث لتحضير المعلق الدوائي

قوة مزدوجة

تركيز أقصى في الأنسجة بعد ساعة واحدة

سيبروفلوكساسين
100 ملغ / 1 غ

كوليستين
1,000,000 وحدة دولية (IU) / غ



تجويف الفم



الجهاز التنفسي



الجهاز البولي
التناسلي



التهاب الأذن و
الملتحمة



العضات والالتهابات



الجهاز الهضمي

100 مل من المعلق الجاهز تكفي لعلاج كلب وزن 20 كغ لمدة 5 أيام.
الجرعة: 1 مل / 1 كغ من وزن الجسم



شكل العبوة - 100 مل


- سهولة ودقة الاستخدام — بفضل سرنجة القياس
- طعم ورائحة لحم مستساغان — مقبول جيدًا من الحيوانات
- جرعة واحدة فقط يوميًا — تُسهّل عملية العلاج على المالك
- يمكن إضافته إلى الطعام

CEFTIFUR-50 (سيفتيفور 50-)

الحالات المعقدة تتطلب حلولاً حديثة
في كل 1 مل: سيفتيفور — 50 ملغ

التهابات الجلد (التهاب الجلد القيجي)

التهاب بطانة الرحم (التهاب البولي التناسلي)



100%
فعالية علاجية



شكل العبوة - 10 مل، 100 مل

SPECTRAN (سبيكتران)

تركيبة فريدة لعلاج فعال
أموكسيسيلين + بيتاميثازون

التهاب الأذن والتهاب الملتحمة الأنسجة الرخوة المفاصل التهابات الجلد الجهاز البولي التناسلي الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي

المكونات:

في كل 1 مل من الدواء تحتوي المكونات النشطة على:

أموكسيسيلين ثلاثي الهيدرات — 150 ملغ

بيتاميثازون ديبروبيونات — 0.5 ملغ

مواد مساعدة

مضاد حيوي

يؤثر على البكتيريا الموجبة والسالبة الغرام —
تأثير مضاد للبكتيريا

طريقة الإعطاء والجرعة: يُعطى عضليًا أو
تحت الجلد مرة واحدة بجرعة

هرمون صناعي من قشرة الغدة الكظرية

تأثير مضاد للالتهاب

تأثير مضاد للحساسية

1.0 مل من الدواء لكل 10 كغ من وزن جسم الحيوان.
وإذا لزم الأمر، يمكن إعادة إعطاء الدواء بعد 48 ساعة.

الالتهابات



معلق جاهز للحقن



يُعطى تحت الجلد أو عضليًا



شكل العبوة - 10 مل، 100 مل

العلاج الموصى به

العمليات الجراحية

STIMULUS (ستيمولوس)



تحفيز الجهاز المناعي
قبل الجراحة

MAROX (ماروكس)



الوقاية من الغثيان والقيء

RELAX (ريلاكس)



التخدير غير الاستنشاق

FLOXY-SPRAY MAX (رذاذ فلوكسي ماكس)



العلاج بعد الجراحة

CEFTIFUR-50 (سيفتيفور 50)



SPECTRAN (سبيكتران)



CIPROCOLIN (سيبروكولين)



HEPACARNITOL (هيباكارنيتول)



L-CYN (إل-سين)



العلاج بالمضادات الحيوية وتخفيف الالتهاب

استعادة نشاط الجسم / تعافي الجسم

التهاب الأذن (OTITIS)

OTO LOTION (غسول OTO)



تنظيف الأذن

OTOFLOX (أوتوفلوكس)



CIPRONORM (سيبرونورم)



العلاج الموضعي للالتهابات

CIPROX (سيبروكس)



CIPROCOLIN (سيبروكولين)



العلاج بالمضادات الحيوية

التهاب المتحمة

CIPRONORM (سيبرونورم)



CIPROX (سيبروكس)



TOBRANORM (توبرانورم)



العلاج الموضعي للالتهابات

الوقاية من الغثيان

MAROX (ماروكس)



الوقاية من الغثيان والقيء

علاج الحيوانات

الأمراض العامة للجسم

STIMULUS
(ستيمولوس)



CEFTIFUR-50
(سيفتيفور 50)



SPECTRAN
(سبيكتران)



CIPROCOLIN
(سيبروكولين)



تحفيز الجهاز المناعي

العلاج بالمضادات الحيوية وتخفيف الالتهاب

HEPACARNITOL
(هيباكارنيتول)



AMINOVITOL
(أمينوفيتول)



L-CYN (إل-سين)



استعادة نشاط الجسم / تعافي الجسم

منظومة الأعصاب

ANTISTRESS
(أنتيسريس)



تخفيف التوتر

PHYTOCAT
(فيتوكات)



CEFTIFUR-50
(سيفتيفور 50)



CIPROCOLIN
(سيبروكولين)



العلاج بالمضادات الحيوية وتخفيف الالتهاب

طب المسالك البولية البيطرية

ANTILACT
(أنتيلكت)



الحمل الكاذب
(Pseudopregnancy)

GEPAX
(جيباكس)



واقي للكبد للحقن

HEPACARNITOL
(هيباكارنيتول)



واقي للكبد عن طريق الفم



التعاون مع
BIOTESTLAB (بايوتست لاب)

